This book was produced in EPUB format by the Internet Archive.

The book pages were scanned and converted to EPUB format automatically. This process relies on optical character recognition, and is somewhat susceptible to errors. The book may not offer the correct reading sequence, and there may be weird characters, non-words, and incorrect guesses at structure. Some page numbers and headers or footers may remain from the scanned page. The process which identifies images might have found stray marks on the page which are not actually images from the book. The hidden page numbering which may be available to your ereader corresponds to the numbered pages in the print edition, but is not an exact match; page numbers will increment at the same rate as the corresponding print edition, but we may have started numbering before the print book's visible page numbers. The Internet Archive is working to improve the scanning process and resulting books, but in the meantime, we hope that this book will be useful to you.

The Internet Archive was founded in 1996 to build an Internet library and to promote universal access to all knowledge. The Archive's purposes include offering permanent access for researchers, historians, scholars, people with disabilities, and the general public to historical collections that exist in digital format. The Internet Archive includes texts, audio, moving images, and software as well as archived web pages, and provides specialized services for information access for the blind and other persons with disabilities.

Created with hocr-to-epub (v.1.0.0)










The text on this page is estimated to be only 5.21% accurate

PLANTES ET ANIMAUX j J| Dxifa^e en Medecme, décrits SSâiis la Matière Médicale de I » %\M (GEOFFROY ME171 vDes-JVieœ d après Ilutitre Grave V GARSAULT \sà» -i aSp£" Prévoit, DuftoJlfartmet-. 6% TOJltE \\m\f 11 '" ■"""""""! ""I! "IIU1W»HUII|||IIII I NI III IIIUIIIIIIIIIIMINN III Éil X>7^J- :



The text on this page is estimated to be only 14.61% accurate

AVERTIS SEMENT , Voici un Recueil considérable de Plantes et d'animaux , fruit de plusieurs années de timvail . Je les avens dessinés en divers temps et, comme rfl, de Jussieu a juge que cet assemblage pouvait être tres-utile au public ,il m'a engaje à les faire graver ; et ,pour en former un corps dôuvrajje, nous as roons choisi la matière médicale de M ' . Geoffroy, commençant par les E.vo: tiques, ou étrangères , suivant lordre du Eivre , article par article ; Ensuite les Indigènes, Plantes de nos Climats: et enfin les Ununaux.Ec premier me. rite de ces fupires est d avoir ete toutes dessinées d'après nature avec la plus grande exactitude , comme on fait un Portrait : Chaque Plante—?, dans les lieux ou- elle croit naturellement ,e,rcplé plusieurs E.rohipueec S au. 'd a fallu prendre dans les plus fameux < tardais, comme le Jardin, du Roi, celui du petit Tnanon , celui de Jl '.R.vnbarde , SCe . -x°Eues sont Jessmees toutes entières ,quebpues Grandes qu 'elles soient On 'voit par conséquent le port, de c/iaaiie plante, sod rampante , mordante , droite. ■ ; rameuse , SU c feé tfiu n 'a jamais été eœecuté dans aucun Livre deJ Botanique de la façon, dont elles le sont ici) afin ou 'on puisse les recon: noitre ,par tout ou on les rencontrera ,sur la sunple inspection , et au prem'. coup d œil , indépendamment des détails , comme fleur, fruit, &£a au 'on a ajoutes danr leurs Planches, A. l'eïjard des arbrisseaux et arbres , comme la pluspart n ont point de forme arrêtée, on n en a fait au un rameau en fleurs, et un en fruits : 1 1 s 'en trouve cependant quelques uns dont le J. port est asses constant , comme le Sapin, le Cyprès ôCc. oui sont enlie: renient figures. C'est par la même raison ou 'on n'a pas dessiné le A. Racines des Etantes .'Eu description du Eiore suffit pour en donner' corr. naissance, et la plante niérne. lors au an la rencontrera , yl l yard des jMctauoc , Mincrait.r , Fossiles, SC.C qui tiennent le pre mier Tome de Geoffroy, le Dessein seul ne s,;at irait les rendre assés bien; c est pourquoi on n'en a put aucun . Ees Plantes té minimal or- pue /'ai pu dessiner d'après natnre,qui sont le plus arand nombre , l'ont été' avec foute l'application possible .A l'égard des objets de ces deux genres dont je n ai pu avoir l'original, je me suiéi-J au/e des meilleur.? desseins et peintures, sous les •i/caoc des personnes, pu les ont -ou dans leurs voyages , comme Jf.'yfdanson , et d'autr es , d s'en~j trouve peu dont on n'a pas encore ni description entière, ni futures, «b qu'il n a pas ete par conséquent possible d'exécuter . Quoique l'Enluminure soit une Peinture fort imparfaite , elle

donne cep en dont plus de -vérité aux Plantes , et est plnr facile à exécuter sur leurs Dessein.? que sur bien dautres sujets , Ceux oui ■voudraient s 'en donner la peine, le peuvent très - aisément : Il s'agit pour cet effet d'avoir des Pin eeaux de dlfflrentci, * grosseurs ci finesses, du Perd d'Iris , et du Verd de


The text on this page is estimated to be only 16.23% accurate

Vessie , du Perindlon , de la Laqua, fine , du Bleu, de Prusse , de laJ Lronune -jnitte , du B Litre , le tout dans des Coquilles : LcsPérds pour les feuilles , le Vermillon poiv les fleurs routes , la L amxe pour les fleura, pourpres, le Bleu pour les bleues, la. Gomme -autte poil/' les jaunes. On fad du Triolet, avec la Laque et le Bleu mêle ensemble. Les BrancAes des Qrbres se feront avec du Bistre ; la seule précaution a prendre est de ne pas sortir des contours des f euilles , fleurs SCe . de peur de bar. bmuller le. papier bla/u? : On. ne se sert jamais de Blanc pur a l'enz luimnure, attendu qu'il noircit en vieillissant . Les Vendeurs de Couleurs 'Vendent, quatui on veut, les Couleurs toutes jfommées et prepa: rees , s 'entend celles qui, ne portent pas leurs jqâmme avec elles ; car d Plante, les petites Lettres, avec i. a . 3. SCe. marquent les pariées se. parées de la Planée dans l'ordre suivant. a.i. ou b.j. SCc. C'est la Fleur. a. cl. ou b.o.. SCc C'est te Fruit. a 3 #Vv C'est ta Tiae. #Cc.. C'est la Feuille . U ' ° " C art les parties tnteneures du Fruit ,


The text on this page is estimated to be only 18.79% accurate

La Planclie ou est dessinée Pireb'iim , la Piretre . et P\/ia: ponhcum , If Phapontie . Ih'tu/a/it pas ête par mêçarae eotte'e a son ratuj, tpui dewoit être parmi les M ocotùpues on dran s y ères, après TtfmtUn/ et Gins -enjj , a ête portée auœ Indu aènes , pa/ym les LapaîhzuTV , ou Patiences PI . 3-zô . Comme il peut se trouver des personnes , cpui n 'ayant pas ncxjuit , ow fpuv ne se souciant pas cl anaueinr la JllahereJ. JffledtéàZe de- JH . Geoffi-oy , seraient emiarasseês^faiite de 7 rencontrer sur les Planches , les llonis français des Plantes et des Gnuiuuwc , on. leurs Iwrera. par dessus le ftlarche , une Table imprimée , ou le tlom lahn de la Plante, et de l'animal, sera siuarv du nom françois ; et du tl 1 de la Planche . M est Ion. d 'avertir les mêmes personnes , crue les PlanteicJ Eoc-otipues ou ctranyei~es , vont depuis le Th. 1 .jusaxtes et


Cochlea seu Limax terrestris, Limaçon.



Limax ruber, Limace rouge.




Cochlea Cœlata, Nombril de mer.




Dessiné par Mr. De Garsault

Gravé par Mariet




Ostreum, *Huitre à l'ecaille.*

Ostreum idem.



Antalium, Antale.
Dentalium, Dentale.
Concha margaritifera,
Nacre de Perles.

en repos




Lumbricus terrestris, Ver de terre.

Mytulus, Moule de mer.




Mytulus.



Mytulus.





Sepia , Seche.
Os.
Os.

The text on this page is estimated to be only 5.50% accurate

ri. b'So,


Apis, Abeille.



Tête de Bourdon d'Abeille grossie.



Abeille Grossie.



Tête d'Abeille grossie.


Bourdon grossi.



Reine d'Abeille grossie.



Abeille grossie.



Bourdon.



Crisalide.



Reine.



Œuf.




Ver.



Abeille.


Alueoles.


Alueole de Reine.





Alueole.



Araneus, Araignée.


Bombiæ.
Papillon.
Duvet.
Vers couplés.
Œufs.
Papillon.
Ventre.
Dos de la Chrisalide.


The text on this page is estimated to be only 8.50% accurate

pi. m.


Cancer pagurus, Crabe.




idem.




idem.




Cancer fluviatilis Ecrevisse .
idem .


The text on this page is estimated to be only 16.00% accurate

Pl. fsf.



Formica, Fourmi.
Fourmi aîlé grossi.
Fourmi grossi.
Fourmi grossi.
Œuf.
Fourmilliere.
del. par M. de Garsault
et Gravé par Martinet

The text on this page is estimated to be only 5.50% accurate

Tl. 6S6



Grillus domesticus, Grillon domestique.



Locusta, Grande Sauterelle Verte.

Le derriere du mâle.






Sa Tête.



Oniscus, Cloporte.




idem grossi.




en boule.



idem grossi.



idem grossi.




Pediculus, Pou.




The text on this page is estimated to be only 2.00% accurate

pi. m.



Scarabœus cornutus, Cerf volant.
Scarabœus unctuosus, Scarabée.
Scarabœus Stridulus, gros Hanneton.
Scarabœus pillularis, Fouille Merde.

The text on this page is estimated to be only 0.00% accurate


/


Scorpius, Scorpion.
Dessiné par Mlle de Gastaube
Gravé par Martinet

Acipenser, Esturgeon.




Ichthyocolla, Grand Esturgeon Poisson à Colle.




Anguilla , Anguille .



Asellus Major , Morue .




Merlangus , Merlan .



M^r. de Garsault del.

Martinet Sculpsit. 1763.

lia/ena , Salant



Cetus dentatus, Cachalot.




Monoceros, Narwal.



The text on this page is estimated to be only 25.25% accurate

pi.ess. Haretiqus , Hararuf




The text on this page is estimated to be only 1.00% accurate

I


The text on this page is estimated to be only 5.00% accurate

Pl. 6 6 4..


Carpio , Carpe .




Tinca , Tanche .



Lucius , Brochet .




Perça , Perche . Pntttii , Truite




The text on this page is estimated to be only 4.00% accurate

FL.S6S


Tête.
Tête.
Dents
Venimeuses.
Vipera, Vipere.

The text on this page is estimated to be only 0.50% accurate

ri.ee 7


Serpens, Serpent à collier.
idem.

The text on this page is estimated to be only 0.00% accurate

-




Lacertus terrestris, Lezard gris.

Dessiné par M.r de Barfille

Gravé par Martinet

The text on this page is estimated to be only 7.00% accurate

T!.6VS.



Lacertus viridis, Lezard verd.

The text on this page is estimated to be only 0.00% accurate

/


Scincus, Scine.







Dessiné par Mlle de Gursault

Gravé par Martinet



Ranetta Grenouille S.t martin.
Bufo ; Crapaud.


Salamandra Salamandre.


I


Lacertus aquatilis, Salamandre d'eau.

Testudo terrestris, Tortue de terre.





Testudo marina Tortue de mer.



The text on this page is estimated to be only 29.33% accurate

pi..e7e. jiecifriier , Hpamer , Manchet.






Alauda , Alouette .


Alcedo , Muta , Martin pescheur .




Anas sylvestris, Canard sauvage.



Anser domesticus, Oye domestique.



Aquila regalis, Aigle royal.



M.r de Sonnerat del.

Mortinet Sculp.



Ardea cinerea, Heron gris.


Ciconia, Cigogne blanche.
D.e de Garsault Del.
Martinet Sculp.


Pl. 685 .


Grus, Grue.


I


Carduelis, Chardoneret.


Columba , Pigeon bizet .




Turtur ,Tourterelle .



Pl. 686.


Corvus, Corbeau.
Coturnix, Caille.



Cuculus, Coucou.

The text on this page is estimated to be only 11.50% accurate

» !


FI. 688 .

Cygnus, Cigne privé.



The text on this page is estimated to be only 6.00% accurate

I



Hirundo, Hirondelle.
Gallus, Coq.

The text on this page is estimated to be only 3.50% accurate

1 ♦


Merula , Merle.
Motacilla , Hoche -queue .

Caprimulgus fresaye, Crapaud-volant.




Otis, Outarde.



Dessiné par Mr. de Garsault

Gravé par Martinet


Parus grosse, Mésange.
Passer, Moineau franc.
Passer troglodites, Roitelet.


The text on this page is estimated to be only 3.00% accurate

I

The text on this page is estimated to be only 2.00% accurate

f i

Pavo , Paon .



The text on this page is estimated to be only 5.67% accurate

> i I




Perdix cinerea, Perdrix grise.

Phasianus, Faisan.



I


Picus viridis, Pic -verd.
Pica, Pie.

The text on this page is estimated to be only 9.67% accurate

j j !


Turdus minor, petite Grive, Mauvis.
Strathio, Autruche.

The text on this page is estimated to be only 18.00% accurate

I


Upupa, Huppe, Pupue.




Vanellus, Vanneau.




Bos , Taureau.



Vacca , Vache.




Camelus , Chameau .




gravé par Martinet

The text on this page is estimated to be only 22.57% accurate


Pl. yoi. i r ' "- .


Canis, Chien.

Lupus, Loup.





Vulpes, Renard.



The text on this page is estimated to be only 11.75% accurate


Cdfrra , Chèvre. J


Hircus, Bouc.



The text on this page is estimated to be only 11.33% accurate

Pl. 70 if.


Rupicapra, Chamois.
Caprea moschi, Gazelle.

Capricerva Orientalis, Chevre du Bezoart.




gravé par Martinet

Castor Canadensis, Castor.



The text on this page is estimated to be only 2.00% accurate

ri.7o7.


Cervus & Cerva.
Cerf.
Biche.



Cervus Rangifer, Renne.
Grave par Martinet

Alce, Elan.



The text on this page is estimated to be only 10.00% accurate

I


Erinaceus, Herisson.

Elephas, Elephant.




I


Equus, Cheval.




Asinus, Ane.



Mulus, Mulet.




Felis, Chat.



The text on this page is estimated to be only 10.00% accurate

I

Cynos, Hippoppotame.




The text on this page is estimated to be only 8.50% accurate

I I




Dessinée par M.r de Garsault

Gravé par Martinet.



Dessiné par M.r de Garsault


Gravé par Marlinet




Manati. Lamantin.


Martes, Fouine.

Meles, Blereau.




Animal Zibethi, Civette.



Dessiné p. Mr. de Garlant. Gravé par Martinet.

The text on this page is estimated to be only 2.00% accurate


I


Mus minor, Souris.
Mus major, Rat.
D. p. Mr. De Garsault
Gravé par Martinet


The text on this page is estimated to be only 6.00% accurate

V

Aries, Belier.



Ovis, Brebis.




dessiné et par Mr. de Garsault

gravé par Martinet

The text on this page is estimated to be only 4.33% accurate

i l r

Phoca, Veau marin.



The text on this page is estimated to be only 2.00% accurate

J

Rhinoceros.




The text on this page is estimated to be only 0.00% accurate


1


Simia, Singe sans queue.

Sus, Cochon Verrat.




Aper, Sanglier.




dess. par M.r de Garsault

Grave par Martinet



Talpa , Taupe.

Ursus , Ours .



Homo , Mulier .

Homme .

Femme .



B.L. Prevost inv. et Sculp. 1764

The text on this page is estimated to be only 3.50% accurate

« r


The text on this page is estimated to be only 4.33% accurate


!" * -*

The text on this page is estimated to be only 2.00% accurate


I

TRAITÉ
DES
PLANTES ET
ANIMAUX


I A WOZ











The text on this page is estimated to be only 7.00% accurate

/

The text on this page is estimated to be only 19.82% accurate

DESCRIPTION DES PLANTES ET ANIMAUX, DE LA MATIERE MÉDICALE; DEM. GEOFFROY.

The text on this page is estimated to be only 18.20% accurate

DESCRIPTION, VERTUS ET USAGES DE SEPT CENTS DIX-NEUF PLANTES, TANT ETRANGERES QUE DE NOS CLIMATS j ET DECENT TRENTE-QUATRE ANIMAUX, EN SEPT CENTS TRENTE PLANCHES, Gravées en taille-douce, fur les deffeins d'après nature, de M. deGarsault, par MM. de Fehrt, Prévost, Duflos , M a r t i n e t , &c. Et rangées fuivant l'ordre du Livre intitulé MATIERE MÉDI* cale de M. Geoffroy, Ouvrage utile a toutes Matières Médicales , aux Artijiesy aux Perfonnes charitables , & à tous ceux qui préparent eux-mêmes leurs Médicaments, A PARIS, CHEZ P. Fr.D I DOT LE JEUNE, QUAI B ES AuGtfSTlNS» près du Pont S. Michel , à S. Auguftin. M. DCC L X V 1 1. AVEC PRIVILEGE DU ROI.

The text on this page is estimated to be only 20.28% accurate

ïo4 . INDIGENES. Vertus et Usages. Elle eft céphaliqtie , alexiraire, vulnéraire : la dofe eft , en décoction, quatre onces. Extérieurement elle a les mêmes vertus. Elle entre dans le Mondificatif d'Ache: PLANCHE HT* Anethum^ Aneth, Ann. ON fe fert de fa graine, feuilles & fommnéSï La racine eft menue , blanche , fibrée; La tige s'élève d'un pied Se demi ; les feuilles font verd clair, d'une odeur forte. Les rieurs font en parafol , jaunes j il leur fuccede deux graû nés accollées , cannelées , jaune pâle : elle fleurit en été. On la cultive dans les Jardins de Botanique* Vertus et Usages. C'eft une des quatre graines carminàtives : elle eft carminative , diurétique, hyftérique : la dofe de la graine eft un gros; Extérieurement les trois parties ci-deflus font réfolutives, maturatives. Les fommités entrent dans l'Huile de Renard par ïnfulion, l'Emplâtre de Grenouilles avec le Mercure , le Diachilum avec les Gommes , l'Emplâtre de Mucilage. PLANCHE 146. Anifum , Anis , Ann. ON fe fert de la graine, rarement des feuilles. La racine eft menue , blanche , fibrée. La tige s'élève vers un pied & demi y les feuilles font verd gai* Les fleurs font en parafol , blanches ; il leur fuccede deux graines accollées , menues , cannelées ^ d'un verd grifâtre , d'une odeur & d'un gout très-agréable, doux, un peu acre : ellefltur rit en été. On la cultive principalement en Touraine. Vertu'

The text on this page is estimated to be only 18.53% accurate

TOME SECOND. I0J Vertus et Usages. C'eft une des quatre grandes fcmences chaudes : elle eft càrmirtative, . ftomachale , béchique , diurétique, hyftérique. La dofe éft en poudre depuis un fcrupule jufqu'à un gros. Elle entre dans le Sirop d'Armoife, Antiafthmarique , la Poudre de Rofes , de Joie , la Thériaque , le Mithridat ^ le Catliolicon double, le Lcnitif, la Confection Hamech , l'Ele&uaire de Pfyllium j les Trochifques de Rhubarbe , les Pilules dorées , polychreftes. PLANCHE 147* Anonis , Bugrande, Arrête-bœuf, Viv. ON fe fert de la Plante entière , far - tout de fa racine & écorce. Les racines ont plus d'un pied de lorig , courant de toutes parts, brunes en dehors, blanches en dedans, d'un go ut défagréable* Les tiges font rougeâtres , velues, épineufes ; les feuilles fonc verd foncé velues , d'une mauvaife odeur , d'un gout légumineux. Les fleurs font légnmineufes couleur de chair ou blanches ; il leur fuccede une gouffe courte , contenant des graines en forme de rein. : elle fleurit en été. Elle vient dans les plaines & lieux découverts. Vertus et Usages. C'eft une des cinq petites racines apéritives : elle eft apéritîve i diurétique , réfolutive : la dofe de la racine ou de l'écorce en poudre eft un gros , & en décoction une demi-once de racine* Extérieurement la décoétion eft déterfive. La racine entre dans le Sirop antinéphrétique, dans l'Eau diurétique de antinéphretique. PLANCHE 148Àparine , Gratteron, Ann, ON fe fert de toute la plante. La racine eft menue , fibreufe. Les tiges s'élèvent, quand elles font accottées, iufqu'àfîxpîeds^ H

The text on this page is estimated to be only 18.37% accurate

AVERTISSEMENT. LA matière médicale de M. Géoffroy m'a fervi dé guide pour l'arrangement, des plantes £c animaux Utiles en Médecine, qui y font contenus, & donr j'avais les defleins. Je les ai fait graver fur cuivre, au nom-* bre de J19 Planches. Ce recueil a paru en Juin 17643 accompagné feulement du nom latin de chaque figure* J'y ai joint une Table générale, imprimée, dans laJ> quelle tous les noms Latins rappellés> font accompagnés des noms François : mais depuis ce temps , plu-* lieurs perfonnes m'ayant repréfenté qu'une explication étoit abfolument néceflaire , pour l'intelligence de mon recueil ôc pour la facilité de s'en fervir , f ai compofé ce petit Ouvrage, dont voici le plan. Je commence par la defcription de la pîantô Ou de l'animal , en indiquant feulement ce que l'eftampe nû fauroit exprimer, comme les couleurs, la hauteur, la tîurée, le pays & autres circonstances. J'ajoute enfuite les vertus généralement reconnues, ainfi que les préparations les plus iimples , qui fouvent ne font pas les moins efficaces , comme infufions, décoctions, poudres. Enfin lorfque quelques parties entrent dans leâ comportions connues &c décrites dans les Pharmaco^ pées, j'en cite l£s titres. Mon recueil d'eftampes étant divifé en cinq Tonieâ j j'ai fait imprimer cet Ouvrage de façon qu'on peut, fi on veut , le partager en cinq , Sz joindre chaque par-6 tie au Tome qu'elle explique» Ceux qui auront l'Ouvrage de Monfîeur Geoffroy * ii'ont abfolument pas befoin de celui-ci; cependant il tie leur fera pas totalement fuperflu > à caufe de plu

The text on this page is estimated to be only 19.03% accurate

'V AVERTISSEMENT. fleurs additions & corrections qu'on y rencontrera,' Ce -qui fuit contient, 1°. l'explication de quelques abréviations, que j'ai fait pour indiquer la durée des plantes; 20. l'explication de plusieurs termes de Botanique, dont je me fuis ferai; 30. l'explication des termes de Médecine, employés dans cet Ouvrage ; 4°. une Table qui défigne les numéros des premières Planches, de chaque titre du premier Se cinquième Tome, relatifs aux pages de cet Ouvrage, comme aufîi les Planches & les pages qui commencent chaque lettre alphabétique du 2mc } jmc g£ ^me Tome. ABRÈVIATIO N-S. Ann. . . Annuelle. . Plante qui vient de graine, & meure tous les ans, après s'être refemée. B. Ann. Bifannuelle. Plante qui poutfe fes premières feuilles avant l'hiver, ne monte en graine que l'année fuivante, & périt après s'être refemée. Viv. . . Vivace. \ . Plante qui fe renouvelle plufieurs années fur la même racine. TERMES DE BOTANIQUE. Exotiques. ..... Plantes arbres , &c. originaires des pays étrangers. Indigènes Plantes , arbres, &c. qui croiflent dans nos climats. Pétale. (un) .... On nomme ainfi les feuilles des fleurs. Etamiae. (une) . . . On nomme ainfi les filets qui s élèvent

The text on this page is estimated to be only 18.84% accurate

V la foutïenr lotfqu'elle eft épanouie , & qui contient le fruit ou les graines : voye\ Planche 59. pédicule. (un) . » • On nomme ainfi une petite tige , au bout de laquelle la fleur eft attachée pat fon calice ; voye% Planche 144, Monopétale On nomme ainlî une fleur qui n'a qu'une feuille en pétale : voyt\ Planche 155. Polypctale On nomme ainfi une fleur à plufieurs pétales : voye% Planche 152. CARACTERES DES FLEURS. Fleurs à examines. . . Sont celles qui n'ont que des étamines 5c point de pétales : voye% Flanche 78. A fleurons Sont celles qui ne font compofées que defleurons , raflemblésdans un calice commun. On appelle fleuron j une petite fleur monopétale, imitant un tuyau ordinairement découpé par le haut,ea cinq pointes : voyqr Planche 205. A demi-fleurons. . . Sont celles qui ne font compofées que ds demi-fleurons. On appelle demi-fleuronr un pétale tourné à fa bafe en portion de tuyau, qui fe développant, s'applatit, s'allonge & eft fouvent terminé a fon extrémité , par trois ou quatre petites dents ou pointes : voye\ PL 222. Radiées Sont celles dont le milieu , qu'on nomme le difque , eft à fleurons , & tout le tour ou couronne eft à demi-fleurons : voye\ Planche 192. En parafol. ..... Sont celles dont l'afTemblage donne l'idée d'un parafol : chaque petite fleur eft à cinq pétales & foutenue par fon pédï* cule ; voye\ Planche 145,. Légumineufes ou papillonacées. Sont celles dont les pétales font difpofés comme la fleur des pois, des lentilles, &c qu'on nomme, en général, des légumes. Le pétale fupéneur s'appelle l'étendard j papillonacées , paraiij

The text on this page is estimated to be only 17.25% accurate

ce qu'elles rappellent l'idée d'un PapiL» Ion : voye% Planche 3 5 4, 'Nota. Toutes les drivantes font monopétales. En cloche Sont celles qui font faites en tuyau éva-» fé , en forme de cloche : voyez PL 64 1 , En entonnoir, . , , Sont celles qui repréfenrent la figure d'un entonnoir : voyez Planche ji. En tuyau.. , , , , , Sont celles qui reflemblent à un tuyau , rond & égal d'un bout à l'autre j il eft ordinairement découpé par le bout : voye^ Planchz 44> En grelot. , ... C'eft un tuyau qui s'étrecit vers le bout ï voyez Planche 656. En gueule ou labiées, Sont celles dont le tuyau fe partage vers le bout en deux lèvres , l'une fupérieure , l'autre inférieure , imitant une gueule ouverte : voyez PL 171. En cafque. . \ . . Sont celles dont la lèvre fupérieure fe recourbe , imitant un çafque : voyez Planche 398. En rnafque. ..... Sont celles dont les lèvres de defTus & de deffous , ferment le tuyau de la. fleur : voyez Ptanche CARACTERES DES FRUITS, 3Les Chatons peuvent s'attribuer aux rieurs & aux fruits, C'eft un aflemblage de calices, qui tous enfemble repréfentenr un cylindre oblong; il y a des chatons mâles de des femelles \ chaque calice du charon mâle porte fa fleur > qui eft ordi-r nairement à éramines & de la femelle fon fruit : voyez Planche 509. Embrion. I ~ , Z ~, '. C'eft le fruit qui commence à naître. Fruits. , Les Botaniftes appellent généralement fruits, tout ce qui renferme les graines, ou femences de toute efpece de plantes ; mais le vulgaire ne nomme fruits que les gros fruits qui fe mangent, comme Pêches a Pommes, Poires , &c.

The text on this page is estimated to be only 16.06% accurate

Vlj gaies. ; ; ; â t ; I ; Ce font les petits fruits des arbres , arbrifleaux , &c. quand ils n'excèdent pas la grofleur d'une olive ordinaire -. voyez Planche 150. v TERMES DE MÉDECINE, A. Acerbe. C'eft un g°ut qui tient de l'aigre Se da l'amer. Adouciffants Remèdes qui corrigent lacreté des humeurs. Agglutlnatifs. . - • Remèdes qui réunirent & tecolent lès plaies. Alexipharmaques ou alexitaires. Remèdes qui réfiftent aux venins, fièvres malignes, pefte, &c. Il y en a pour l'intérieur Se pour l'exté* rieur. Anodins. Remèdes qui calment les douleurs. Antiépileptiques. . . Remèdes contre l'cpilepfie ou mal caduc' Antihyftériques. . . Remèdes contre les vapeurs de matrice. Antifcorbutiques. . Remèdes contre le feorbur. Antifpafmodiques. . Remèdes contre les convulfions. Apéritifs. ..... Remèdes qui rendent les humeurs moins épailTes & plus coulantes. Aftringents Remèdes qui relferrent les pores &: s'oppofent au cours immodéré des humeurs. B. Béchiques. : . . . . Remèdes qui conviennent aux maladies de poitrine. c. Calmants. C'eft la même chofe qu'anodins : voyez ce mot à fa lettre. Carrninatifs, * , . , Remèdes qui diffipent les vents, Cauftiques. Remèdes qui brûlent les chairs. Céphaliques Remèdes bons pour les maladies de la tete.' Cicatrifants. .... Remèdes qui afFermifTent Se deffechent les nouvelles chairs des plaies. Confolidants Remèdes qui fervent à la réunion des plaies. aiv

The text on this page is estimated to be only 15.64% accurate

viij Cordials. Remèdes qui rétablirent les forces abattues. Décoction, . » » • . Préparation de drogues médicinales a qu'on fait bouillir dans quelque liqueur pour en tirer les vertus. Dentrifîqes. Drogues pour nettoyer les dents. Dépilatoires Drogues qui font tomber le poil. péibbftruanrs., ... Remèdes qm enlèvent les obltrudïons ou embarras, cauféspar i epaiiîlfement des humeurs. Deflicatifs Remèdes qui confomment les humidités fuperfïues , intérieurement ou extérieurement. Déterfifs, Remèdes qui nettoient les plaies , en diffolvant les humeurs vifqueufes qui s'y attachent. Diaphoniques. , , . Remèdes qui font difïiper les humeurs , par la tranfpiration. Digeftifs Remèdes qui difpofent à la fuppurarion. Difcuffifs. ..... Remèdes qui dhTolvent de di(fipent les humeurs. Diurétiques. .... Remèdes qui adouciffent l'acrimonie des humeurs & les pouffent par les urines. E. Amériques Remèdes qui excitent le vomilfement. ■EmoUients. •..-.<. rem="" qui="" ramolliifent="" les="" tumeurs="" en="" rel="" fibres.="" errhines.="" ceft="" la="" m="" chofe="" que="" fternutatoires="" voyez="" ce="" moc="" l="" lettre="" f="" difl="" fi="" pondants="" rarifient="" diffolvent="" humeurs="" fortifiants.="" c="" cordials="" :="" mot="" fa="" lettre.="" h.="" h="" capables="" d="" obftructions="" du="" foie.=""/>

The text on this page is estimated to be only 19.49% accurate

Hydragogues. 2 l Remèdes purgatifs , qui évacuent les eaux & les férulîtés. JJyftériques Remèdes qui exciteat les Règles. I. Ineififs • ■ Remèdes qui divifent les humeurs groffieres. Incralfants. ..... Remèdes qui épaiiTiiTent les liquides, leur donnent de la confiftance. Jnfufion. ..... Médicaments qu'on fait feulemenr tremper dans quelque liqueur chaude & non bouillante, pour en tirer les vertus. L. Laxatifs. , 2 2 . . . Remèdes qui lâchent le ventre , &c purgent doucement par bas. M. Mafticatoires Drogues qui fe mâchent, & attirent par la bouche les eaux 8c les férofirés. Maturatifs Remèdes qui difpofent les plaies à fuppuration. N. Narcotîcs Remèdes qui calment les douleurs & procurent l'alfoupilTemenr. Nervins Remèdes qui fortifient les nerfs. o. Ophtalmiques. . . . Remèdes propres aux maladies des yeux. Otalgiques Remèdes bons pour les maux d'oreilles. P, Pe&oraux. C'eft la même chofe que béchique : voyez ce moc à fa lettre. Pénétrants Remèdes acKfs, qui divifent les humeurs. Purgatifs. ..... Remèdes qui purgent par bas feulement. R. Rafraîchi/Tants. . , . Remèdes qui tempèrent la trop grande agitation des humeurs.

The text on this page is estimated to be only 17.43% accurate

X Répercuffifs. . , . , . Remèdes extérieurs, qui repouffent les humeurs en dedans. Réfolutifs Remèdes extérieurs , qui font diffiper par la tranfpiration les humeurs arrêtées dans quelque partie du corps. * s. Spiéniques. . L . . . Remèdes propres aux maladies de la rate; Sternutatoires. . . . Drogues qui excitent 1 eternuemenr. Stiptiques. C'eft la même chofe qu'aftringents ; voyez ce mot à* fa lettre. Stomachiques, ftomachals. Remèdes propres à faciliter la digeftion. Sudorifiques Remèdes qui excitent la fueur. Suppuratifs. ..... Remèdes extérieurs qui facilitent la fuppu ration. T. Tempérants. . ; . . Remèdes qui appaifent la trop grande fermentation. Vermifuges Remèdes qui font mourir les vers ou les chaflent hors du corps. Véfïcatoires Remèdes cauftics, qui attirent les férofités vers la fuperficie de la peau. Vomitifs. C'eft la même chofe quemétiques : voyez ce mot à fa lettre. Utérins. C'eft la même chofe qu'antihyftériques : voyez ce mot à fa lettre. Vulnéraires Remèdes propres à la guérifon des plaies. TABLE DES TITRES ET LETTRES ALPHABÉTIQUES. Tome I. Exotiques, Racines Planche i page i ; Ecorces. ..... 35 27 Bois 38 30

The text on this page is estimated to be only 13.07% accurate

ériges, feuilles 8c fleurs. Planche 40 page $z Fruits & graines. . , 47)7 Sucs, appelles Baumes. 77 >y Réfines folides. ... 82 6o Sucs gommeux. ... 95

The text on this page is estimated to be only 20.19% accurate

Poiffons. .... Planche 660 page 39? Reptiles & Amphibies. . . , 666 410 Oifeaux 676 41 S Quadrupèdes 699 44Z Il y a une erreur dans la Table générale des Planches laquelle commence à Brebis , qui y ejî marquée ^ Pl. 714 , au lieu quelle efi dans la Planche 72.3 . Cette erreur continue de Planche en Planche , jufquà la fin dite PL 730, qui ne doit être que la 719"" ; & cette dernière erreur a caufé celle de 7 jo Planches , qui ejl au titre , au lieu de 7 29 Planches, ADDITION. Plufîeurs plantes ont été tirées de la foule, raflfemblées en pelotons ôc confacrées par les Médecins à différentes indications , comme elles font toutes deffinées dans cet Ouvrage ; mais difperfées chacune à fa lettre. Je les place ici fous les titres de leurs vertus , tels que les Médecins les ont indiquées , avec le numéro de leftampe & celui de la page de cet Ouvrage où elles font décrites. Les plantes vulnéraires qui nous viennent de Suiffe , font aïïez difficiles à reconnoître , parce que les Suilfes les découpent en très-petites parties : & afin qu'on ne les devine pas 1 l'odorat , ils ont toujours recueilli celles qui ne fentent rien. Malgré toutes ces précautions, les Botaniftes les ont dévoilées , fans leur ôter néanmoins le mérite que leur donne le lieu de leur nailfance. Elles font marquées à la fin de cette addition comme les précédentes, avec le numéro des Planches & des pages. Les cinq Plantes èmollientes. L'Acanthe Planche 123 page 91 La Poirée ou Bête 170 118 La Mauve 357 217 La Mercuriale. . 381 23a La Pariétaire 441 163 Les cinq grandes racines apêritives. D'Ache Planche 149 p*ge 106 D'Afperge. . ". .... 158 m De Fenouil. 274 *74

The text on this page is estimated to be only 16.29% accurate

De Perlil. '. • » Planche 450 lfig De Houx-frelon. , . 504 30I i« ««ç petites racines apèritives. D Arrête-bœuf. . . .. Planche 147 page 105 De Câprier. ... 195 De Chardon rolanr. . %Gi De Chiendent. . . 2.91 jg De Garence. ... joo 298 les quatre fleurs cordiales. De Bourrache. . . Planche 175 page 12 1 DeBuglofe. ... igj DeRofe 494 i9 De Violette. . 6n ^Q Les quatre fleurs carminatives. D'Ane th Planche 145 page 104 De Camomille. . %\y De Matricaire. . , De Mélilor. ... Les quatre grandes f -menées chaudes. D'Anis Planche 145 page 104 De Carvi. ... ZOl De Cumin. ... 239 r De Fenouil. ... a74 1er quatre petites femences chaudes. £fA,che Planche 149 ^ Iotf RfAPerfil- • • ■ 450 268 U Amome , dite Sifon. . 5 j4 ? 2 £ X« çaarre grandes femences froides. De Citrouille. . . PIanchÊ ll8 p g De Concombre. . . 1)6 * Ue Courge. . , , e d.m*s. . : ; '* m

The text on this page is estimated to be only 18.78% accurate

tes quatre petites Çemences froîdesl De Chicorée fauvage. Planche ziz page D'Endive, . . . zS6 1 64 De Laitue. . • . 314 1 q6 De Pourpier. • • 280 Les quatre farines résolutives. De grofles Fèves. . . Planche z6S page i?t D'Orge ou Seigle. . 304 ou 5 35 191 ou 3 18 De Lupins. 354 215 D'Orobe. . . • 43 z 2

The text on this page is estimated to be only 9.49% accurate

PRIVILEGE DU ROI. LOUIS, PAR LA GRACE DE DlEU , Roi DE FRANCE et „» Navarre : A nos ames Se féaux Confeillers les Gens te» J« Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de „™l H" T Grand-Confeil, Prévôt de Pans, Bai, Sénéchjux L pvJs & autres noS Jufticiers qu'il appartiendra, Sa^^C™ le fieur de Garsault , Nous a fait expofer ou il ^firpmi, r • | donner au Pubhc un Ouvrage de fa SÇJÏÏftS ^oTE «/7n IT greffe & par écrit dudit Expofant , ou de ceux qui auronrdroh dc lui" des Préfentes s que llmXan"rfî f P ' f°US ,C c™rcei la Librairie , ^t^Tc Su ftiï Avr ^'Sj^TT ^S^OTi^ l'Apptobation /aura été donnée, be Lamoignon?& nÛ-il " L ? 1fCl,eVal,Cr'JCha"cdlerde ^ancelefieur Bibliorheque publiquf un dans c S",,™ deU*!Xe'"Plai^ -tre dans celle dudit fleur i Lxtn de/^ Château du Louvre, un cher & féal cLvaber Vi, N?Ni & U" danS celle de 1TOtre lefcurDEMA^ &,Garde d« Scea"

The text on this page is estimated to be only 16.69% accurate

oui fera imprimée tout au îong âu ffommerteeffl cnt , ou à la fin dudtc OwfïàS ce , Toit tenue pour duemenc lignifiée , Se qu'aux copies collationnées par' l'un de nos amés & féaux Confallers , Secrétaires, fot foit ajoutés comme à l'original. Commandons au premier- notre Huiffiçt ou Sergent , fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles , tous Adcs requis Se nécetfaires , fans demander autre penniflion , Se nonobftant clameur de Haro , Charte Normande , & Lettres à ce contraires. Car tel cft notre plailîr. Dominé à Paris, le treizième jour du mois de Février, l'an de grâce mil fept cent foixante-cinq , & de notre Règne le cinquantième, Par le Roi en foa Confeil. LE BEGUE. Regifiré fur le Regiflre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale dei 'Libraires & Imprimeurs de Paris , N" . r}8 , fol. iSj , conformément au Règlement de 171? > qui fait difenfes , article 41 , à toutes perfonnes , de quelques qualités 6- conditions qu'elles foient , autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, ni faire afficher aucuns livres, pour les vendre en leurs noms, fait qu'ils s'en diftnt les Auteurs ou autrement ; & à la charge de fournir à la fufdite Chambre , neuf Exemplaires preferits par, l'article 108, du même Règlement. A Paris, ce n Avril 176$. Le B r e t 0 M » Syndicl EXPLICATION

The text on this page is estimated to be only 10.91% accurate

EXPLICATION ABREGEE De 71 9 Plantes, tant étrangères, que de nos climats& de 134 Animaux en 73o Planches, gravées m taille-douce, fur les DefTeins de M, de Garsault & mifes au jour en Juin i764, fuivant rordrc ^ .Livreintitule, Matière Médicale de M. GeoffroyOuvrage utile à toutes Matières médicales EXOTIQUES, Tome I, RACINES. PLANCHE PREMIERE, Acorus verus, Acore vrai, Viv. N fe fert de fa racine. La racine eft groffe du doigt , longue , rampant obliquement en terre, genouillée, verdâtre en dehors, blanche & fpongieufe en dedans : fon odeur n„e W arom^q^3 agréable } fon goût eft aromadgué , acre , amer. «^£"7 n>aP OU enviro"> d™ verd ^ fl! ' f " ^ > d Un S°Ut âcre , un peu amer. Les fleurs font a éramines, Semblées en un épi long, qui fort vers les deux tiers d'une feudleplus époiHe Se plus ferme que autres ; il leur fuecede un fruit à trois loges : elle fleurit en été. «te vient aux lieux humides de la Tartane & de la Lithuanie A

The text on this page is estimated to be only 15.32% accurate

z EXOTIQUES. & le long des ruilTeaux , en Flandre , en Lorraine & en An* gleterre. Nota. Il nous vient des Indes & d'Afic une racine 6' Accrus , qui ne diffcrc de la précédente, qu'en ce qu'elle eft plus mince; d'ailkuis elle a les mêmes venus. Vertus et Usages. La racine eft ftomachale, carminativej adouciflante , fjpléniqué , hyftérique , alexipharmacjue. Elle entre dans la Poudre Céphalique odorante de Charas , hThériaque , l'Orviétan , le Mirhridate, l'Elechiaire de baies de Laurier , les Troehifques de Câpres. Acorus aduhêrinus, Faux Acore, Viv. Cet Acore eft de nos climats ; c'efl: un luis à fleur jaune, trèscommune dans les prés bas & humides : elle fleuri: en été. La racine eft aftnngente intérieurement. o PLANCHE 2. Angelica, Angélique, B. Ann, Nfe fert principalement de fa racine, quelquefois de fei r graines. „ . . La racine eft grotte de trois doigts, molle Se fucculente, noire &C ridée en dehors , blanche en dedans ; fon odeur eft aromatique, agréable; fon gont eft âcre & amer. La tige s'élève jufqua quatre pieds de haut, creufe : les feuilles verd foncé. . Les fleurs font difpofées en parafol , blanches; il leur lac-, cède deux graines accollées , oblongues, cannelées, bordées : elle fleurie en été, „ Elle vient en Bohême , fur les Alpes , Pyrénées & Montagnes d'Auvergne : on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. La racine eft ftomachique , cordiale , vulnéraire antipeftilentielle , alexipharmaque : en temps de pefte , on fait intuler racine & graines dans le vinaigre; on la fent, on la macne , on en boit, on la confit, on en prend à jeun, on la met en poudre pour en faupoudrer les vêtements. Elle entre dans l'Orviétan , dans la Poudre Bczoardique , l'Eau des Carmes, l'Emplâtre pour les ganglions.

The text on this page is estimated to be only 17.73% accurate

TOME PREMIER. m o PLANCHE 3. Anthora , Anthore, Viv. iN fe fèrt de fa racine. T ' La racine eft prefque toujours compofée de deux, ou trois tubercules , rarement d'un feul ; ils font tantôt arrondis tantôt oblongs , bruns en dehors , blancs en dedans ; fon ctOUc eft acre & amer. to La plante s'élève à neuf pouces de haut» quelquefois du double. La tige eft légèrement velue; les feuilles font verd foncé en deffus, blanchâtres en de(Tous , ameres, La fleur eft à cinq pétales irréguliers, d'une odeur aflez agréable ^ le piftil devient un fruit cornu, rempli de graines ridées noirâtres : elle fleurit en été. Elle vient fur les Montagnes de Suiûe > de Savoie , Dauphiné Ligurie. Vertus et Usages. La racine eft inci'hVe , vermifuge , alexipharmaque ; on la donne, pour remède, contre le poifon de l'aconit. La dofe eft» depuis un fcrupule, jufqu a un gros. Elle entre dans l'Otviétan. PLANCHE 4. ^RISTOLOCHIA) ARISTOLOCHE. Arijîolochia rotunda 9 Viv. kN fe fert de fa racine. * La racine eft grofle de trois pouces de diamètre , arrondie , fohde , brune en dehors , jaunâtre en dedans : fon gout elt acre, amer, aromatique. Les tiges font farniente ufes, les feuilles verd foncé. Les fleurs font monopétales, de couleur de pourpre très-brun j si leur fuccede un fruit rond , divifé en fix loges , remplies ds graines noirâtres ; elle fleurit en été. Elle vient en Languedoc &c en Provence. Arijîolochia longa , ViV. On fe fert de fa racine. A %

The text on this page is estimated to be only 17.56% accurate

4 EXOTIQUES. La racine eft ronde , mais oblongae , grotte d'un pouce j que?quefois du bras , & alors longue d'un pied : de la même couleur Se gour de la précédente , mais moins fort. Les tfges font quarrées , farmenteufes , longues d'un pied 8c demi , foit droites , foit rampantes ; les feuilles font verd foncé. Les fleurs font monopétales , verd blanchâtre i le fruit , q«i eft en poire, eft rempli de grains larges , rouge brun : elle fleurit en été. PLANCHE 5» rArifiolochia clematitis , Arïftoloche clématite, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft feparée en grand nombre de branches ferpentantes, & s'enfonçanr profondément en terre, aifez menues, brunes en dehors , jaunâtres en dedans, d'une odeur plus forte que les précédentes , d'un gour amer. _ _ Les tiges font droites , longues d'un pied & demi , cannelées -, les feuilles verd pâle. Les fleurs font monopétales, jaunâtres \ il leur fuccede des fruits qui renferment des graines plus grofles que celles des précédentes : elle fleurit en été. Elle vient en Languedoc Se aux environs de Paris, dans les vignes Ariftolochia piftolockia , petite Ariftoloche,Viv. On fe ïert de fa racine. La racine eft compofée de plufieurs fibres menues , longues , partant d'un centre commun , jaunâtres -, fou odeur eft aromatique , aftez agréable \ foa gout eft acre & amer. Les ti^es font longues de fept ponces , cannelées; les reuilles comme celles de l'Ariftoloche ronde, mai* plus petites. _ Les fleurs font monopétales , d'un jaune verd, quelquefois noires; d'ailleurs les fruits & graines femblables en plus petit, à l'ariftoloche ronde : elle fleurit en été. Elle vient en Languedoc. Vertus des quatre Aristoloches. Les racines font céphaliques , pedorales, hyftériques, alexipharmaques, vulnéraires i la ronde eft plus atténuante, la Ion

The text on this page is estimated to be only 17.24% accurate

TOME PREMIER. 5 01as déterftvej les deux dernieces ont les mêmes vertus, luis plus foibles : la dofe , en poudre, eft , depuis un fcrupule, '^La^ronde entre dans le Diateflaron de Charas , dans l'Hiéra L>iacolocyntides , les Trochifques de Câpres, l'Huile de Scorpion corapofée , l'Onguent Apoftolorum , l'Emplâtre Divin ; la ronde &c la longue dans l'Emplâtre pour les hernies ; la longue dans l'Emplâtre Manus Dei , dans. l'Eau Vulnéraire de Léméry j la clématite dans la Thériaque d'Andromaque l'ancien -y la petite dans l'Orviétan de Charas. PLANCHE 6. Bchen album , Béhen blanc, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft longue, noueufe , s'étendant de côté & d'autre, comme celle de la réglhTe , Pl. 17, à laquelle elle reffenible en tout ; mais elle tire fur le blanc. La tige devient haute d'un pied & demi ; les feuilles d'en bas font à longues queues ; les fleurs font à fleurons jaunes , ainfi que le calice ■■, il leur fuccede des graines aigtetées : elle fleurit en été. Elle vient fur le Mont Liban & en d'autres endroits de la Syrie. Vertus. La racine eft; fortifiante : elle eft peu en ufage. Elle entre dans l'Electuaire de Perles de Mefvc. PLANCHE 7Carllna y Chardoneretce , Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft grofle du pouce , s'étendant beaucoup en s enfonçant en terre, roulfeen dehors, blanchâtre en dedans; fon odeur eft aromatique , agréable ; fon gout eft aromati-. que , acre. Elle n'a point de tige ; les feuilles font verd pâle : elles onj environ un pied de long. La fleur eft radiée , blanche; fondifque eft à fleurons blancs; Ai

The text on this page is estimated to be only 17.45% accurate

* EXOTIQUES. les embnons deviennent des graines aigretées : elle fleurit en été. Elle vient fur les Alpes, fur les Pyrénées & au Mont d'Or en Auvergne. PLANCHE 8. Carlina, Ixia , Caméléon blanc, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft plus longue & plus grotte que la précéda «tej fon odeur efl: agréable. Elle teflemble beaucoup à la précédente; les feuilles font blau, châtres, & velues en deflbus : elle fleurit en écé. Toute la plante, y compris la racine, eft abreuvée d'un lait gluant- qui fe durcit comme de la cire , & devient noir étant manié. Elle vient aux mêmes lieux que la précédente. Vertus et Usages des deux Cariihes, Elles ont à peu près les mêmes vertus ; leurs racines fonr alexipharmaques , vermifuges. La première eft préférée pour chafler les vers plats. Les deux Carlines s'emploient dans le Vinaigre Thériacal , l'Orviétan de Charas & celui de Frédéric .Offman. PLANCHE 9China Orientalis , S'quine d'Orienc, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine efl: grotte, dure, inégale, noueufe, garnie de quelques fibres longues , d'une couleur roux foncé en dehors, blanchâtre en dedans, fans odeur, d'un gout terreux, prefqu'inlîpide. Les tiges , ou farments , s'élèvent de deux; à trois pieds &c plus : lçs feuilles font verd noirâtre. Les fleurs font à parafol , d'un jaune verd ; il leur fuccede un fruit reffemblant en tout à une cerife , dont la pulpe efl fpongieufe, couleur de chair, qui contient quatre, ou fix femences, taillées en croiflant.

The text on this page is estimated to be only 18.17% accurate

TOME PREMIER. 7 Elle vient à la Chine. China Occidentalis , Squine d'Occident, Viv. La racine ne diffère de la précédente, qu'erg ce qu'elle eft. $un roux plus brun en dehors, & plus rougeâtre en dedans. Les feuilles font plus allongées. Elle vient de a Nouvelle Ëipagne, du Pérou, du Bréfil. Vertus des deux Squine s. La racine eft apéritive , fudorifîque , céphalique : les vertus de l'Occidentale font plus foibles. PLANCHE IO. Contrahyerva y Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft écailleufe , noueufe , s'enfonçant obliquement en terre , garnie de beaucoup de fibres bianchues qui s'étendent de tous côtés -, fon gout eft brûlant. Elle n'a point de tige; les .feuilles, avec leurs queues, ont environ un pied de long : elles font verd brun. Les pédicules des fleurs font à peu près aufiï longs que les queues des feuilles. L'enveloppe commune où font nichées les fleurs, qui font très- petites , à éramines, eft lifte & verte en deffous. Les petites écailles, qui bordent en defliis le tour d# l'enveloppe , font: noirâtres > les graines, qui font failiantes à moitié fur le plateau , provenant des embrions de rieur , font ttès-blanches Se très-tendres. Elle vient au Mexique, au Pérou. Vertus et Usages. La racine eft ftomachaie, carminative , alexiraire. Elle entre dans la Picre de Contrahyerva de la Pharmac, de Londres, la Poudre de la Comtefte de Kent, de Pactes d'Ecieviftes de Charas.

The text on this page is estimated to be only 14.34% accurate

? EXOTIQUES. PLANCHE II. Cofius „ Viv> i^VN fe fert de fa racine. La racine eft rampante, tubéreufe, tendre & fucculente, fibree, blanche; fort odeur eft fbible, tirant fur celle du Gingembre, Pl. j4J fon gouc eft doux. Les tes vone jufqu'à trois & quatre pieds de haut, pourprès lires, hufantes : les feuilles font vertes, luifantes/ Wn, i leKa eCailleHfe ' ?°?e leS écailles fonc ro«g« de corail _ forcent les fleurs monopoles , auxquelles fuccede un fruit fép e en trois loges remplies de graines triangulaires , bleues, puis brunes, blanches en dedans, fenwntle Gingembre, Elle vient au Malabar, à Surinam, au BréfiL Vertus et Usages. La racine eft céphalique , pectorale , apéricive. Elle entre dans la Thériaque d'Andromaque l'ancien, feMithndat 1 Orviétan le grand Philonium, l'Eleduaire Caryo, coftin, les Trochifques d'Edichtoon. PLANCHE 12, Curcuma longa Terre mérite , Viv, ON fe fert de fa racine. La racine eft grofTe du doigt, ronde, noueufe , pâle en dehors, jaune en dedans , dune odeur agréable , d'un gout nuiJeux, acre , amer. & Les feuilles font d'un beau verd , elles ont ttois pieds de W Les fleurs , qui viennent fur une tige à part , font à trois, eu quatre pétales , d'une couleur jaune, pâle, ou purpurine: il leur fuccede de petits fruits à trois loges qui contiennent des graines rondes , brunes : elle fleurit en été. Curcuma rotunda 3 Curcuma rond, Viv. Elle refiemble en tout ï la précédente, excepté que fa racine tft plus grofle que le pouce, & plus jaune,

The text on this page is estimated to be only 20.72% accurate

TOME PREMIER. $ Les deux Curcuma viennent aux Indes Orientales, Vîktvs de s deux Curcuma. La racine eft très-apéritive , défobftruante , hyftérique. Les vertus du fécond font plus fdîbies, PLANCHE 13. Cyperus longus y Souchet long, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft longue, menue, noueufe , genouillée rouge , noirâtre en dehors , blanchâtre en dedans, d'une odeur agréable , d'un gout aroma-rique , agréable , un peu acre. La rige devient haute d'un pied & demi. Les fleurs font à étamines, rallemblées en épi long : il leur fuccede des graines triangulaires, dures , couvertes d'une écorce noire : elle fleurit en été. Elle vient en Provence & dans les prairies humides. Cyperus rot undus , Souchet rond, Viv, On fe fert de fa racine. La racine fe partage en plufieurs tubercules, arrondis en façon d'olives , cannelés , liés enfemble par des fibres intermédiaires, rougeâtres en dehors, blanchâtres en dedans. Les feuilles , rieurs Se graines font fernblables au précédent : elle fleurit en été. Elle vient le long du Nil Se dans les Marais d'Egypte. Cyperus Americanus , Souchet d'Amérique , Viv. On fe fert de fa racine. Cette plante s'élève jufqu'à deux à trois pieds de haut. La tige eft verd clair , creufe , par anneaux , qu'on ne voit bien que quand elle eft féchée. Les fleurs & graines, comme aux précédents : elle fleurit en été. Elle vient dans l'Amérique. Vertus des trois Souchet s. La racine eftincifive, apéritive, ftomachale , hyftérique : la dote, en fubftance , eft jufqu'à un gros; Se en infunon, depuis deux gros, jufqu'à une once.

The text on this page is estimated to be only 18.33% accurate

© . EXOTIQUES. PLANCHE 14. Diclamus albus , Dictame blanc j Viv. ON fe fert de l'écorce de fa racine. La racine eft grolfe du doigr, bran ch u e , fibrèttfej fort ecorce eft blanche \ fon odeur eft force &: agréable j fon gouc eft un peu amer tk légèrement âcre. La rige s'élev© jufqu'à trois pieds : les feuilles font verd foncé delfus, Se verd clair deffous , luiftntes. Les fleurs font à cinq pétales blancs, ou purpurins, garnies de lignes d'un pourpre plus foncé \ il leur fuççede un fruit compofé de cinq gaines plates, en manière de tète, qui renferme des graines noires , taillées en poires : elle fient a au pria-temps. Elle vient en Languedoc, dans les Forêts : 011 la cultive dans, les jardins. Vertus et Usages. L'écorce de la racine efl: cordiale, utérine, diurétique, fudorifique , alexipharmaque ; la dofe efl; , en fubftance , depuis, un demi gros jufqu'à deux gros , & en infufion , jufqu'à une once. Elle entre dans la Poudre de Perles , de Pan non ie , Antiépileptique , l'Opiat de Salomon , l'Orviétan , les Trochifques de Scille , l'Huile de Scorpion compofée. il I I ||||||ipin.i.u>^»t^T«mit.wi ...>.m.M .... jjBHWP— " — I IMJ.UI ...iW PLANCHE If. Doronicum Ko manu m , Doronic Romain, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft petite , noueule , en queue de Scorpion , ferpentant obliquement, fibrée , jaunâtre en dehors, blanchâtre dedans ; fon gout eft douceâtre , vifqueux , un peu ftiptique, La tige s'élève de trois pieds, duvetée, cannelée; les feuilles d'en bas font verd clair, couvertes d'un duvet lin. Les Heurs font radiées, jaunes; il leur fuccede des graines noirâtres, aigretées : elle fleurit au printemps. Elle vient fur les Alpes.

The text on this page is estimated to be only 19.59% accurate

TOME PREMIER. u Vertus. Cette racine patte pour dangereufe , employée récente j maïs étant feche, elle entre dans le Diambra de Mefve , le Diamargaritum chaud, le Diamofchus, l'Eled.uaire de Perles, Ré, joaiCaat, la Confedion délivrante. Doronïcum Arnica, Doronic d'Allemagne, Viv. On fe ferr de fa racine, des feuilles, des fleurs. La racine eft oblongue , fibreufe, d'une odeur agréable , d'un gout aromatique, acre amer. La ti°e s'élève d'un pied : elle eft velue \ les feuilles d'en bas reflemblent à celles du Plantin velu : elles ont quelques poils. Les fleurs & les fruits font en tout femblables au précédent: die fleurit au printemps. Elle vient fur les Alpes & fur les Montagnes d'Allemagne, Vertus. La racine eft diurétique, hyftérique. Les feuilles & fleurs font diurétiques , fudorifiques , quelquefois vomitives. La dofe eft, depuis une pincée , jufqu'à deux. Les fleurs , feuilles Se racines , en poudre , font fternutatoires. PLANCHE lé. Galanga major y grand Galanga, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft grotte , noueufe , rampante , garnie de tubercules , rougeatre en dehors , blanchâtre en dedans. Les tiges sJélevent jufqu àfept à huit pieds , fimples : les feuilles fonc lilfes , vertes. Les fleurs viennent en grappes au haut des tiges : elles font à quatre pétales blanchâtres ; il leur fuccede une baie rougeatre, contenant trois graines taillées en coeur. La plante vient au Malabar & dans l'ille de Java. Vertus. La racine eft ftomachique , céphalique , cordiale, utérine, carminative. La dofe eft , depuis quinze grains , jufqu'à un demigros en fubftance, & depuis un demi-gros jufqu'à deux gros et* infufion.

The text on this page is estimated to be only 19.29% accurate

»i EXOTIQUES. Gentîana, Gentiane, Viv. On fe fert de fa racine. La racine eft épaiïïê d'un , ou deux pouces , longue d \m pied, fongeufe, branchue, brune en dehors , d'un jaune rouffeâtre en dedans -y fon gout eft fort amer. La tige eft haute de trois à quatre pieds , 8c plus j les feuilles font liftes , luifanres. Les fleurs font jaune pâle il leur fuccede un fruit rempli de graines rougeâtres , rondes , applaties , bordées d'un feuillet, membraneux : elle fleurit en été._ Elle vient fur les AJpes , les Pyrénées & les Montagne* d'Auvergne. Vertus et Usages. La racine eft apéritive,. défobftruante , utérine, fébrifuge, ftomachale, vermifuge, alexipharmaque. La dofe eft, depuis un demi gros , jufqu a deux gros. Extérieurement elle eft vulnéraire , déterfive. Elle entre dans le Vinaigre Thériacal, la Thériaque d'Ândromaque l'ancien, le Diateiïàron , le Mid-uidat, l'Orviétan, le Diafcordium , l'Opiat de Salomon , la Poudre contre les vers , la Décoction amere de la Pharmac. de Londres , l'Infulîon amere Chalibée , la Teinture amere ftomachique. PLANCHE !?• Glycyrrhi^ai RéglifTe , Viv.. ON fc fert de fa racine. La racine eft groiïe du doigt , longue, fàrmenteufë , rouf. feâtre en dehors, jaunâtre en dedans j fon gout eft doux. La tige s'élève jùfqu'à cinq pieds &c plus ; les feuilles font verd clair. Les fleurs font bleuâtres ; il leur fuccede une goufle roufteâtre , contenant des graines de la forme d'un rein : elle fleurit en été. Elle vient en Efpagne , en Italie , en Allemagne , en Languedoc. Vertus et Usages, La racine eft peclrorale , adouciffante. Elle entre dans le Sirop de Guimauve , de Jujubes , de Chî

The text on this page is estimated to be only 19.99% accurate

TOME PREMIER. I5 torée compofé, de Pas d'Ane compofé , de Tortues, Antiafthluatique , les Tablettes de Guimauve compofées , la Poudre -Dbtiaffacanïh, Raffraîchiffante de Charas , de Rofes aromatiques le Catholicon double, l'Ele&uaire lénitif, dePfyllium, Jes Trochées de Gordon , de Diarrhodon. PLANCHE l8. Veratrum flore fubviridi, Ellébore blanc à fleur verce, Viv. ON fe fert de fa racine, La racine eft groffe du pouce & plus , oblongue , nombreufe, brune en dehors, blanche en dedans, d'un goutâcre, aftringent, im peu amer, répugnant. La tige a deux à trois pieds de haut ; les feuilles lont verd clair, un peu velues. Les fleurs font à fix pétales , en rofe , verd blanchâtre ; il leur fuccede un fruit à trois gaines applaties , dans lefquelles font des graines oblongues , Dlanchâtres , bordées d'une aile membraneufe : elle fleurit au printemps. Veratrum flore nigro , Ellébore blanc à fleur noire. Cette plante diffère de la précédente, principalement en ce que fa tige eft plus haute , & que fes rieurs font d'un rouge noir. Ces deux plantes viennent fur les Alpes, les Pyrénées, &C fur quelques Montagnes de France. Vertus des bêux EliÉbores blancs. La racine eft purgative , vomitive , mais trop violente ; ce qui fait qu'on ne s'en ferr plus intérieurement. Extérieurement la poudre eft un puiflant fternutatoire. PLANCHE 19' Hellehorm niger flore rofeo , Ellébore noir à fleur rofe, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft tubéreufe , noueufe , fibrée , noire en dehors, blanche en dedans j fon odeur eft forte ; fon goutâcre, un peu amer.

The text on this page is estimated to be only 21.20% accurate

«4 EXOTIQUÈS. Elle n'a point de tiges ; les queues des fleurs ont huit pouces de long % les feuilles font verd foncé. Les fleurs font à fix pétales en rofe , purpurines ; il leur fuccede un fruit compofé de cinq , ou lix goufles , terminées etl cornes, contenant des graines oblongues, luifantes, noirâtres : elle fleurit au printemps. Elle vient fur lés Alpes , les Pyrénées; Hellehorus niger Orientalis , Ellébore noir d'Orient j Viv. On fe fert de fa racine. La racine efb femblable à la précédente, mais plus groffe& plus longue : elle n'a point d'odeur ; fon gout elt fans âcreté , mais très-amer. La tige , qui porte les fleurs , a plus d'un pied de haut ; les feuilles font plus amples 8c plus longues. Les rieurs , capfules & graines , font entièrement femblables : elle fleurit au printemps. Elle vient aux Mes d'Anticire , de Négrepont , fur le bord du Pont-Euxin , en Afie , au pied du Mont Olympe. PLANCHE 20. Hdleborus niger flore viridi , Ellébore noir à fleut verte, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft fibreufe , mais plus mince , & moins noire que les précédentes : elle reffemble en tout à la première j les fleurs de celle-ci font verd pâle : elle fleurit au printemps. Vertus et Usages des trois Ellébores. La racine eft un purgatif violent : la do fe eft, en fubftance, depuis quinze grains, jufqu'à deux fcrupules; en décodtion , depuis un gros jufqu'à deux ; en extrait, dans l'eau de pluie, depuis douze grains jufqu'à un fcrupule, ou demi-gros. Extérieurement elle eft vulnéraire déterfive. Elle entre dans l'Extrait Catholique , Panchitmgogue , Catholique 8c Cholagogue de Rolfincius, les Pillules de Matthieu, Tartareufes , le Sirop d'Ellébore , l'Hiéra Diacolocyntidos , l'Electuaire de Séné.

The text on this page is estimated to be only 18.84% accurate

TOME PRÉMIU. îS "ffota. On ne fc fert plus guères de l'Ellébore pour purger. L'AmiJalappa ojf} Belle de nuit, Viv. On a cru que le Jalap é:oic la racine de la Belle de nuit., On fe fert de fa racine. La racine eft oblongue , greffe, en forme de navet , pefante, noirâtre en dehors, grife en dedans; fongout eft un peu acre. La rige devient haute de trois pieds y les feuilles font verd ■obfcur. Les fleurs font monopétales : elles varient en couleur, ou jaunes , ou panachées de blanc , & de rouge , & de jaune j il leur fuccede un fruit à cinq angles , noirâtre , contenant des graines oblongues , roufleâcres : elle fleurit en été. Elle vient en Amérique; on la cultive dans les jardins. Vertus et Usages. La racine eft purgative, hydragogue ; la dofe, en fubftance; ■eft depuis douze grains jufqu'à un fcrupule. Elle entre dans l'Electuaire hydragogue, antihydropique , l'Extrait Catholique & Cholagogne, les Pilules pour la goutte, ■cachectiques , le Sirop hydragogue , apéritif cachectique de Charas. PLANCHE 21. HelUborus niger huphtalm'i flore , Viv. ON fe fert quelquefois , mais mal à propos , de cette plante , qui a la racine femblable à l'Ellébore noir , mais qui eft une efpece d'Adonis , dont la racine n'eft nullement purgative ; il eft haut d'un, pied j la fleur jaune, en rofe. // fleurit au printemps. PLANCHE 22. Imperatoria , Impératoire , Viv. ON fe ferr de fa racine Se graine. La racine eft grolfe du pouce , oblique, ferpent.inre , très-fibrée, brune en dehors, blanche en dedans, d'une odeur, très-pénétrante, d'un gout aromatique, très-acre.

The text on this page is estimated to be only 18.32% accurate

V* EXOTIQUE S: La tige a depuis un pied & demi jufqu'à deux pieds de haut j cannelée, creufe ; les feuilles font d'un verd agréable. Les fleurs font en parafai , blanches ; il leur fuccede deux graines accollées, applaties, ovalaires , rayées faiblement , bordées d'une aile très-mince : elle fleurit en été. Elle vient dans les Alpes ôc les Pyrénées. Vertus et Usages. La racine ôc graines font fndoriftques , carminatives , ftomachiques , pectorales, alexipharmaques. La racine entre dans l'Orviétan Ôc le Vinaigre Thériacal de Charas. Ipecacuanha Virginiana > Ipécacuanha de Virginie j Viv. On fe fert de fa racine ; on la fubftîtue au véritable, dont la plante n'eft pas encore connue. La racine eft ligneufe > noueufe à la cime , fibreufe. Les tiges font dures , cannelées , d'un rouge foncé , liftes j hautes d'un pied Ôc demi j les feuilles foht un peu velues. Les fleurs font à cinq pétales blanchâtres , panachés de rouge ; il leur fuccede un fruit compofé de cinq embrions , qui contient cinq graines oblongues , pointues , difpofées en rond i elle fleurit en été. Vertus. La racine eft antidyfentérique ; mais fa vertu Sfê plus faible que le vrai Ipécacuanha^ PLANCHE 2,3* Iris Florentina, Iris de Florence s Viv. ON fe fert de fa racine. La plante entière ne diffère prefque point de la fuivante , fînon que la racine eft plus groffe , plus grande & plus odorante , que les feuilles tirent fur le verd de mer , & que les fleuïî ont moins d'odeur , ôc font d'un blanc de lait : elle fleurit ait printemps. tris

The text on this page is estimated to be only 17.81% accurate

TOME PREMIER. J? Iris nofiras , Iris, Flambe, Viv. On fe fert de fa racine. La racine eft ridée, genouillée, fibreufe en de (Tous, fe répandant vers la furface de la Terre y Ton odeur eft forte ; mais en féchant , elle devient agréable. Les feuilles fonc longues d'un pied & demi. Les rieurs font pourpre violet , ornées de veines blanches il leur fuccede un fruit obîong , relevé de trois côtes , partage en trois loges , remplies de graines oblongues , rondes : dU fleurit au Printemps. Vertus et Usages dés deux Iris. La racine d'Iris de Florence eft incifive , pectorale : la dofe » en poudre, eft depuis un fcrupule jufqu'à un gros. Extérieurement elle eft fternuratoite. Elle entre dans la poudre Diarcos de Prévôt, la Confection Rébécha , les Trochifques Béchiques , la Poudre Céphalique. odorante, la Thériaque , la Poudre fternutatoire , l'Onguent mondificatif d'Ache , la pommade des Boutiques , l'Emplâtre Diachilon avec l'Iris , le Diabotanum. La racine d'Iris noftras eft un fort purgatif hydragogue : la oofe du fuc eft depuis deux jufqu a trois onces. Extérieurement elle eft fternutatoire. Elle entre dans l'Huile d'iris , l'Onguent Agrippa. PLANCHE 24. Meitm athamandeum , Meum, Viv. ON fe fert de fa racine , quelquefois des graines. La racine eft partagée en pluiîeurs branches , grades du petit doigt , longues de neuf pouces , s'enfonçant obliquement en terre, moclleufes, un peu gommeufes ; fon odetu eft aifez agréable, tirant fur celle du panais, mais plus aromatique : fon gout eft un peu acre &c amer. Les tiges , qui portent les fleurs , font environnées de feuilles , dont les queues ont un pied de long , Ôc cannelées : elles font odorantes, d'un gout amer, un peu acre. Les fleurs font en parafol , Maïiches ; il leur fuccede deux graines accollées , oblongues, cannelées, qui font odorantes. B

The text on this page is estimated to be only 20.95% accurate

iS EXOTIQUES. ameres , un peu acres : elle fleurit au Printemps, Elle vient fur les Montagnes d'Italie, d'Efpagne, de France, d'Allemagne , d'Angleterre. Vertus et Usages. La racine eft încifive , pectorale : la dofe , en fubftance , eft depuis un demi-gros jufqu'à un gros j en infufion , depuis un gros jufqu'à deux. Elle entre dans le Mùhridat , la Thériaque , le Vinaigre Thériacal. PLANCHE 25". Nardus, valeriana Celtica , Nard Celtique, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft rampante à la fuperficie de la terre , garnie de petites écailles feches \ fon odeur eft forte, fon goût eft aromatique , acre , un peu amer. La tige a neuf pouces de haut; les feuilles d'en bas jauniffent en Automne. Les fleurs font monopétales , en entonnoir découpé en pluheurs parties , de couleur pâle ; il leur fuccede une petite graine longue , aigretée : elle fleurit au printemps. Toute la plante imite l'odeur de la racine de petite Valériane, Pl. 610, Elle vient fur les Alpes & aux Montagnes de Gènes & de la Ligurie. Nardus , valeriana Alpinay Nard des Alpes, Viv. On fe fert de fa racine. La racine eft tubéreufe , de longueur indéterminée , fibrée à fa partie inférieure ; fon odeur approche de celle de la petite Valériane, PL 610. La tige eft haute d'un pied Se demi ; les feuilles font verd foncé. Les fleurs 3c leur odeur reflemblent à la petite Valériane: tlk fieutit au printemps.

The text on this page is estimated to be only 17.85% accurate

TOME PREMIER. PLANCHE 2.6. N ardus } valcriana Montana, Nard de Montagne IV. ON fe fert de fa racine. La racine eft longue , épaifTe, rubéreufe , chevelue j fou odeur eft agréable, femblable au Nard Indien , mais plus vive; fon gouc eft amer. La tige s'élève de près de cinq pieds, creufe , rougeârre. Les fleurs font purpurines , fembiables , ainfi que les-graines» à la Valériane , PI. 609 : elle fleurit au printemps. Elle vient fur les Pyrénées. Vertus et Usages des trois Nards. La première a les mêmes vertus que le Nard Indien , dont la plante eft inconnue jufqua préfent, mais dont la racine nous vient de la grande^ Ifle de Java : elle eft alexitaire , céphalique , ftomachique, néfrétique. La dofe , en poudre, eft depuis tut demi-gros jufqua un gros j & en infufion, jufqua une demionce. Les deux fuivantes ont à peu près les mêmes vertus , mais plus foibles. Le Nard Indien entre dans la Poudre aromatique de Rofes, Diarrhodon, la Thériaque, le Mithridar, le grand Philonium , la Bénédicte laxative , l'Hiéra Picra , l'Hiéra de Coloquinte s les Trochifques de Camphre , d'Hédichroon , les Pilules fétides, le Sirop de Chicorée compofé , l'Huile de Nard, de Scorpion, l'Onguent Martiatum. PLANCHE 27. ON fe fert de fa racine. La racine eft grolfe du petit doigt : elle a trois pouces de long, reffemblant à celle du Panais, Pl. 44i, charnue, partagée en deux branches : elle a l'odeur du panais & le gout du Chervis, Pl. 548, un peu amer. La tige eft haute de deux pieds , creufe ; les feuilles yerd Sa*« £ 1

The text on this page is estimated to be only 17.93% accurate

io EXOTIQUES. Les fleurs font en parafai , blanches ; il leur fuccede deux graines accollées , cannelées, Les petits bourgeons , qui viennent à la bafe des feuilles , font charnus, de la groffeur d'un pois j ils tombent &c reproduifent une nouvelle plante : elle vient au Japon & à la Chine. Vertu s. La racine eft fortifiante, pectorale: la dofe eft un gros & demi, Gins-cng^ Y iv. On fe fert de fa racine. La racine eft gtoffe du petit doigt, a un , ou deux pouce? de long, eftpattagée en deux branches , tranfpatente , rouffeàtre en dehors, jaunâtre en dedans, d'une odeur aromatique, allez agréable : fon gout eft aromatique , un peu acre , amer. La tige a un pied de haut. Les rieurs font en parafa] ■ il leur fuccede une baie arrondie, partagée en plufieurs loges, chacune contenant une graine applatie, en forme de rein : elle fleurit au printemps. Elle vienc à la Chine, dans les épaiffes forêts, en Tartane Se en Canada. Vertus. La racine eft fortifiante, nervine : la dofe eft, en fubftance, depuis un fcrupule jufqu'à deux ; & en infufion, depuis un gros jufqu'à deux. PLANCHE 2,8. Rhabarbarum verum , Rhubarbe, VlV. ON fe fert de fa racine. La racine eft groffe, longue d'environ un pied 5c demi ëc plus , ronde , partagée en plufieurs branches , fubdivifées en de plus petites, d'un roux très-foncé en dehors, jaune fafrané en dedans , d'un gout d'abord vifqueux , & un peu amer , &C enfuite un peu altringent. La tige s'élève de trois pieds , & plus , anguleufe , cannelée." Les rieurs font monopétales , en cloche , découpées en fix quartiers inégaux ; il leur fuccede une graine triangulaire , pointue , dont les angles font bordés d'un feuillet membraneux : elle fleurit au printemps.

The text on this page is estimated to be only 18.45% accurate

TOME PREMIER. 2t Elle vient à la Chine 6c dans la Tartane. Vertus et Usages. La racine eft purgative , ftomachale , apérkive, cholagogue ; vermifuge : la dofe , en fubftance , eft depuis un fcrupule jufqu'à un gros; & en infufion , jufqu'à deux gros. Elle encre dans la Poudre contre les vers , la Confection Hamech i l'Electuaire Catholique de Diaprun , de Pfyllium , l'Extrait Panchimagogue , Catholique , bénit , les Pilules de Rhubarbe , fine qulbus , Polycreftes , Mercurielles Panchirnagogues , Je Sirop de Chicorée conipofé , fortifiant, hydragogue, apéritif, cachectique, les Trochifques de Rhubarbe. PLANCHE 29. Rhabarbarum Monachorum , Rhubarbe des Moines Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft épaifle, longue, fibrée,, brune en dehors, très-jaune en dedans. La tige s eleve de quatre à cinq pieds, cannelée, rougeâtre : les feuilles font liftes , verd foncé ; leurs queues font rougeâtres. Les fleurs fonr à étamines, reflemblant à celles de l'Ofeille , Pl. 1 14 ; il leur fuccede des graines femblables à celles de la Patience : elle fleurit au printemps. On la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus. Elle a prefque les mêmes vertus que le Rhapontîc , ou Rhubarbe bâtarde, qui font d'être légèrement purgatives , très-aftringentes, hépatiques. Nota. La Pyrethre & le Rhapontic dévoient être ici; mais par mégarde «lies ont été tranfpofées & cotées Pl. 314. Sariaparilla y Sarzepareillc , Aralia , Viv. On fe fertdefa racine j on la fubftitue à la véritable, dont la Plante n'eft pas encore connue. La racine eft épaifle, longue de cinq à iîx pieds, moëlleufe, odorante. Ea tige a un pied 5c demi de haut , velue , d'un rouge foncé. B3

The text on this page is estimated to be only 20.29% accurate

n EXOTIQUES. Les fleurs font en parafol ; il leur fuccede une baie rouge à quatre, ou cinq angles , applatie, creutée en haut comme un nombril , renfermant une graine applatie , cannelée : elle fleurit en été. Elle vient dans la Virginie, dans le Canada. Vertus. La racine a prefque les mêmes vertus que la véritable. Elle eft fudorifique , incifive , atténuante : la dofc- , en fubfrance, eft depuis un demi-gros jufqua deux; & jufqua une demi-once en décoction. PLANCHE 30. Seneka , Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft grofle du petit doigt , longue de fix à huit pouces, tortueufe, branchue, garnie de fibres, & d'une côte Taillante dans toute fa longueur , jaunâtre en dehors , blanche en dedans ; fon gout eft un peu aromatique , légèrement amer. Les tiges ont environ un pied de long : les feuilles font liftes. Les fleurs viennent en épi au haut des tiges , reflemblant aux fleurs du Polygala , Pl. 463 , mais plus petites. . Elle vient dans la Virginie. Vertus. La racine eft un fpéciiique contre la morfure du ferpent à fonnettes : elle diflout le fang coagulé \ quelquefois elle eft vomitive, d'autre fois elle purge doucement. Scrpentaria Virginiana nigra 3 Serpentaire de Virginie, Viv. Ceft une efpece d'Azarum. Voyez Azarum, Pl. 1 56. La racine eft compofée de fibres très-menues , noires. Elle n'a point de tiges ; les queues des feuilles ont un pouce de long; les feuilles imitent celles de la Violette, Se font tachées comme celles de l'Arum. Les fleurs font monopétales ; elles naiflent vers le bas des feuilles. Il leur fuccede des graines reflemblant à celles de la figue.

The text on this page is estimated to be only 21.42% accurate

TOME PREMIER. 1} Serpentaria altéra, Serpentaire, Viv. On fe fert de fa racine. La racine eft compofée d'une tête, d'où part un paquet de chevelu qui fe répand en terre. La tige eft haute de neuf pouces j les feuilles font en forme de cœur. Les rieurs font femblables à celles des Ariftoloches , Pl. 4 Se 5 : elles viennent au bas de la tige ; il leur fuccede un fruit femblable auxdites Ariftoloches , en cinq loges , qui contient des graines faites comme les pépins de raifin. Serpentaria Cretica Serpentaire de Crète. La racine eft chevelue comme à la précédente , à laquelle elle reifemble en tout , excepté que les fleurs font évafées en canal différemment. PLANCHE 31. Serpentaria caule nodofo 3 Serpentaire , Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft compofée de fibres jaunes j fon odeur Ôc fon gout font aromatiques. La tige eft lifte, fouvenr droite ; les feuilles font un peu velues en de (fus , rudes en deffbus , un peu gluantes. Les rieurs fortent du bas de la Plante } le talon de la fleur eft jaune, fale. Le Pavillon eft pourpre foncé -, il leur fuccede un fruit d'un pouce de diamètre , taillé en poire à fix loges. Serpentaria violée fruBuofœ folio , Serpentaire, Viv. On fe fert de fa racine. La racine eft compofée de fibres très-menues, blanches. Les fleurs naiftent au bas de la tige ; les graines font petites, femblables aux pépins de la Figue. Vertus et Usages des Serpentaires. Toutes les Serpentaires ci-deffus , excepté la première, font des Ariftoloches qui viennent dans la Virginie : elles ont toutes les mêmes vertus. La racine eft diurétique , diaphorétïque , alexipharmaque , vermifuge , bonne contre la rage : elle eft un fpécifîque contre la morfure du Serpent nommé Boicininga. B 4

The text on this page is estimated to be only 18.64% accurate

*4 EXOTIQUES. Elle entre dans la Poudre épileptique de Londres x de la Comtefle de Kent , de partes d'Ecrevilfcs. PLANCHE 32. Turbith , Y iv. ON fe ferc de 1 ecorce de fa racine. La racine a plus d'un pouce d'épaiflèur , branchue , s'enfonçant en terre de quatre, ou cinq pieds, iigneufe; 1 ecorce brune & épaiiTe , jaune pâle en dedans, pleine d'un lait gluant, qui devient rélineux , d'un gout douceâtre , puis un peu acre. Les tiges font farmenteufes , garnies de quatre feuillets membraneux , verd roufleârre , s'entortillant aux arbres , ou fe couchant fur terre -, les feuilles font légèrement duvetées. Les fleurs font monopétales , blanches ; il leur fuccede un fruit à trois, ou quatre loges, remplies de graines noirâtres, grolfes comme un grain de poivre. Elle vient dans l'Ifle de Ceylan , au Malabar, à Guzarrate. Ver tus et Usages. L'écorce de la racine eft purgative , hydragogue. La dofe, en fubftance, eft depuis quinze grains jufqu'à un gros; & en infuiïon , depuis un demi-gros jufqu'à trois. Elle entre dans i'Electuaire Diaturpith, le Diaphœnic , la Bénédict-e laxative , l'Ele&uaire Diacarthsmi , de Citron , l'Extrait Catholique, Panchimagogue , les Pilules d'Agaric, aggrégatives, ou polyereftes, cochées, fétides ,' tartareufes , la Poudre pour la goutre de Paracelfç. PLANCHE 33. Zerumbetk Zeilanïca , Zérumbeth de Ceylan, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft épailTe du doigt, accompagnée de pltifieurs bulbes , compacte , aqueufe , grife en dehors , blanche en dedans ; fon odeur & fon gout pareils à ceux du Gingembre , mais inoins forts. Les fleurs paroiflent avant les feuilles.

The text on this page is estimated to be only 21.56% accurate

TOME PREMIER. 2y Il s'élève d'abord une queue blanche , d'où partent plnfieurs fleurs qui paroilfenr n'avoir que trois pétales , mais qui couvrent la vraie fleur compofée de deux pétales , & d'un troifieme féparé en deux : ceux-ci font panachés de routes couleurs , bleu, blanc, rouge, pourpre, jaune-, les premiers font blancs, avec un filet pourpre dans le milieu. Ces fleurs ont une odeur trèsagréable : elle fleurît en été. Les feuilles viennent à part, enveloppant une tige haute d'environ un pied Se demi : elles ont huit pouces de long , l'odeur Se le goût du Gingembre. Elle vient en. Chine , dans Tlfle de Ceylan. Vertus et Usages. La racine eft fudonfique , incifive , peétorale, ftomachique; alexipharmaque. La dofe , en fubftance , eft depuis fix grains jufqu a un demi-gros j & en infufion , jufqu a deux gros. Elle entre dans le Vinaigre Thériacal, l'Eau Prophylactique, l'Eau de-Vie Royale, l'Eau Générale, Impériale de Londres , la Poudre de Joie, le Phiionium Romain. Zerumbetk y Zérombet, Viv. On fe fert de fa racine. La racine reflemble à celle du rofeau : elle eft tendre , tongeâtre , fibreufe. La tige eft rougeâtre , haute de cinq pieds ; les feuilles font verd clair en délais , verd foncé & luifantes en deflbus. Les fleurs viennent à part, au haut de petites tiges de couleur d'écarlate, formant un épi d'un beau rouge; il leur fuccede un fruit oval , charnu , gros comme une prune , creufé en nombril , contenant plufieurs graines, rouffes, dures : elle, fleurit en été. Elle vient dans rifle Saint-Vincent , aux lieux humides. Vertus. Lefuc de la racine, fraîchement tiré, eft ftomachal, carmiîiatif.

The text on this page is estimated to be only 22.07% accurate

I EXOTIQUES, PLANCHE 34Zingiber , Gingembre, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine a quelque rapporr avec celle du Rofeau : elle cft écailleufe, tendre, d'un rouge pâle en dehors, blanche en dedans ; fon odeur eft très-agréable , fon gout âcre & brûlant. Les tiges des feuilles ont deux pieds de haut j les feuilles font verd gai & liffes. Les tiges des fleurs , qui viennent à part , ont près d'un pied de hautj les écailles, ou petites feuilles, entre lefquelles elles forcent, font vetdâtres & rougeâtres à leurs pointes-, toute cette mafle écailleufe a un afpeét d'un rouge doré : les fleurs imitent le Satyrion, ou Orchis , Pl. 417, mêlées de rouge pâle, de foncé & de jaunâtre ; il leur fuccede un fruit oval , triangulaire, à trois loges remplies de plufieurs graines : toute la mafle écailleufe a une odeur forte & pénétrante : elle fleurit au prïn~ temps. Zingiber fylveflre , Gingembre fauvage , Viv. On fe fert de fa racine. La racine reflemble à la précédente , excepté qu'elle eft plus groflè, que fon odeur n'eft pas fi forte, ni le gout fi brûlant. La plante de même; les feuilles font feulement un peu plus larges : elle fleurît au printemps. Ces deux Plantes viennent en Chine , dans l'Ifle de Ceylan, au Malabar & en Amérique, où on les a tranlporrées. Vertus et Usages des deux Gingembres. La racine eft ftomaehale , pectorale , carminaûve , alexipharrnaque. La dofe, en fubftance, eft depuis cinq jufqu'à quinze grains. Elle entre dans la Thériaque , le Mithridat , le Diafcordium , l'Eledhiaire de Satyrion , le Diaphœnic, la Bénédicte laxaùve, l'Eieetuaire Caryocoftin, la Confection Hamech , l'Eleduaire de Carthame, de Citron, les Trochifques d'Agaric, d'Alhandal, les Pilules fétides > polyereftes.

The text on this page is estimated to be only 22.16% accurate

TOME PREMIER. 27 E CO RC E S. PLANCHE 35Caneila, Candie. 1 ON fe fert de fa féconde écorce. C'eft un petit arbre qui s'élève de vingt à vingt-quatre pieds. La racine eft groffe , branchue, fibreufe, dure, ayant une écorce d'un roux grifâtre en dehors, rougeâtre en dedans : cette écorce a une odeur qui tire fur celle du Camphre j le bois de la racine eft blanchâtre, fans odeur. L'écorce du tronc Se des branches eft rougeâtre , couverte d'une pellicule & d'une croûte grifâtre. Cette croûte extérieure ôtée , refte la Canelle , ou féconde écorce , qui , féchée au Soleil, prend un gout aromatique, entre doux 5c acre, très-agréable ; le bois eft dur , & fans odeur. Les feuilles font verd foncé en defTus, plus clair de/Tous, ayant l'odeur & le gout de la Canelle. Les Heurs font à fîx pétales blanchâtres , ayant l'odeur du Muguet ; il leur fuccede une baie brune, tirant fur le bleu, parfemée de points blanchâtres , remplie d'une chair verte qui contient une amande ovalaîre d'un pourpre pâle , acre. Il vient dans l'Ifle de Ceylan , où il eft très-commun. Vertus et Usages. L'écorce eft apéritive, réfolutive, alexipharmaque , fortifiante , carminative , ftomachale , hyftérique : la dofe , en fubftance , eft depuis un fcrupule, jufqu'à un gros; en infufion, depuis un gros , jufqu'à deux. Elle entre dans les Tablettes ftomachiques , de magnanimité , la Poudre aromatique de rofes, de Diarrhodon , Pannonique , la Thériaque , le Mithridat , la Confection Alkermes , le Diafcordium, l'Orviétan, l'Opiat de Salomon, le Philonium , le Diaphonie, la Confection Hamec , l'Hiere Picre, les Pilules fétides, l'Emplâtre ftomachique de Charas. Cortex JVinteranus , l'écorce de "Winccr. On fe fert de fan écorce.

The text on this page is estimated to be only 22.88% accurate

EXOTIQUES. C'eft un arbre de médiocre grandeur; fa racine s'étend beaucoup. L'écorce eft grofTe , cendrée en dehors, couleur de rouille da fer en dedans, molle extérieurement , folide intérieurement d'une odeur très-pénétrante, d'un gout aromatique, acre, brûlant. Les feuilles font verd clair. Les fleurs font à cinq pétales , très - blanches , d'une odeur de Jafmin ; il leur fuccede un fruit compofé de plufïeurs grains, ramaffés enfemble , verd clair , mêlés de quelques taches noil les, contenant des graines noires, imitant les pépins de raifin. Il vient fur les Côtes de Magellan. Vertus. L'écorce eft ftomaehale, fudorifique, alexipharmaque. C'eft le contrepoifon de la chair du Lion Marin , poiiïbn du Détroit de Magellan. Ladofe, en poudre, eft depuis un demifcrupule jufqu'à un gros ; & en déco&ion , jufqu'à deux gros. PLANCHE 3^. Kinakina , Quinquina. ON fe fert de fon écorce. C'eft un arbre dont le tronc eft de gro fleur médiocre , & qui n'eft pas fort haut. L'écorce eft de couleur de rouille de fer ; fon odeur eft aromatique , fon gout eft très-amer , un peu aftringent. Les feuilles font liftes. Les fleurs, prêtes à éclore, font d'un bleu de Lavande ; quand elles font ouvertes; leur couleur intérieure eft un beau rouge de Carmin qui devienr plus pâle vers les bords ; il leur fuccede une capfule ovale , féparée en deux loges , qui contiennent des graines minces, applaties, rouffeâtresII vient au Pérou , fur des montagnes près de Loxâ. Vertus. L'écorce eft fébrifuge , ftomaehale, carminative, diurétique, hyftérique : la dofe, en poudre, eft depuis un demi-gros jufqua deux gros; en infufîon , depuis une once jufqu'à fix; en décoction, une once; en lavement, jufqua une livre.

The text on this page is estimated to be only 17.32% accurate

TOME PREMIER; x ■ Ca/cari/Ia, ChacriL On fê fèrt de fon écorce. C'eft un arbrilfeau qui s "élevé de cinq à fîx pieds de haut* Le tronc eft court & gros, & couvert d'une écorce cendrée les branches font nombreufes , fe fubdivifant de plus en plus * jufqu'en haut; les feuilles font grandes comme celles du Saule' couvertes d'une pouffiere blanc verdâtre. Les fleurs font à l'extrémité des dernières branches, en épiles mâles, ou ftériles, au haut; les femelles, ou à fruit, immédiatement delîbus; les mâles font à cinq pétales blancs trèspetits : les femelles portent un embrion qui devient un petit fruit à trois loges , chargé d'une pouffiere blanc verdâtre ; chaque loge contient une graine noire. Toute la plante a une odeur aromatique, agréable j le goût eft acre, amer. Il vient dans l'Amérique Méridionale , au Paraguai. Vertus. Cette écorce eft fébrifuge, ftomachique, aftrîngente, hyftérique; la dofe eft, en poudre, depuis fix grains, jufqu'à un, demi-fcrupule , ou un fcrupule j Se en infufion , jufqu a un demigros , ou un gros. Extérieurement les feuilles font fternutatoires. PLANCHE 37Codaga-pala, Cropal. ON fe fert de fon écorce. c'eft un arbriffeau. La racine eft peu profonde en terre : elle eft fibrée ; fon écorce eft rouge brun : elle eft un peu amere. L'écorce des Rameaux eft noirâtre ; le bois eft blanchâtre ; les feuilles font d'un beau verd : elles ont un fuc laiteux. Les fleurs font monopérales , parragées en cinq , très-blanches, d'une odeur agréable ; il leur fuccede un fruit à deux gouffes, rempli d'un duvet blanc, dans lequel font plufieurs graines, de couleur cendrée, longues, étroires, cannelées. Il vient dans l'ifle de Ceylan Se m Malabar.

The text on this page is estimated to be only 19.80% accurate

0 EXOTIQUES. Vertus. Son écorce, celle de la racine , & la racine même, font afe tringentes & anddyfenrériques, vermifuges. BOIS. PLANCHE 3^* Guayacum s Gayac. ON fe fert du bois & de I 'écorce. C'eft un arbre qui devient: quelquefois très-grand» L'écorce eft lifle , tachetée de gris & de verdâtre \ le bois eft>erd olive foncé , d'une odeur allez agréable , d'un gout amer , un peu âcre. Les feuilles font verd pâle , rougeâtres à leurs attaches ; leur gout eft un peu âcre & amer. Les fleurs font à cinq pétales , bleues ; il leur fuccede un fruit taillé en cœur, grand comme l'ongle, couleur de Vermillon, qui renferme une graine dure , de la forme d'une olive , dans laquelle eft une amande. Il vient à Saint-Domingue , Sainte-Croix , Ôc dans prefque toutes les Iiles Antilles. Vertus, Le bois feul, ou avec fon écorce, eft incifif, déterfif, fudolifique, ftomachal , apéritif, peétoral , nervin :ladofe, en décoftion, eft depuis deux gros jufqu'à une demi-once, ou une once. On fe fert auffi des larmes réfineufes brunes, qui découlent du tronc : la dofe eft depuis huit grains jufqu'à deux fcrupules. Sajfafras. On fe fert de fon bois & de fon écorce. C'eft un grand arbre toujours verd. La racine s'étend à fleur de terre. Le tronc eft nud & droit ; l'écorce eft épaitfe, de couleur fauve , revêtue d'une peau mince , gris cendré noir : l'odeuc 8c le gout font acres , aromatiques , approchant du fenouil ; le bois eft blanc roulîeâtre, & moins odorant que l'écorce; les

The text on this page is estimated to be only 22.08% accurate

 feuilles font vertes en deffus, blanchâtres en deffous. Les fleurs font petites, monopétales, en cinq quartiers- il leur fuccede des baies , comme celles du Laurier , fartant d'un calice rouge : il fleurit en été. Il vient dans la Virginie , au Bréfil & autres lieux de l'Amérique. Vertus. Le boîs Se l'écorce font incilîfs , fudorifiques, diurétiques: la dofe, en poudre, eft un gros; & en infufîon, ou en décoction, depuis une demi-once jufqua deux onces. PLANCHE 39. Corallum rubrum^ Corail rouge. IL a été reconnu, depuis quelque temps, que cette fuppofée plante eft un affemblage de gaines, dans chacune defquelles eft , ou a été renfermé un infecte de mer. Le Corail n'a donc , ni feuilles , ni racines \ on le trouve attaché fur les rochers , ou autres corps durs au fond de la mer. Il eft , dans l'eau , d'un jaune rougeâtre : il part du tronc placeurs branches coudées de différents fens , garnies d'un fuc laiteux intérieurement ; on voit, fur toute la fuperfîcie , quantité de mamelons , d'où fort la partie antérieure de t'infeéte , garnie de huit cornes , ou fuccoirs, qu'on avoir pris pour des fleurs à étamines. Le fuc laiteux, répandu dans le Corail, a un gout âcre,aftringent , approchant du Poivre & de la Châtaigne. On trouve le Corail rouge, & on le pêche dans la Méditerranée , au Golfe François , vers les Côtes de Provence , autour des Illes Majorque & Minorque , fur les Côtes d'Afrique, dans la même Mer , & dans l'Océan , près le Cap Nègre. Vertus et Usages. La Poudre de Corail eft aftringente : la dofe eft , depuis un fcrupule, jufqua un gros. Il entre dam la Confection d'Hyacinthe , dans la Poudre de pattes decrevilfes compofée de Londres , dyfentérique de Charas dans la Poudre de Perles , rafraîchiflanre de Charas, dans la Poudre Pannonique.

The text on this page is estimated to be only 20.70% accurate

3i EXOTIQUES. Madrépores, , Madrépore. Le Madrépore e£t comme le Corail, un aftemblage de cellules , non une plante ; ce Madrépore eft de couleur blanche , garni d'un fuc laiteux : il paiTe pour avoir les vertus du précédent j ce qui lui a fait donner , par quelques-uns , le nom de Corail blanc. Vertus. H entre dans la Poudre de Perles rafraîchi (Tante, Pannonique,' Coralhna > Coralline , Viv. Cette Coralline a entre un pouce & demi & deux pouces de hauteur \ il s'en rencontre de couleurs différentes , vertes, rougeâtres , jaunâtres , cendrées , noires : elle eft recouverte dune fubftance limoneufe , blanchâtre, auffi dure que de la pierre, croquant fous la dent, fe réduifant en poudre entre les doigts, fans aucune racine , attachée fur les Rochers de la Mer & autres corps. Elle vient fur les bords de l'Océan & de la Méditerranée. Son odeur eft défagréable , fentant le poiflon j fon gout eft falé & défagréable. Vertus. Elle eft vermifuge : la dofe eft , depuis un demi-gros, jufqu a un gros. TIGES, FEUILLES ET FLEURS, PLANCHE 4°Calamus aromaticus , vrai Calamus. ON fe fert de fa tige. La racine a trois , ou quatre pouces de long , fibrée. Les tiges s'élèvent de trois pieds \ leur odeur eft agréable ; leur gout eft acre &C agréablement amer. Les rieurs font jaunes , monopétales, découpées en cinq, trèspetites ; les fruits font de petites capfules noires qui contiennent de petites graines noires. Elle vient aux Indes. Vertus

The text on this page is estimated to be only 19.85% accurate

TOME PREMIER. {$ Vertus et Usages. Elle eft ftomachâle, hyftérique : on s'en fert rarement Elle entre dans la Thériaque. PLANCHE 4L Jujicus odoratus , Jonc odorant, Viv, ON fe fert de fa tige avec les fleurs, la racine eft petite, fibrée à fon origine, dure, blanchâtre. La tige a un pied & plus de haut, pleine de mobile. Les rieurs à é famines , reflemblent à celles des bleds; il leur fuccede des graines comme celles du Chiendent : elle fleurit en été. Toute la plante eft odorante , tirant fur les odeurs de la Rofe & du Pouliot. Le gout eft aromatique , un peu acre, amer. Elle vient en Arabie. Vertus et Usages. Elle eft apéritive , défobftruante. La dofe , en poudre , eft jufqu a un gros ; & en décodion , jufqu a deux gros. Elle entre dans la Thériaque & le Mtrhridat. PLANCHE 42, Malabatrum , Feuille Indienne. ON fe fert de fes feuilles. C'eft un arbre médiocrement haut ; fon odeur & fon gout approchent du Cannelier de Ceylan. Les fleurs font petites, à cinq pétales, verd blanchâtre , fans odeur ; il leur fuccede des fruits femblables aux Grofeilles rou^e^; Il vient fur les Montagnes du Malabar. Vertus et Usages. Les feuilles ortc les vertus du Nard, Pl. 25 , mais on s'en fert peu. Il entre dans la Thériaque, le Mithridar. Senna Alexandrina t Séné. On fe fert des fleurs & fruits. C

The text on this page is estimated to be only 18.24% accurate

54 EXOTIQUES. C'eft un arbriffeau de crois pieds de haut , ligneux ; les feuil, les font verd clair ; leur gout eft gluant , légèrement amer. Les fleurs font à cinq pétales jaunes, parfemées de veines pourpres -y le piftil devient une gonfle qui renferme des graines plates , verd pâle. Il vient dans la Perfe , l'Arabie , la Syrie. Vertus et Usages. Les feuilles & les gonfles, ou fruits, font purgatifs ; les fruits moins que les feuilles : la dofe eft , en fubftance , depuis un fcrupule, jufqu'à un gtosj & en infullon , ou en légère décoction , depuis un gros juiqu'à une demi-onceIl entre dans l'Extrait de Séné, Panchymagogue , l'EIectuaire de Séné , de Tamarin , de Pfyllium, leLénitif , le Catholicum, la Confection Hamech , l'Eleduaire de Citron , les Pilules Panchymagogues, Tartareufes , l'Hydragogue excellent de Renaudot. PLANCHE 43Diclamus Credcus 3 Dictame de Crcte, Viv. ON fe fert de fes feuilles Se des fommites. La racine eft brune , fibrenfe. Les tiges s'élèvent de neuf pouces , garnies d'un duvet blanc, ainfî que les feuilles. Les têtes écailleufes , defquelles fortent les fleurs , font purpurines en dehors. Les fleurs font monopétales en gueule , d'une belle couleur fiourpre ; il leur fuccede quatre petites graines au fond du caice. Les feuilles Se les fommités écailleufes ont une odeur pénétrante, agréable; leur gout eft aromatique, acre, brûlant: elle fleurit en été. Elle vient en Grèce & dans l'Ifle de Crète. Vertus et Usages. Elle eft liyftérique, alexipharmaque : la dofe, en poudre, eft depuis un demi-gros jufqu'à un gros. Elle entre dans la Thériaque d'Andromaque l'ancien, le Mitbridat , l'Orviétan , l'opiat de Salomon. m

The text on this page is estimated to be only 18.05% accurate

TOME premier* PLANCHE 44» The Sinenjïim , Thé de la Chine. ON fe fert de Tes feuilles, C'eft un arbrilTeauj il s'élève à cinq pieds tout au pluss La racine eft rnenue , fibreufe j fe répandant à la fuperficie ds la rerre. Les feuilles font verd foncé. Les fleurs font à fix pétales blanchâtres , reflemblant à celles de l'Eglantier, Pl. 496. Il leur fuccede un fruit fphérique à deux t trois , ou quatre capfules qui renferment chacune une graine en forme d'aveline , rouiïeâtre , qui contient une amande blanche t dont le gout eft d'abord atfez doux , enfuite amer, puis brûlant. Il vient à la Chine, au Japon. Vertus; Les feuilles féchées & préparées dans le Pays , dorment urtô infuflon très-agréable à boire avec du fucre. Cette infulion eft apéritive : la dofe eft un gros. ■ - ■ =5 PLANCHE 45. Stœchas Arabica, Scotchas Arabique, ViV. ON fe fert de fes fommités fleuries. La racine eft ligneufe, fibrée, brune en dehors, blanchtf en dedans. Les tiges font lîgneufes > quarrées -y les feuilles font verd pâle t odorantes, d'un gout aromatique, acre 5 les feuilles en forme d'écaillés des têtes d'où fortent les fleurs , font blanchâtres j les petites feuilles , qui couronnent les têtes, font pourpre violet ; les tètes ont une odeur pénétrante 5c un gout un peu acre j amer : elle fleurit en été. Les fleurs font monopétales en gueule , pourpre foncé s il leur fuccede quatre graines arrondies au fond du calice* Elle vient aux Ifles d'Hyeres , en Languedoc. Vertus et Usages, Elle eft céphalique, nervine , diurétique, hy rte ri que. G x

The text on this page is estimated to be only 20.24% accurate

9g EXOTIQUES. Elle entre dans le Sirop de Stœchas , l'Hiere de Coloquinte ; la Thériaque d'Andromaque l'ancien , le Mithridat , l'Onguent Martiatum , l'Emplâtre de Grenouilles. PLANCHE 4^' Crocus , Safran, Viv. ON fe fert du piftil de la fleur. La racine eft tubéreufe , grofle comme une aveline , quelquefois comme une Noix , blanche ; la partie fupérieure t plus étroite que l'inféricre , formant une efpece d'Oigtion , revêtue de quelques enveloppes rouileâtres , terminée en defTous par du chevelu, qui, comme à l'Oignon, eft la vraie racine. Un pédicule, qui eft celui de la fleur, s'élève de cinq à fix pouces , & foutient une grande fleur monopétale , partagée en fix parties , d'une couleur gris de lin , au fond de laquelle eft un piftil qui fe fépare en trois branches, qui s'élargiffent à mefure qu'elles s'allongent , jufqu'à pendre hors de la fleur, & fe terminent en crcre : elles font jaune orangé, tirant fur le rouge foncé. 11 lui fuccede un fruit triangulaire , oblong , divifé en trois loges , qui contiennent des femences arrondies : elle fleurit en automne. A mefure que les fleurs tombent, les feuilles croiffent : elles deviennent longues de neuf pouces, très-étroites, verd foncé, fe laiffant aller : elles retient ainfi tout l'hiver. La plante vient en Orient; on la cultive en Europe 6c en France : le meilleur vient en Gâtinois. Vertus et Usages. Les trois branches du piftil font la feule partie que l'on emploie, & qu'on nomme le Safran. 11 eft lvyftérique , anodin, apéritif, cordial, ftomachique, pedoral:la dofe eft, depuis un demi-fcrupule, jufqu'à un Se un & demi. Extérieurement il eft adouciflant , réfolutîf , ophtalmique.^ 11 entre dans la Thériaque d'Andromaque l'ancien , le Mithridat , la Confection d'Hyacinthe , le Philonium , la Bénédicte laxattve , l'Hiere Picre, Eftiere de Coloquinte, Orviétan , Poudre de la Comteffe de Kent, de Joie, Diarthodon , les Trochif

The text on this page is estimated to be only 20.04% accurate

TOME PREMIER. î7 ques d'Hefdicroï, de Carabe, de Camphre, les Pilules aromatiques de Quercécan, de Rufus, Dorées, de Cinoglone , TElixir de propriété , le Laudanum liquide , l'Huile de Scorpions compofée, l'Onguent doré, l'Emplâtre de Mucilage , de Galbanum , de Mélilot , d'Oxicrocéum. FRUITS ET GRAINES. PLANCHE 47. Palma major , Dattier. ON fe fert de fes fruits, C'eft un arbre qui monte à quarante pieds 8c plus. La racine e(t épaiffe , ligneufe , pouffant à ion collet nombre de petites racines, ou gtoffes fibres , ondées, fe répandant au loin fur la furface de la terre. Le tronc eft nud , droit j fon bois n'eft recouvert , au lieu d ecorces , que par l'origine des branches qui tombent,, l'une après l'autre , à mefure que l'arbre croît , ou qui ont été coupées -, le bois n'eft compofé que de fibres longs & épais , mais légers & moelleux. Du haut du tronc forcent entre quarante à quatre-vingt branches , longues d'environ quinze pieds , dont Les feuilles, qui font verd pâle, ne tombent jamais. Les fleurs & les fruits viennent au haut du tronc , enfermés d'abord dans des enveloppes longues, nommées Spathes ; ils y font raffemblés en grappes * les Spathes s'ouvrent , les grappes paroiffent , compofées de fleurs dans le Palmier mâle , & de fruits au Palmier femelle : la Spathe eft d'un verd gai , recouvert d'un duvet roux foncé. Les fleurs font à trois pétales , blanchâtres, tirant fur le jaune pile, d'une odeur défagréable. Les fruits , de la groffeur d'un gros gland de chêne , charnus , d'abord de couleur verte , deviennent , en mûriffant , de différentes couleurs, fuivant celle de la pulpe qu'ils contiennent: on nomme ces fruits Dattes; la chair, qu'ils contiennent, a un gout vineux , très-doux : elle enferme un noyau très-dur , de la couleur des pépins de raifin , rempli de moelle. Ci

The text on this page is estimated to be only 18.39% accurate

?8 EXOTIQUES. Il vient en Afrique , en Judée , en Syrie , en Perfe. Vertus et Usages. Les Dattes font ftomachales , aftringentes. Elles entrent dans la décoction petlorale , le Sirop d'Hyffope, Réfumptif, le Diathamaron de Nicolas, le Looc de fan té , |e Diaphœnie. PLANCHE 48. Zi^iphus , Jujubier. ON fe fert de fon fruit, C'eft un arbre médiocrement haut. Les feuilles font luifantes. . Les fleurs font à cinq pétales, jaunâtres 5 il leur fuccede un fruit rougeâtre, rempli d'une chair verdâtre , d'un gout doux Se vineux, qui renferme un noyau dur, dans lequel font deux ^man des : il fleurit en été. 11 vient en Arabie s en Grèce & en Languedoc. Vertus et Usages. Les Jujubes font pectorales , adouciflantes. Elles entrent dans le Sirop de Jujubes, Réfumptif, le Looç de fanté, l'Ele&uaite lénitif. PLANCHE 49* Sebefiena } Scbeftes. ON fe fert de fon fruit. C'eft un arbre de médiocre grandeur. Son tronc eft gros, l'écorce eft blanchâtre, raboteufe ; fes branches fe recourbent vers la terre } les feuilles font verd gai , luifantes en deflus. Les fleurs font monopétales , divifées en cinq parties , blanches, d'une odeur douce ; il leur fuccede un fruit de la grofleur dune olive, d'abord verd , puis noirâtre, plein d'un fuc gluant , renfermant un noyau femblable au noyau de prune, qui contient une ou deux amandes : il fleurit en été. Il vient dans l'Orient, en Egypte,

The text on this page is estimated to be only 20.53% accurate

TOME PREMIER. Î5> Vertus et Usages. Les Sébeftes font pectorales , adoucilfantes. Elles entrent dans l'Electuaire lénitif, l'Electuaire de Sébeftes, PLANCHE JO. DES RAISINS SECS. P affala Damafcenœ , Raifins de Damas. Pa jfulce Corinthiacœ 3 Rai fins de Corinthe. LEs Raifins fecs font féchés au Soleil , tels font les Raifins de Damas Se les Raifins de Corinthe. Les Raifins de Damas font très -gros Se bruns. Les Raifins de Corinthe font très-petits Se blancs. Les premiers viennent en Syrie j les féconds viennent à Corinthe. On en prépare en Languedoc Se en Provence de plufieurs autres efpeces. Vertus et Usages. Les raifins fecs , après qu'on en a ôté les pépins, font bachiques , rafraîchifTants , adouciflants. Ils entrent dans le Sirop de Guimauve , d'Eryfimum , d'Hyffope , antichectique, oa de Tortues , l'Electuaire lénitif, la Confection Hamech. Ficus, Figuier. On fe fert de fes fruits féchés au Soleil. C'eft un arbre de hauteur médiocre j les feuilles font verd foncé*, les fruits verd pâle. Il n'a point de fleurs apparentes ; les fruits paroifTent tout feuls ; mais ces fruits , qu'on nomme figues , ne font effectivement qu'un calice général , rempli d'une pulpe , qui , étant mûre , eft douce & fncrée , laquelle contient , fous la forme de pépins , les fleurs , tant mâles , que femelles , & leurs graines. Les fleurs mâles font à étamines ; les femelles n'ont qu'un embrion , qui devient une graine arrondie Se applatie. Il vient aux Pays chauds. C4

The text on this page is estimated to be only 14.10% accurate

'4° EXOTIQUES, Vertus. On ne fe fert que des Figues féchées au Soleil , qu'on nom. pie rigues grades. * Elles font pectorales «Se fudorifiques : la dofe eft cinq , on fix par chaque livre de décoction. Extérieurement elles font maturatives , adoucifTantes. PLANCHE yi, DES MIROBOLANS. LEs arbres qui portent ces fruits, nous font inconnus ïnL qu a prêtent j ils font au nombre de cinq, Crffi' Ccitrins< \Lhtbul f Bellcrics. ^Em&ltcx, ^Emblics, La Planche fait connoîrre leur forme. La couleur des CÈrriw eft jaunâtre 5 ou tirant fur celle du Citron. Lecorce eft glutineufej on ère le noyau, qui eft muLa couleur des Chébules eft brune en dehors, roux noirâtre en dedans. La couleur d,es Indiens eft noire en dehors , brillante en dedans , comme de la poix; le goût en eft acide, acre, un peu îimer. r La couleur des Selleries eft pareille à celle de la Noix Mufçade , Pl. 71 , mais tirant fur le Jaune. La couleur des Emhlics eft gris noirâtre; leur pulpe a un *out aigrelet , avec un peu d acreté. & Ils viennent tous aux Indes Orientales , à Bengale , à Cambaie, au Malabar, p Vertus et Usages, lis font purgatifs , aftringenrs : la dofe de tous enfembie, à partie égale , eft , en fubftance , jufqu i trois , ou quatre gros ; Se en Wfulion, depuis une once jufqu a une once & demie. Us entrent dans la Confection fiamech, les Pilules aggrégatives , fine quibus , tartareufes.

The text on this page is estimated to be only 19.05% accurate

TOME PREMIER; ^ Amomian , Amorne. Cubebe } Cubebes, Ce font des fruits d'arbres inconnus. Le fruit nommé Amome eft gros comme un grain deRaïfin; ayant une odeur plus douce que la Lavande i il eft rempli de graines , dont l'odeur eft plus forte. Il vient aux Indes Orientales. Vertus et Usages. Il eft apéritif, diaphonique , fortifiant, diurétique, hyftérique. Il entre dans la Thérîaque d'Andromaque l'ancien , la Bénédicte laxative. Le fruit nommé Cubebes eft gros comme un grain de poivre, de couleur gris brun, contenant une graine arrondie , noirâtre en dehors, blanche en dedans, d'un goût aromatique, agréable , moins âcre que le Poivre. Il vient dans f Ifle de Java. Vertus et Usages. II eft ftomachique , carminatif , fortifiant. La dofe , en fubftance , eft depuis trois grains jufqu'à un fcrupule; & en infufion , depuis un gros jufqu'à trois. 11 entre dans le Vinaigre Thériacal & dans plufieurs comportions cordiales. PLANCHE 52, Colocynthis 3 Coloquinte, Ann. /*\N fe fert de la pulpe du fruit. \J Les tiges rampent fur la terre, rudes, cannelées; les feuilles font rudes, blanchâtres , velues ; il y a des vrilles à leurs aifîelles. Les fleurs font monopétales, en cloche , découpées en cinq quartiers ; il y en a de ftériles , ou mâles , & d'autres femelles , portées fur un ernbrion , qui devient un fruit rond , gros comme le poing , d'un verd jaunâtre, d'une odeur défagréable, d'un gouc très amer 3 il renferme une moelle blanche , divifée

The text on this page is estimated to be only 20.11% accurate

-il . EXOTIQUES. en trois parties , qui contiennent des graines refïèmblant à celles du Concombre : elle fleurit en été. Elle vient en Orient , fur les Côtes Maritimes & aux Mes da l'Archipel. Vertus et Usages. La pulpe de fon fruit eft un violent purgatif. Il entre dans l'Hiere de Coloquinte, la Confection Hamech l'Extrait panchiinagogue , les Pilules d'Euphorbe, de Sagapenum, ex imbus de la Pharm. de Londres , Cachectiques , d'Agaric , aggrégatives , polycreftes , cochées , fétides , dorées , mercul rielles, l'Onguent d'Artanita. PLANCHE 53CaJJia , Cafle. ON fe fert de la moelle du dedans du fruit. C'eft un arbre de la grandeur du Noyer. Le bois du tronc eft d'un roux noirâtre; l'écorce en eft d'un gris cendré en dehors , couleur de chair en dedans ; les feuilles approchenr de la couleur de celles du Noyer. Les fleurs font à cinq pétales, d'un beau jaune ; il leur fuc~ cede une goutte longue d'environ un pied & demi, cylindrique , ligneufe , d'un châtain noir , féparée en dedans par placeurs cloifons , traverfanres , minces, qui renferment chacune une graine dure , enveloppée par une moelle noirâtre, d'un gout

The text on this page is estimated to be only 18.99% accurate

TOME PREMIER. iamiflTT'Y~","'rTTTITTKBmrïTWiE' iif ill ITiBITifiÏÏÏl— ITT— rW 41 PLANCHE J4» Tamanndus , Tamarinier. ON fe fert de la moelle du dedans du fruit. C'eft un arbre de la grandeur & hauteur du Noyer. La racine fe partage en plufieurs branches qui fe répandent 3u loin. Le tronc eft fort gros ; l'écorce épaifle , cendrée , brune \ les feuilles font verd gai , un peu velues en défions. Les fleurs font à trois pétales , couleur de rofe, parfemées de veines , rouge foncé ; il leur fuccede une gonfle ronfle qui contient des graines à quatre quarrés , très-dures , d'un brun luifant & taché, environnés d'une pulpe noirâtre , acide , vi» neule , molle , un peu âcre : il fleurit en été. 11 vient en Arabie, en Egypte, en Ethiopie j au Sénégal. Vertus et Usages. La moelle eft un purgatif doux & léger, adouciflante , tempérante. La dofe eft, en fubftance, depuis deux gros jufqu'i une once ; & en infufion , ou décodHon , jufqu'à trois onces. Elle entre dans le Catholicum , le Lénitif , le Diaprun , l'E-« leétuaire de Pfyllium , la Confection Hamech. PLANCHE 5TVanilla 3 Vanille, Viv. ON fe fert de fon fruit. Les racines font grofles prefque du petit doigt , longues d'environ deux pieds , tendres , fucculentes , s'enfonçant en terre. La tige eft ronde, verte: elle ferpente en montant, jufqu'au haut des arbres ; les feuilles font liftes , verd gai , un peu acres. Les fleurs font à fix pétales , tortillés & ondés , très-blancs en dedans , verdâtres en dehors \ il leur fuccede un fruit , ou ftUqtie molle, longue d'un peu plus qu'un demi-pied, grofle du petit doigt, remplie de quantité de petites graines noires, d'une odeur agréable ; fon gout eft aromatique, un peu âcre. Elle vient au Mexique, au Pérou.

The text on this page is estimated to be only 21.18% accurate

44 EXOTIQUES. Vertus. Le fruit efl ftomachal, carminatif, diurétique, hyftérique' on s'en fert rarement en Médecine. La dofe , en fubftance ' eft depuis douze grains jufqu a un demi-gros ; Se en infulion ' ou décoétion , jufqu'à deux gros; il encre communément dans la compofîtion du Chocolat. Cardamomum Elcttarï , Cardamome, Viv. On fe fert de fon fruit & graines. La racine eft grotte, du pouce & plus, oblongue , blanchi, tre , garnie de petites racines , fibreufes , rampantes. La tige a environ douze pieds de haut , verte , remplie de moelle blanchâtre; les feuilles font d'un verd clair en deflons d'une odeur forte , d'un gout aromatique , acre. Les fleurs nailTent à part fur des bourgeons verdâtres qui s'élèvent de deux pieds & plus : elles font à quatre pétales, dont trois font verd blanchâtres ; le quatrième , qui eft le moins long , eft verd ; il leur fuccede un fruit rond , verd , partagé en trois loges , qui contiennent des graines triangulaires , Touffes ; le fruit a un gout un peu acide , agréable. Ellè vient aux Indes Orientales. Vertus et Usages. Le fruit eft ftomacliique , diurétique , hyftérique : la dofe , en fubftance , eft depuis un demi-fcrupule jufqu'à un; & en infulion , jufqu'à une demi-once. Il entre dans la Thériaque , le Mithridar , la Bénédicte laxative, l'Eleduaire de Satyrion, les Tablettes de magnanimité, le Vinaigre Thériacal. PLANCHE $6Piper nigrum } Poivre noir, Viv. ON fe fert de fon fruit. La racine eft petite , fîbreufe , noirâtre. Les tiges font farmenteufes , vertes , grimpantes , ou fe rcÎ>andant à terre , alors prenant racines de diftance en diftançe; es feuilles font yerd clair en deflus , & verd brun en deflous , luifantes.

The text on this page is estimated to be only 18.55% accurate

TOME PREMIER. ^ Les fleurs font monopétales , partagées en trois, d'un verd jaunâtre; il leur fuccede un fruit rond, gros comme un petic pois , rouge en dehors , blanc en dedans , noir quand il eft fec. Toute la plante a un gout acre & brûlant. Elle vient aux Indes Orientales, dans les Mes de Java, da Sumatra & au Malabar. jVbiu. Ce qu'on nomme Poivre blanc , n'eft autre chofe que Je Poivre acir, duquel on a ôcé l'écorce avant que de le fécher. PLANCHE J7Piper longum , Poivre long, Viv. ON fe ferr. de fon fruit. La plante relîemble beaucoup à la précédente j les différences font que les tiges font moins ligneufes, les feuilles plus longues, & d'un verd plus brun. Les fleurs font monopétales, partagées en fix quartiers j les fruits font gris noirâtres , longs de deux pouces , cannelés , en fpirales raboteufes , d'un gour acre , un peu amer. Vertus et Usages des deux Poivres. Les vertus des Poivres ci-deflus font les mêmes ; ils font réfolutifs , apéritifs , atténuants , ftomachiques : la dofe , en fubftance , eft depuis un grain jufqua dix ; 8c en infufion , jufqu'i un fcrupule. Extérieurement ils font fternutatoires , mafticatoires. Le Poivre noir entre dans la Thériaque d'Andromaque l'an» cien, l'Eledtuaire de baies de Laurier : le Poivre blanc entre dans la Thériaque , le Mirhridat , le Diaphœnic , l'Hiere de Coloquinte. Le Poivre long entre dans la Thériaque, le Mithridat, le Diafcordium , la Bénédi&e laxative. PLANCHE Piper Aromaticum , Poivre de la Jamaïque. Myrthus j arborea Aromatica. ON fe fert du fruit. C'eft un arbre grand comme le Noyer , quelquefois bien plus haut.

The text on this page is estimated to be only 18.58% accurate

4* ÈXOTlQtJÈS. Le tronc eft droit & haut ; lecorce eft très-milice Se Ii(Te< l'Aubier en eft blanchâtre & épais j le cœur en devient noir comme 1 ebene y il eft dur & pelant. Les feuilles font d'un verd foncé, agréables, liffes; leur odeur tient du Clou de Girofle Se de la Canelle , d'un goût légèrement amer , allongent. Les fleurs font à cinq pétales blancs ; il leur fuccede des baies plus grolfes que celles de Genièvre, noires, hnfantes , rem, plies d'une pulpe verdàrre, aromatique, contenant deux grat* laes demi-rondes , accollées. II vient dans prefque toutes les Ides Antilles. Vertus. Ses fruits font ftomachlques , fortifiants. PLANCHE 59CaryophylLus , Giroflier. ON fe fert du calice de la fleur , joint à l'etnbrîon du fruit, avant que les fleurs s'épanoiulfent } c'eft ce qu'on nomme le Clou de Girofle. C'eft un arbre de la forme 5c grandeur du Laurier, Pl. 334; fon écorce reflemble à celle de l'Olivier ; fon tronc a un pied & demi depaifleur, le bois dur; les rameaux font roux clair; les feuilles font vertes, luilantes. Les fleurs font à quatre pétales , bleues , d'une odeur trèspénétrante ; le calice efl long d'un demi-pouce, couleur de fuie 5 fon gout efl fort aromatique , âcre : ce calice devient un fruit rouge d'abord, puis noirâtre, contenant une amande noirâtre $ îe fruit mûr fe nomme Clou Matrice. 11 vient dans les Ifles Moluques. Vertus et Usages. Le Clou de Girofle eft alexitaire , fortifiant , deflîcarif. La <3ofe eft , en fubftance, depuis trois grains jufqu'à un fcrupule 5 Se en infufion , depuis un demi-gros jufqu'à deux gros. Il entre dans la Poudre contre l'avortement,de Charas, Dyfentérique , l'Orviétan , la Bénédicte laxative , l'Opiat de Salomon , les Tablettes de courage : /'Huile de Girofle entre dans l'Elecluaire de Satyrîon , le Baume apoplectique , le Baume vulnéraire de Metz.

The text on this page is estimated to be only 19.73% accurate

TOME PREMIER. AJ PLANCHE 60. Anacardium , Anacarde. ON fe fert du noyau attaché au bout de fon fruit-, C'eft un grand arbre droit de 70 pieds de haut, de itf pieds de tour. La racine eft rougeâtre , fibrée ; l'écorce en eft roufte. L'écorce de l'arbre eft cendrée j les feuilles font vertes en deiîiis , on peu cendrées en derfous , luifantes. Les fleurs font à cinq pétales jaunes , de bonne odeur ; il leur fuccede un fruit plus petit qu'un œuf de Poule , fans noyau, lequel eft en dehors , au bout du fruit ; le fruit eft pourpre foncé par dehors , & violet pourpré en dedans > le noyau devient noirâtre : il a un gout mêlé de piftache & de châtaigne. Il vient aux Indes Orientales , au Malabar & aux Ifles Philippines. Vertu s. Dans la doublure de l'écorce du noyau , il fe trouve un fuc mielleux, âcre & brûlant. On fe fert ,• mais affez rarement , de ce fuc pour mondifiei les dartres de les ulcères. o LANCHE 6l. Acajou. N fe fert du noyau attaché au bour de fon fruit. C'eft un arbre de la grandeur d'un Pommier , quelquefois très-grand. L'écorce eft cendrée ; les feuilles font verd gai. Les fleurs font monopétales , découpées en cinq , en partie rougeâtres , & en parrie verdâtres ; il leur fuccede un fruit plus gros qu'un œuf d'Oie , de couleur pourpre , rempli d'une chair blanche, douce, un peu âcre, terminé, à fon bout antérieur p par un noyau long d'environ un pouce & demi , d'un verdobfcur , cendré, lifle. Dans la doublure de l'écorce de ce noyau eft un fuc miellé, rrès-cauftique , d'un jaune foncé , qui contient une amande blanche, d'un gouc approchant de celui de la Piftache.

The text on this page is estimated to be only 18.62% accurate

4*. EXOTIQUES; ÎI vient aux Ifl.es de l'Amérique , au Bréfil , aux Indes* Vertus. On fe fert du fuc miellé du noyau : il a les vertus du prccc* dent. PLANCHE 6z. Balanus înyrepfica , Ben mouringou. ON fe fert de fes fruits, feuilles, écorce de la racine. C'eft un arbre d'environ vingt-cinq pieds de haur, gros de cinq pieds , ou environ. L'écorce de la racine eft jaunâtre ; celle du tronc noirâtre eiï dehors , blanchâtre en dedans , d'une odeur de Creifon ; les feuilles fentent la feve. Les fleurs font à cinq pétales prefque égaux , couleur de chair. 11 leur fuccede des fruits, ou goufTes cylindriques , longues de deux pieds, triangulaires, cannelées, vertes, la fubllance intérieure blanchâtre, contenant nombre de graines triangulaires, cannelées, qui renferment une amande blanche, huileufe , acre , amere : il fleurit en été. Il vient dans l'Ifle de Ceylan , au Malabar Se autres Pays des Indes. Vertus. Le fuc de l'écorce eft adouchTant; celui de la racine eft antifpafmodique j extérieurement les feuilles font vulnéraires , vermifuges. PLANCHE Cacao. ON fe fert de fes graines. C'eft un arbre de médiocre grandeur , dont le tronc avant les branches , eft haut de quatre à cinq pieds , ôc plus gros que la jambe. L'écorce eft brune ; les feuilles font lifles , verd foncé en deffus , verd clair en deflous. Les fleurs font à cinq pétales , jaune pâle ; chaque pétale ayant un petit renflement vers fon origine : ces pétales font marquées ds

The text on this page is estimated to be only 16.89% accurate

TOME PREMIER, de petits points rouge brun ; il leur fuccede un fruit Iorm d\„„ demi- pied & plus, couleur écarlate fonce, parfemé de°peti[S points jaunâtres. Le dedans contient vingt à trente graines "codes comme une olive , luifantes, charnues, d'une couleur violette très-clâirê en dehors , & en dedans couleur de châtaigne. Il vient aux Indes Occidentales, dans les Mes An ailes au Mexique. * Vertus. Ses graines, ou amandes, font la bafe du Chocolat : on y ajoure des Aromates , fur-tour la Vanille , Pl. 5 5 . Le Choeohc eft nourriflant , ftomachal, fortifiant. Hanche 64. Pijlacia , Piftachier. ON fe fert de fon fruit. C'eft un arbre aflez haut, dont le tronc eft épais. Les feuilles font verd foncé. On diftingue le mâle de la femelle par les fleurs ; celles du Piftachier mâle font à étamines & ftériles ; celles de la femelie n'ont qu'un calice, qui fou tient un ernbrion, qui devient une baie ovalaire, dans laquelle eft une amande verd pâle, gmffe comme une Aveline , douce quoiqu'un peu amere , couverte d'une pellicule rouge. // fleurit au printemps. Il vient dans la Perfe, l'Arabie, la Syrie Se aux Indes. Vertus. La Piftache eft adoucifïante , ftomachale, fortifiante. Ladofe eft dix ou douze , dans une livre d'émulfion. Elle entre dans les Tablettes ftomachiques , de magnanimité > l'Elecîuaire de Satyrion. PLANCHE 6$. Pinus fativa , Pin. ON le fert du fruit qu'ori nomme Pignon doux. C'eft un grand arbre. ■Le tronc eft droit; l'écorce raboteufe, rougeâtre; le bois D

The text on this page is estimated to be only 18.08% accurate

5o EXOTIQUES. eft jaunâtre, odorant, réfineuxj les feuilles, qui forcent deux à deux de la même gaîne , ont cinq pouces Se plus de long t & font vertes toute L'année. Les rieurs mâles , à étamines & ftériles , luiflèht , en manière de châtons, au haut des branches ; les rieurs femelles Se fruits naîflent à part en divers endroits des mêmes branches , & commencent par un embrion qui devient un fruit gros comme le poins; , écaïïleux ; chaque écaille contient une coque dure rouffeâtre , dans laquelle eft une amande blanche, huileufe, douce tic agréable au gour , couverte d'une membrane couleur de Châtaigne. // fleurit au printemps. Il vient en Languedoc & en Provence. Vertus. Le Pignon eft pecloral, adoucilTant , incralTant : la dofeeft, depuis une demi-once, jufqu'à une once en émalhon. PLANCHE 66. Ricinus vuîgaris 3 Ricin, Ann. N fe fert de l'amande, du fruit, qu'on nomme Pignoa _ ' d'Inde. Ta tige eft haute de cinq à fîx pieds , creufe y les feuilles font lilîes, verd roncé. Les rieurs mâles , ou ftériles , nailTent au haut des rameaux y leur calice eft verd blanchâtre , les étamines plus blanches ; les embrions des fruits naiflenr pêle-mêle avec elles j ils font verds, couronnés par des crêtes, couleur de vermillon foncé j ils deviennent des fruits gros comme une Aveline , noirâtres , triangulaires , garnis d'épines molles , renfermant une amande blanche , huileufe , d'un gour douceâtre & acre : elle fleurit en été. Elle vient en Egypte & dans plufieurs Pays des deux Indes. Vertus. Le Pignon d'Inde eft un purgatif violent & dangereux ; c'eft pourquoi il eft rarement en ufage.

The text on this page is estimated to be only 17.39% accurate

fOME î> R E M î E îi PLANCHE 6j. Ricinoïdes Americana , Médicinier, Viv; ON fe fert de l'amande de fon Fruit. Elle croît à la hauteur d'un arbre médiocre. Le bois eft moelleux , caftant , plein d'un fuc laiteux s âcre i les feuilles font verd foncé , liftes , luifanres. Les fleurs font à cinq pétales verd blanchâtres : elles font mâles, ou fténles. Les embrions des fruits naiflènt comme au précédent ; ils deviennent des fruits de la grofteur d'une Noix vertè à trois loges , noirs étant mûrs , chaque loge contenant une amande remplie d'une moelle blanche, douceâtre : elle fleurie en été. Elle vient au Brélîl 8c dans l'Amérique. Vertus. L'amande purge par haut & par bas j encore plus violerai ment que la précédentes PLANCHE 68. Ricinoïdes arbor Americana , Médicinier d'Efpagne; C'Eft un arbufte. ^ On fe fert de l'amande de fon fruits 11 s eleve de trois , ou quatre pieds j le tronc eft de h groïTeur du bras ; l'écorce eft cendrée verte : les feuilles font vertes eri ûelius , blanchâtres en deflbus. Le pédicule des fleurs eft écarlate , ainfi que les fleurs ; il leur fuccede un fruit prefquë gros comme une Noix jaune dd Safran extérieurement, lequel a trois graines rondes comme des Avelines , dont elles ont le gout : il fleurit en été; Il vient dans la terre ferme de l'Amérique. Vertus. ^ Cette amande purge aolîî violemment que lés précédefi

The text on this page is estimated to be only 19.00% accurate

5i PLANCHE 69. Ricînus arbor i grand Tiglia , Grains de Tilly. ON fe fert de fa graine & de fon bois. C'eft un arbufte : fes tiges font limples , fans rameaux, excepté deux qui partent de l'endroit où commence l'épi de rieurs du milieu: le bois eft léger, fpongieux ; l'écorce en eft cendrée , d'une odeur répugnante , d'un goût acre & cauftique. Les feuilles font lilïès , verd clair en deflbus. Les fleurs mâles occupent le haut des épis ; les femelles font deifous ; les mâles ont huit pétales j les femelles ont cinq pétales : il leur fuccede un fruit rond à trois loges chacune enferme une amande blanche huileufe , d'un gout âcre & bru. lant. Il vient aux Moluques , au Malabar. Vertus. L'amande , nommée grain de Tilly , eft purgative , vomitive : la dofe eft depuis trois grains , jufqu'à cinq. Le bois a la même vertu étant récent & encore verd ; il purge plus doucement étant fec ; il eft fudorinque : la dofe du bois verd , en fubftance , eft depuis un fcrupule jufqu a un demigtos. La dofe du bois fec va jufqu'à un gros ; & en infufion, jufqu'à une demi-once : à l'égard de fa vertu fudorinque , on le donne , en fubftance , depuis un demi-fcrupule jufqu'à un ; & en infufion , jufqu a deux , ou trois gros. PLANCHE 70. Café y Cafier. ON fe fert de la graine , ou feve. C'eft un arbre de médiocre taille. Les feuilles font toujours vertes , lilîes , luifantes en deiïîis , pâles en deffbus, fans odeur. Les fleurs font monopétales , divifées en cinq quartiers , blanches , ou rouge pâle , odorantes : il leur fuccede une baie molle , ronde , de la grofleur d'une cerife , qui devient, en mûnftanc,

The text on this page is estimated to be only 16.91% accurate

 S3 ronge foncé, contenant une chair pâle, d'un gout fade : elle enferme deux coques accoliées , d'un blanc jaunâtre , dont chacune enveloppe une graine qu'on nomme feve, d'un verdpâle , ou jaunâtre. H vient dans l'Arabie heureufe & dans l'Ethiopie : il y porte fleurs &c fruits toute l'année. Vertus. La feve eft ftomachale, apéritive, hyftérique , diurétique. La, Jofe eft une once réduite en poudre , & rorréfiée dans deux livres d'eau chaude. Elle devient fudorifique en la mettant entière, au nombre de fept , ou huit, infuiée dans l'eau chaude comme le Thé. PLANCHE 71. Nux Mofchata , Mufcadier. ON fe fert du noyau du fruit Ôc de fa féconde enveloppe , nommée Macis. C'eft un arbre de la hauteur du Poirier ; fon écorce eft cendrée. Les feuilles font verd foncé en deffus , blanchâtres en deïïous , lilTes , leur odeur eft aromatique , pénétrante. Les fleurs font à cinq pétales jaunâtres : il leur fuccede un fruit gros comme une Pêche médiocre , ayant dans fon milieu un noyau couvert de trois écorces. La première, ou extérieure, eft molle, fucculente, épaifle d'un doigr , velue, ronfle, parfemée de taches jaune doré, & purpurines comme un Abricot, d'un gout acre , aftringent. Celle du milieu eft mince, partagée en lanières, comme cartilagineufe , d'une odeur aromatique très-agréable , d'un gout âcre , aromatique , un peu amer , jaunâtre: celle-ci fe nomme Macis , ou fleur de Mufcade. La troifieme eft mince , dure , d'un brun roufleâcre : celle-ci enveloppe immédiatement le noyau qui fe nomme Mufcade. Ladite Mufcade eft de couleur brune , panachée intérieurement de jaune & de brun , d'une odeur très-agréable, d'un gout âcre, mais fuave. 11 vient dans les Illes Moluques.

The text on this page is estimated to be only 19.38% accurate

$4 EXOTIQUES. Vertus et Usages. La Mufcade eft ftomachique, carminative, cordiale, aîexi. pharmaque , aftringente. Le Macis a les mêmes vertus j il eft moins allongent. La dofe eft depuis un fcrupule jufqu'à un demi-gros en fubf. tance, Se torréfiée jufqu'à une once. Elle entre dans l'Eleétuaire de Satyrion , l'Emplâtre céphali, que , ftomachique. Le Macis entre dans les Tablettes de magnanimité, la Poudre digeftive contre l'avortement , l'Orviétan, l'Opiat de Salomon, l'ElecTiuaire Diaphœnic , la Bénédicte laxaîive. La Mufcade Se le Macis entrent dans les Tablettes ftomachiques , la Poudre aromatique de rofes , la Poudre de joie. PLANCHE 72.. Nux vomica major , Noix vomi que. ON fe fert du noyau du fruit. Ceft un grand arbre ; le tronc a dix pieds de tour : leforce eft noirâtre &c amere. Les feuilles ont un gout très-amer. Les rieurs font monopétales en entonnoir } divifé en cinq Earties : il leur fuccede un fruit lifte , jaune doré étant mût, 'écorce du fruit eft très-amere ; le dedans eft un mucilage blanc, contenant quinze femences, difpofées fur trois lignes velues , verdâtres , très-ameres : ces femences , ou noyaux } font çe qu'on nomme Noix vomique. Jl vient au Malabar , à la Côte de Coiomandel. V E K. T U S, Cette Noix, ou femence , eft un poifon qui tue les animaux a pattes Se les oifeaux : il n'eft pas fur qu'elle foit alexipharmaque pour les hommes ; ainfi il eft plus prudent de ne pas remploYer en Médecine.

The text on this page is estimated to be only 19.64% accurate

TOME PREMIER. J5 PLANCHE 73Nux vomica minor , féconde Noix vomique, ON fe fert du bois de cet arbre : on l'appelle Bois de Couleuvre , parce qu'on prétend qu'il guérit la morfure du ferpenr chaperonné , cobras de capelo en EfpagnoL 11 ne diffère du précédent , que par la grandeur de fes feuilles , fruits & graines. 11 vient dans les Ifles de Solor & de Timor. Vertus. Comme ce bois récent eft auflî dangereux que la Noix vomique précédente, il faut en porter le même jugement ; cependant lorfqu'il eft vieux, il eft fébrifuge & antivermineux , depuis deux gros jufqu'à une demi-once. PLANCHE 74. Faba fancii Ignatiï , vomica s Feve S. Ignace. ON fe ferr du noyau du fruit. Certe plante grimpe, en ferpentant , jufqu'au haut des plus grands arbres. Le tronc en devient quelquefois gros comme le bras; Fécorce en eft épailfe , cendrée. Les rieurs rellemblent à celles du Grenadier, Pl. 361. Il leur fuccede un fruit plus gros qu'un Melon, de couleur verd fale \ le dedans eft plein d'une pulpe jaune, molle, un peu amere , dans laquelle il y a ordinairement vingt-quatre noyaux de la groiïeur d'une Noix , très-durs , d'un blanc verdâtre. Elle vient dans les Ifles Philippines. Vertus. La Feve S, Ignace eft à peu près aufil dangereufe que la Noix vomique : elle attaque les nerfs , ainfi elle doit être adminiftrée avec bien de la circonfpedion , en très petite dofc , comme de .quelques grains en poudre, alors elle fera fébrifuge, ftomachique, diurétique, hyftérique, fudorifique : elle deviendra vomitive à la dofe de dix , ou douze grains. D4

The text on this page is estimated to be only 16.86% accurate

EXOTIQUES. PLANCHE 7S' Carthamus y Safran bâtard, Ann. ON fe fert de fes graines & des fleurs. La tige devient haute de deux pieds & plus : les feuilles iont liftes , garnies à leurs bords de petites épines. Les fleurs font i fleurons , d'un beau rouge de Crocus foncé ■ il leur fuccede des graines fans aigrettes , très-blanches , lui! iantes : elles contiennent une forte d'amande blanchâtre d'un gout douceâtre , p„ls âcre, répugnante:^ fleurit en été. Elle fe cultive en Efpagne , en Italie , en France. Vertus et Usages. La graine eft purgative, ïndlîve , pedloralej mais elle eft contraire à l'eftomac , aififi que les fleurs ; c'eft pourquoi on les prefcnt rarement : la dofe en fubftance , de l'amande , après avoir oté l'écorce , eft d'un gros à deux ; en émulfion , depuis lix gros jufqu'i une once : les fleurs pilées à la dofe d'un gros. Les graines entrent dans J'Elettuaire Diacarthami. PLANCHE j6. Anifum indicum, Badlan , Anis de Ja Chine. ON fe fert du noyau de fon fruit. C'eft un arbre dont le tronc a dix pieds & plus de haut Les fleurs font à feize pétales en double rang ; il leur fuccede des fruits compofés de plufîeurs capfules , réunies à un centre commun , d'une couleur extérieurement rouille de fer chacune contenant deux noyaux Hifes , luifants , applaris, couleur de graine de Un, chacun renfermant une amande blanchâtre, douce , d'une odeur & d'un gout forts d'Anis & de Fenouil. 11 vient en Tartarie , à la Chine , aux Ifles Philippines. V E R TUS. m L'amande, ou femence de Badiane eft ftomachale, carrrûnative, diurétique.

The text on this page is estimated to be only 19.63% accurate

TOME PREMIER. 57 o SUCS APPELLES BAUMES,
PLANCHE 77Liquidambarum , Liquïdambar. fe fert du baume de l'arbre. ' C'eft un grand arbre. Les racines s'étendent de rous côtés ; le tronc eft droit, l'écorce eft d'un verd ronfTeâtre , odorante. Les feuilles font vertes en deffus, blanchâtres en deffous. Les fleurs font ramaflees en tête : elles font à éramines. H leur fuccede des fruits compofés de plufieurs capfules , dans lefquelles font des graines oblongues arrondies. Le fuc, ou baume de cet arbre, découle de l'écorce, ou de lui-même , ou par incifion. Il eft odorant & très-pénétrant : fon odeur approche du Storax Se de l'Ambre -, fon goût eft acre & aromatique : fa couleur eft jaune rougeâtre. Il vient dans la Virginie, la nouvelle Efpagne, à la Louyfiane & autres Provinces de l'Amérique Méridionale. Vertus. Le Baume eft hyftérique , adeuciflanr, pectoral, réfolutif. Le Storax liquide reflemble en tout au Liquidambar -, les feules différences font que les feuilles font moins profondément découpées , les fruits plus petits , & leurs pointes moins Cultantes. Il vient au Pérou, en Arabie. PLANCHE 78. Therebïnthus 3 Thérébinthe. ON fe fert de fon Baume qui fe nomme Thércbentine de Chio. C'eft un arbre toujours verd, de la grofleur d'un Poirier; lecorce eft épaifTe Bç cendrée: les feuilles font verd foncé. Les fleurs du Thérébinthe mâle font à examines, pourpres & ftériles.

The text on this page is estimated to be only 21.23% accurate

5S EXOTIQUES. Les fleurs de la femelle n'ont point d'étamines : il leur foccède un fruit , ou coque, jaune rouge , qui contient une amande. 7/ fleurît au printemps. Le Baume , qu'on nomme Thérébentine , découle de l'arbre par les incifions qu'on fait au tronc & aux branches : ce fuc , on réfine , qui eft blanc, tirant fur le bleuâtre, eft prefqua fans odeur & fans gout ; il s'épaiflît peu à peu. Il vient dans l'Ifle de Chîo. Vertus et Usages. Le fuc balfamîque eft pe&oral , diurétique , vulnéraire : U dofe eft, depuis un demi-gros, jufqoa un gros & demi. Cette Thérébentine entre dans la Thériaque , le Mithridar , les Trochifques de Cyphi. PLANCHE 79Larix , Mélefe. ON fe ferr de fon baume nommé Thérébentine de Venife, C'eft un grand arbre : le tronc eft droit; i'écorce eft vers la naiflance des branches , brune & gerfée : dans tout le refte elle eft lifte. Le bois eft noirâtre, odorant. Les fleurs mâles font des chatons àétamines : les fruits nailTent en d'autres endroits ; ils font à écailles, fous chacune defquelles font placées deux petites graines , ayant une coque cendrée, remplie d'une amande blanchâtre , du gout des Pignons doux ci-devant, PI. 65 : les jeunes fruits font d'un beau pourpre- Il fleurît au printemps. Il croît dans les Montagnes de Styrie , de Carynthie , en Savoie, en France, dans le Briançonnois. Le fuc réllneux découle de lui-même , ou par incifion , comme une eau huileufe , claire , qui jaunit & s'épaiflît enfuite. Vertus et Usages. La Thérébentine de Venife eft balfamique, laxative , diurétique, vulnéraire.

The text on this page is estimated to be only 19.61% accurate

TOME PREMIER. i i — i i " m-nriïïTT— — ■ imm i iim^ W^w —^^ PLANCHE 80. Abïes , Sapin. ON fe fert de fon baume nommé Thérébentine de Strasbourg. C'eft un grand arbre , dont le tronc eft très-droit ; l'écorce eft , vers la naiftance des branches , brune & gerfée : dans tout le refte elle eft lifte; le bois eft rouflèârre , odorant. Les fleurs mâles font des châtons à étamines , ftériles : les fruits viennent à part ; ils font à écailles, fous chacune defquelles font placées deux petites graines blanchâtres , remplies d'une humeur grafle , acre. Les fruits de cette efpece de Sapin ont La pointe^ en haut : il fleurît au printemps. II vient en Allemagne & dans les Pays du Nord. Cette refine fe tire , par incifion , de quelques groffeurs qui fe trouvent placées dans l'écorce : les fruits verds en donnent suffi : elle eft d'abord liquide , puis elle s'épaiffit : elle eft moins vifqueufe que celle du Mélefe ci-deffus , d'une odeur plus agréable , plus amere au gout , tirant fur l'odeur & le gout du Citron. Vertus, Elles font les mêmes des précédents. PLANCHE 8l. Pinus Genovinfa y Pin de Genève. ON fe fert de fon fuc nommé rétine de Pin. C'eft un arbre femblable au Pin ordinaire , Pl. 65 , excepté qu'il eft moins élevé ; fes feuilles plus courtes , fes fruits plus petits : il fleurit au printemps. II vient en Provence & en Guienne. La réline , qui fuinte naturellement de cet arbre, fe nomme réfine de Cône : on appelle celle qu'on en tire par incifion, réfine de Pin. Vertus. Cette refine , qu'on nomme auflî Thérébenrine commune , a les mêmes vertus des précédentes : cependant on les lui préfère.

The text on this page is estimated to be only 19.23% accurate

EXOTIQUES. RÉSINES SOLIDES. PLANCHE 82. Arbor Jiliqiiofa , Gomme animé. ON fe fert de fa réfine. C'eft un très-grand arbre - y fon écorce eft couleur de Marron , épaiffe , ridée. Les feuilles font verd gai , Iuifantes , paroifTanr percées comme le Milpertuis. Ses fleurs font papillonnacées , tirant furie pourpre : il leur fuccede un fruit en forme de goufTe , longue d'environ un pied, large de deux pouces , d'une couleur de Châtaigne 5 le dedans eft rempli de fibres , parfemées d'une farine jaunâtre : au travers de ces fibres il paroît quatre , ou cinq graines femblables à des Pignons doux , PL 65 , mais quatre fois plus grandes, couvertes d'une petite peau brun clair. Il découle de cet arbre une réfine tranfparente , blanchâtre , ou jaunâtre, qui devient dure comme l'Ambre , & qui rend, quand on la brûle, une odeur très-agréable. II vienr dans toutes les liles de l'Amérique. Vertus. La réfine eft corroborât! ve , nervale, fortifiante extérieurement. PLANCHE 8 3 • Beljoïnum , Benjoin. ON fe fert de fa réfine. C'eft un grand arbre : les feuilles font blanchâtres en delfous. . Les fleurs font à étamiaes cinq à cinq , dans une enveloppe commune , découpées en quatre parties : il leur fuccede des efpeces de noix rondes applades ; l'écorce en eft charnue, cendrée : elle entoure une coque cendrée qui renferme uns amande couverte d'une peau rougeârre : cette amande eft blanche.

The text on this page is estimated to be only 19.21% accurate

 Il découle de cer arbre , par incifion , une réfine dure , feche , compose de petits morceaux brillants, d'un jaune clair, qui rendent une odeur agréable lorfqu'on les brûle, 8c d'un goun réfineux. Il vient à Siam & dans les Ifles de Java & Sumatra. Vertus et Us Ages. • Sa réfine eft pectorale. Extérieurement elle eft nervine. Elle entre dans la Poudre céphalique odorante , les Trocfaif

The text on this page is estimated to be only 20.89% accurate

Si EXOTIQUE Si Vertus et Usages. _ Le Camphre eft anodin, diaphonique , diurétique, hyftérique, alexipharmaque : ladofeeft, depuis trois grains, jufqu'à un fcrupule en bol , ou diflous , avec l'huile d'amande douce. Extérieurement il eft réfolutif, vulnéraire, adouciifant. Il entre dans la Confection d'Hyacinthe , les Trochifques dé Camphre, le Blanc de Rhafis, les Trochifques de rofes , les Pilules hyftériques, la Poudre de Sperniole, le Diaphonique de Paracelfe, l'Onguent de Cérufe, le Deflïcatif rouge ,1e Gérât Santalin , l'Emplâtre ftyptique , pour les Ganglions , le Diabotanum. PLANCHE 8 y. Hedera arborea , Lierre. QUoique le Lierre vienne par-tout , dans nos Pays, cependant il tient fa place ici parmi les Exotiques, à caufe qu'il jette une ré fine en Perfe Se dans les Pays Orientaux, qu'il ne donne point dans les nôtres, ou très-rarement, & qu'il eft mention ici des Réfines étrangères. C'eft un arbufte rampant Se grimpant ; 1 ecorce eft cendrée j le bois eft dur Se blanc ; les feuilles font vertes toute l'année : elles ont un gout acre, aftringent. Les fleurs font à cinq pétales, blanc verdâtre : il leurfuccede une baie grofle comme celle du Genièvre, PL 88, noire, qui contient quatre ou cinq graines moëlleufes en dedans : H fleurie en été. \ La larme , ou réfine de Lierre , eft une fubftance dure , feche , couleur de rouille de fer, répandant une odeur agréable, quand on la brûle, d'un gout un peu acre , Se légèrement aftringent. Vertus et Usages. On ne s'en fert qu'à l'extérieur. Elle eft vulnéraire, déterfive, réfolutive. Elle entre dans l'Onguent d'Altbcea, de Charas*

The text on this page is estimated to be only 20.50% accurate

TOME PREMIER. gf PLANCHE 86. Cifius ladanifera, Ladanum. ON fe fert de fa réfine. C'eft un arbrifleau-. La racine eft longue d'un pied, fibrée, noirâtre en dehors; blanchâtre en dedans. L'arbrifleau eft compofé de quantité de rameaux de la groffeur d'un pouce, bruns , ou cendrés, fubdivifés en d'autres plus menus , d'un rouge foncé , & les plus jeunes verds blanchâtres & velus : les feuilles font verd foncé. Les fleurs font à cinq pétales pourpres : il leur fuccede un fruit rond divifé en dix loges , remplies de petites graines rouffes : il fleurit en été. Il eft très - commun dans l'Iile de Crète , fur les Montagnes. Comme fa réfine enduit principalement les feuilles , on la recueille en traînant de(Tus plufieurs lanières de cuir attachées côte à côte , à un râteau fans dents , lefquelles on racle enfui te pour en ôter la réfine qui s'y trouve attachée , qu'on nomme le Ladanum : il eft roux noirâtre , & d'une odeur agréable. Vertus et Usages. La réfine eft ftomachale , fortifiante , aftringente : la dofe eft un gros ; mais on s'en fert peu intérieurement. Extérieurement elle eft réfolurive , émolliente. Elle entre dans l'Emplâtre céphalique , ftomachique, pour les hernies , les Paftilles de Charas. PLANCHE 87. Lemifcus vulgaris , Maftic , Lentifque. ON fe fert de fa féline. C'eft un arbre de la hauteur du Coignalfier. La racine eft dure , fibrée. Les feuilles font verd gai , luifantes , d'une odeur forte, d'un gout légèrement aigre, aftringent. Les fleurs font en grappes à écamines dans le lentifque mâle ,

The text on this page is estimated to be only 20.26% accurate

H EXOTIQUES. rougeârres : elles naiffent de l'aiffelle des feuilles. // fleurît etl été. Les fruits naiffent par grappes dans le lentifque femelle; i]s font longs de deux lignes , un peu arrondis , noirâtres } durs contenant une amande blanche odorante. Il vient dans rifle de Chio & autres Mes de l'Archipel, en Efpagne , en Italie , en Languedoc. La refîne, qu'on nomme Maftic, découle d'elle - même, & auffi par incifion : elle eft jaune pâle , feche , s'amollit par la chaleur , Se répand fur les charbons une odeur agréable : fon gout eft aromatique , un peu aftringent. Vutus et Usages. Le Maftic eft ftomachal , aftringent , fortifiant Se adouciffant intérieurement Se extérieurement. Il entre dans la Poudre de rofes , contre l'avortement , l'Hiere Picre , FEleétuaire de fuc de rofes , les Troehifques de Karabé, d'Hefdicros , les Pilules Jînequibus, Polycreftes , ftomachiques de Rhubarbe , d'Ammoniac, Univerfelles , l'Huile de Maftic , l'Onguent Martiatum , Styptique, le Mondificatif de refîne , le Cérat ftomachique » l'Emplâtre céphalique , ftomachique , diaphonique , Manus Dei , Divin , de Chaipi , d'Oxi. crocéum , pour les fractures. PLANCHE 88. Juniperus vulgaris } Genévrier 3 Sandaraque. ON fe fert de fa réfîne nommée Sandaraque. Quoique le Genévrier foit très-commun dans les bois & fur les Montagnes de tous les Pays de l'Europe , où fouvent il ne fait qu'un buifTon touffu , & quelquefois un arbre ; cependant il ne donne fa réfine que dans les Pays chauds , en Afrique ; ceft ce qui fait qu'on le place ici avec les Exotiques. Son tronc eft de groffeur médiocre ; l'écorce eft rougeâtre ; le bois d'un rouge plus clair , d'une odeur agréable : les feuilles font luifantes } toujours vertes. Les fleurs du Genévrier mâle font des chatons écailleux à étamines 3 panachés de rouge Se de jaune foncé. // fleurit au printemps. Les

The text on this page is estimated to be only 17.92% accurate

TOME PREMIER. f Les fruits naiflent fur des pieds femelles ; ce font des baies noires , grottes comme un petit pois , rondes , remplies d'une chair rouiïeâtre , d'un gout doux , aromatique , âcre , concertant trois noyaux durs qui renferment une graine oblon^ue. La réfine, qu'on appelle Sandaraque, découle d'elle-même ouparincifion : elle eft d'un jaune pale, ou citron , feche, répandant fur les charbons ardents une odeur pénétrante , agréable, d'un gout réfineux. ° Vertus et Usages. Lé Sandaraque eft déterfif , aftringenr , confolidant : la dofé eft depuis un fcrupule juiqu'à un gros. Extérieurement il eft vulnéraire, déterfif, aftringenr. Il entre dans l'Emplâtre diaphonique & ftyptique de Charas, o PLANCHE 89. Ôxicedrus Vicia s Cèdre à baies. ,N fe fert de fa réfine. C'eft un petit arbre haut de quatre pieds Se demi : fer) tronc eft tortu & les rameaux pliants ; il a une odeur de Cyprès. ' Les fleurs mâles , qui font jaunes , reffemblent à celles du précédent : il fleurit au printemps. Les fruits du pied femelle font des baies verd pourpre, contenant plufieurs petits noyaux qui renferme une graine blanche, d'un gout femblable au précédent. ïl vient fur les Alpes & dans le Languedoc, Vertus. Elles font les mânes que du précédent ; mais on ne feniploie pas communément , à caufe qu'il eft plus rare à trouver. êm PLANCHE 90. Draco - arèor, Sang - dragon. ON fe fert de fa réfine. C'eft un grand arbre : le tronc eft gros ; les rameaux ne fane feuillés qu'aux extrémités ; les feuilles fout toujours vertes. £

The text on this page is estimated to be only 19.09% accurate

66 EXOTIQUES. Les fleurs font monopétales , découpées en fix parties, Les fruits font rouge de cerife, à trois loges, dans chacune defquelles on trouve un ou deux noyaux. Il découle du tronc de l'arbre une réfine rouge qui fe feche tout de fuite. Il croît aux Mes Canaries, & près de Madère. PLANCHE 91' Palma Amboinenjîs , Sang-dragon d'Amboine, ON fe fert de la réfine tirée de fes fruits. C'eft un arbre haut de dix-huit pieds au plus : le tronc eft gros comme le bras , droit , jaunâtre ; les feuilles font vertes , velues par les bords. Les fleurs font à fix pétales, dont les trois extérieurs font plus courts que les intérieurs. Les fruits font plus gros qu'une aveline , blanchâtres; les écaib les en font pourpres ; le dedans eft charnu : il contient un noyau. Il vient aux Indes Orientales ,.dans llfle d>: Java. Le fuc réfineux qu'on rire de fes fruits par la vapeur de l'eau chaude , eft rouge couleur de fans** ■ ■ ^— i IV il i ■ PLANCHE 9ZDraco-arbor Indica, Sang-dragon d'Inde. ON fe fett de fa réfine. C'eft un grand arbre : l'écorce eft rougeâtre , le bois dur. Les feuilles font verd gai , luifantes. Les rieurs font petites , jaunes , odorantes, d'un gout un peu amer. Les fruits font une efpece de goufle de couleur cendrée , contenant deux ou trois graines tirant fur la forme des Haricots, luifantes, dures. Il croît dans Fille de Java &c près de Batavia. Sa réfine fe tire par incifion ; la liqueur fe condenfe en larmes rouges. Vertus et Usages des trois Sangs - dragons. Les réfines de chacun de ces trois arbres fe reffemblent , Se ont les mêmes vertus , qui font d'être in caftan tes , deilïcati-*

The text on this page is estimated to be only 16.74% accurate

TOME PREMIER. gf yes, aftringences : la dofe eft depuis un demi-gros jufqu'^ ya gros. Extérieurement elles font vulnéraires , aftringenres. Elles entrent dans la Poudre dyfentérique, les Pilules poue lagonorrhée de Charas, l'Emplâtre ftypcique, pour l'enclouure du Cheval , d'Albâtre. 0 PLANCHE 93. Styrax folio mali cotonei > Storax. N fe fert de fa réline. - . Ce.ft un arbre de ia grandeur d'un Olivier ; il reflembla au Coignaffier , Pl. 234, par fon tronc, fon écorce 8c fes feuilles qui font vertes, luifantes en deftus, blanches & cotoneufeS en delfous. Les fleurs reflemblenc aux fleurs d'Orange ; elles font monopétales découpées en C\x, blanches : il leurfuccede un fruit gros comme une noiferte, blanchâtre , charnu , douceâtre , puis amer , renfermant un ou deux noyaux très-durs, rouge brun , luifants , contenant une amande blanche , d'une odeur réfîneufe , d'un gout acre & défagréable : il fleurit en été. Il vient en Sy ne , en Silicie Ôc en Provence ; mais il n'y donne point de remettons. La refîne, qui découle des fentes de l'arbre, eft jaune rougeâtre, brillante, parfemée de quelques miettes blanchâtres. Vertus et Usages. Cette réfîne eft céphalique , cordiale , pectorale, alexitaîre ; la dofe eft depuis un demi-fcrupule jufqu'à un demi-gros. Extérieurement en fumigation elle eft céphalique , fortifiante< Elle entre dans la Poudre de Joie, céphalique, odorante , la Thériaque , le Mithridat , le Diafcordittm , les Trochifques d'Alipta Mufqués , le Baume apoplectique, la Pommade des Boutiques , l'Onguent Martiatum , l'Emplâtre céphalique & ftomac nique, les Paftilles de Chypre.

The text on this page is estimated to be only 19.66% accurate

«8 EXOTIQUES. PLANCHE 94» Ta.camah.aca , Tacamaque. N fe fert de fa réfine. C'eft un grand arbre qui reflemble aflfez au Peuplier-, il eft fort odorant : les feuilles font vertes delTus , blanchâtres deffous. Les fleurs reffemblent tout-à-fait à celles du Peuplier; les fruits fonr -petits, de couleur fauve, renfermant un noyau fait comme un noyau de pêche. •11 vient dans. la nouvelle Efpagne, en d'autres endroits de l'Amérique & dans rifle de Madagafcar. Sa réfine découle d'elle-même , & auflî par incifion ; la meilleure eft la première : elle eft en larmes, jaune verdatre , d'une odeur aromatique , pénétrante , très-agréable , d'un gout aromatique , réfineux. La féconde eft de différentes couleurs & d'une odeur plus foible. Vertus et Usages. On emploie rarement cette réfine à l'intérieur , quoiqu'elle palfe pour peétorale. Extérieurement elle eft adouciflante , réfolutive , ftomachale, hyftérique, fortifiante. Elle entte dans l'Emplâtre céphalique , odorant, ftomachique , pour la Matrice , Diabotanum , de Maftic de la Pharm. de Londres. SUCS G O M M E U X. PLANCHE 9 S' Acacia vera, Acacia de la Gomme Arabique, ON fe fert de fa gomme. C'eft un grand arbre épineux ; le tronc a un pied depaiffeur ; les feuilles font verd obfcur. Les (leurs forment une boule d'un jaune couleur d or : elles font monopétales en tayau grêle découpé en cinq quartiers:

The text on this page is estimated to be only 17.96% accurate

TOME PREMIER. ^ j| leur fuccede une goulfe longue d'environ cinq pouces , rouf, feâtre , qui contient, encre chaque étranglement , une graine couleur de Châtaigne : il fleurit en été. il vient en Egypte près le grand Caire, en Arabie, aux Côtes d'Afrique. Sa gomme découle des fentes du tronc & des rameaux en larmes jaune pâle. Vertus et Usages. La Gomme Arabique eft adoucilfante , pectorale , tempérante : ladofe eft, en poudre, depuis un fcrupule jufquadeux

The text on this page is estimated to be only 16.24% accurate

7o EXOTIQUES. rnatique de Rofes , Diarrhodon , des crois Santaux , les Troçhîfques blancs de Rhafi , de Karabé , de Camphre. PLANCHE 97' Fraxinus humilior , } Manne Je Calabre. Fraxinus rotundiorc jouo ON fe fert de leur fuc épaiffi , ou fuc mielleux. Ces deux Frênes, qui donnent la Manne, reffemblent au Frêne ordinaire , Pl. 277- Les différences font que le premier ne vient jamais fi haut, & que fes feuilles font plus peti, tes > & que le fécond a les feuilles plus arrondies : ils fleurirent au printemps. Ces deux Frênes donnent également de la Manne. Us viennent dans la Calabre , dans la Sicile & autres endroits de l'Italie. Le Suc mielleux , qu'on nomme Manne , fort du tronc des branches & feuilles d'abord d'elle-même, & en fuite par incifîon ; la première , qui eft la Manne en larmes } eît la plus pure 5 la féconde , qu'on tire par incifion , fe nomme Manne grajfe ; elle eft plus groffiere. La Manne a un gout doux & agréable. Vertus et Usages. La Manne eft un purgatif doux , hydragogue : la Manne grajfe paffe pour être plus purgative que la Manne en larmes. Elle entre dans l'Eleduaire Diacarthami , dans l'Hydragogue excellent de RenaudoC, la Confection Hamech réformée de ri tir lis " La Manne de Biuançon fe tire du Meleze , Pl. 75». On la recueille deffus fes feuilles , vers la fin de l'été., dans les années chaudes & feches : elle eft blanche , douce , agréable -y mais elle purge bien moins que la précédente : auffi elle eft de peu dufage.

The text on this page is estimated to be only 18.69% accurate

TOME PREMIER, 7t PLANCHE 98. Alhagi, Manne d'Orient, Viv. ON fe fert de fou fuc mielleux. La racine eft brune. Les tiges s'élèvent d'un pied & demi & plus , épineufes , verd blanchâtre : les épines font petites & molles. Les fleurs font légumineufes , pourpre très- clair : il leur fuccede une gouiïe écarlate pâle ; entre chaque étranglement eft une graine rouge de la forme d'un rein. Elle vient en Arménie , en Géorgie , en Perfe , en Egypte & dans quelques Ifles de l'Archipel. Son Suc-, ou Manne, fe trouve par-tout fur la Plante, en forme de gouttes rouffeâtres. Vertus. Elles font les mêmes que la Manne de Calabre ci-deffus ; mais il faut la nettoyer de toutes les faletés qui s'y rencontrent : c'en: pourquoi on s'en fert très - rarement. G O M ME S RÉSINES. PLANCHE 99A [fa -fœtida , Vi v . ON fe fert de fon Suc réfineux tiré de fa racine. La racine eft grande , noire en dehors , blanche en dedans , d'une odeur de Poireau. La tige eft unique , haute de trois pieds , moëlleufe : les feuilles font liffes , verd foncé , d'une odeur aflez forre , d'un gouc aromatique , acre , fétide. Les fleurs font en parafol , blanchâtres : il leur fuccede un fruit femblable à celui du Panais , mais plus grand & plus noir. Elle vient en Perfe fur le haut des Montagnes, le long du Golfe Perfique. Le fuc fe tire de la racine par incifion : il eft d'abord blanc & liquide ; il devient enfuite brun Se vifqueux : fon odeur eft très-forte Ôc très-défagréable. E 4

The text on this page is estimated to be only 15.68% accurate

n EXOTIQUES. Vertus et Usages. L'Afla-fétida , ou le ftic rire de fa racine, eft hyftérique dtaphorétique , fudoriiique : la dofe eft depuis douze grains juf! qu'à un gros. Extérieurement il eft hyftérique, rcfolutif, émollienr. Il entre dans la Poudre hyftérique , les Trochifques de Myrrhe, le Baume Utérin , l'Emplâtre pour la Matrice. PLANCHE IOO. Euphorbïum , Euphorbe. ON fe fert de fon fuc gommeux réfineux. C'eft un arbrifleau qui devient de plus de -dix pieds de La racine eft grofle : elle s'enfonce droit en rerre , fîbreufe brune en dehors , blanche & ligneufe en dedans. L'écorce du tronc & des branches eft verd brun en dehors : le dedans eft rempli par une pulpe blanchâtre , laiteufe: les feuilles font crénelées, épineufès. Les rieurs viennent dans les finuoficës des feuilles : elles font à cinq pétales j U leur fuccede des fruits d'un rouge léger 4 trois loges, d'un gout aftringent : elles contiennent- chacune une graine ronde, cendrée en dehors, blanchâtre en dedans : il fleurit en été. Il vient en Afrique & au Malabar. Le fuc découle par incifion de tonte la plante ; il eft laiteux, acre , un peu brûlant ; il n'a point d'odeur 3 il devient "couleur d'or, Vertus et Usa ges. C'eft un purgatif hydragogue , trop violent pour s'en fervir Intérieurement j extérieurement il eft incifif, digeftif. Il entre dans les Pilules d'Euphorbe de Quercctan, Fétides, le grand Philoniurn , l'Huile d'Euphorbe.

The text on this page is estimated to be only 18.33% accurate

TOME PREMIER. ?j PLANCHE IOI. Oreofeiinum galbaniferum , Galbanum , Viv. ON fe fert de fon fuc gommeux réfineux. La racine eft aflez grotte , ligneufe , pâle. Les tiges ont cinq pieds & plus de haut, remplies d'une moelle blanchâtre : les feuilles font verd de mer , d'une odeur & d'un goût âcre. Les fleurs font en parafol, jaunes; il leur fuccede deux graines accollées , prefque rondes , applaties, cannelées, brun roux, d'un gout aromatique piquant : elle fleurit en été. Elle vient en Syrie, en Mauritanie, en Perfe, en Afrique. Vertus et Usages. Le Suc nommé Galbanum , eft peétoral > apéritif , carminatif, hyftérique, alexiraire. Extérieurement il eft incifif , maturatif , émollient. 11 entre dans la Thériaque, le Mithridat, le Diafcordium » l'Onguent des Apôtres, le Baume Utérin de Charas, l'Onguent Althsa , l'Emplâtre de Galbanum, le Diachilum avec les Gommes, l'Emplâtre de Mucilage, Matins Dei , Magnétique, Divin, pour la Matrice, l'Oxicroccum, le Styptique , le Diabotanum. SUCS EXTRAITS. PLANCHE I02. Alo'è foccotrina , Aloès fùccotrin , Viv. ON fe fert de fon fuc. f La racine eft couvette d'une écotee cendrée : elle eft tubéreufe. r , -rr La tige s'éleve d'un pied & demi; les feuilles font epailles, verd foncé. . .. . Les fleurs font monopétales en tuyau , purpurines : il leur fuccede des fruits triangulaires partagés en trois loges remplies 4e graines : elle fleurit en été.

The text on this page is estimated to be only 16.77% accurate

74 EXOTIQUES Elle vient dans liile de Saccotora. Le fuc fe tire en incifant , ou coupant les feuilles en traversce lue en sepaiffiffant devient de couleur jaune fauve, très' amer. ' iS* Vertus et Usages. Il eft purgatif , hyftérique, apéritif, ftonwcruqae : la dofe, en iubftance, eft depuis un fcrupule jufquà deux, en Bol ou Pilules Extérieurement il eft vulnéraire, déterfif. Il entre dans la Teinture d'Aloès , l'Elixir de Propriété l'Afli Picra, l'Hiéra d'Agaric , l'Hiéra Logudii , les Pilules Alo'ëphars gines de la Pharmacopée de Londres , d'Hiéra fimples & composes , Agrégatives, ou Polycreftes, d Ammoniac, Cochées Fétides, d'Or, Sine qui bus ^ Stomachiques, Angéliques , Merl cunelles , Impériales de Lyon , Hyftériques , Mézentériques Hydropiques & Tartareufes de Bontius, Tartareufes de Schrol der, l'Extrait Panchymagogue , l'Huile de Scorpion compofée 1 Onguent Arthanica , le Mondificatif d'Ache , l'Emplâtre de Paracelfe, de Charpie, leStyptique, le Collyre de Lanfranc. PLANCHE IO3. Alo'é vulgarisa Aloès hépatique, Yiv. ON fe fert de fon fuc. La racine a deux pouces & plus d'épaiflbur , & au moins un pied de long, fibrée. La tige a juïqua trois pieds de haut ; les feuilles font épate fes, charnues, garnies de vaifleaux pleins d'un fuc jaune trèsamer. Les fleurs font monopétales en tuyau, jaunâtres, avec des lignes verd pâle ; il leur fuccede un fruit triangulaire à trois loges , rempli de graines plates : elle fleurit en été. Elle vient dans les deux Indes. On pile les feuilles pour en exprimer le fuc qu'on fait ficher au foleil_ L'Aloès Caballin eft le marc qu'on fait ficher de même : c'eft celui qu'on emploie pour les chevaux. Vertus. L'Abès Hépatique a les mêmes vernis mm le Succomn qu'on

The text on this page is estimated to be only 18.28% accurate

TOME PREMIER. 7j lui préfère toujours, attendu que celui-ci eft plus grofHer, épais Se dcfagréable. o PLANCHE 104Scammonia Syriaca, Scamrnonée, Viv, N fe fert de fon fuc réfineux. La racine eft épaiife , reffemblant à celle de la couleuvrée, Pl. 1 S 1 , brune en dehors , blanchâtre en dedans , laiteufe , fibreufe. Les tiges ont jufqu'à cinq pieds de longueur , grimpantes , ou fe répandant fur terre. Les feuilles font verd foncé. Les fleurs font monopétales , blanches , tirant fur le pourpre , reflemblant à celles du petit Liferon , Pl. 557: il leur fuccede une capfule pointue , pleine de graines noirâtres. Elle vient en Syrie , autour d'Alep. Le fuc fe retire de la racine qu'on incife ; il devient opaque Se gtis noir. Vertus et Usages. Ce fnc eft purgatif, hydragogue, mais non fans danger, quand il n'eft pas bien corrigé & adminiftré. La Scamrnonée entre dans les Pilules Polycreftes , Cochées, Fétides , Dorées , Sine qu'thus s Mézentériques , Mercunelles , de Sagapénum , d'Hiere de Coloquinte , la Bénédicte laxative , le Diaprun folutif compofé , le Diaphcenic , la Confection Hamech , l'Electuaire de Pfyllium , le Caryocoftin , l'Opiat Mezenrérique laxative, l'Eleftuaire Diacatharmi, de Citron, SoIucif de Suc de rofes. PLANCHE 10 y. Carcapulli} Gomme gutte. ON fe fert de fon fuc gommeux réfineux. C'eft un grand arbre. La racine eft grolfe & fe répand au large. Le tronc a dix à douze pied, de tour ; l'écorce eft rougeatre , ayant un croûte noirâtre en dehors , & d'un blanc tirant fut le

The text on this page is estimated to be only 16.27% accurate

76 , EXOTIQUES.]aune en dedans; les feuilles font verd foncé, Juifantes en deuV • verd gai par-defïbus , d'un gout acide. 1 Les fleurs font à quatre pétales , couleur de chair & ;ailn* très, ians odeur, d'un gout un peu acide; il leur foccede des fruits gros comme une Cerife , a côte de melon , d'un blanc jaune, pulpeux, renfermant des graines bleu foncé , oblon^'es grofles comme le doigt, plates. & * Il croît â la Chine , 'à Siam , à Camboie Se dans quelques Pa,, de l'Amérique. ^ ™ . Le fuc fe tire par incifion ; il devient opaque 5c dur d'un faune fafrané , fans odeur & prefque fans gout. Vertus et Usages. Ce fuc gommeux eft un violent purgatif hydragogue * il n'eu; pas fans inconvénient quand il eft mal dofé : la dote eft depuis deux grains jufqu'à cinq & fix , & il purge par haut & par bas depuis quatre grains jufqu'à huit ou dix. Il entre dans l'EIedtuaire antihydropique , l'Extrait Catholique êc Cholagogue de Rolficius, les Pilules hydropiques de Go mme gutte PLANCHE I06. Papaver honenfe s Pavot blanc, Opium, Ann. N fe fort de fon fuc gommeux réfîneux & des graines. La racine eft prefque grofle du doigt, pleine d'un lait amer. La tige eft de trois pieds de haut ; les feuilles font verd de o mer Les fleurs font à quatre pétales blancs ; il leur foccede un fruit gros comme un œuf, dans lequel font nombre de petites graines blanches, d'un gout huileux. Toute la plante eft laiteufe : elle fleurit en été. Elle vient en Perfe, en Egypte, en Natolie, aux Indes: on la cultive dans les Jardins. Le fuc , qu'on nomme Opium , diftillé des incitions que l'on fait au fruit; il devient compacte, d'un roux noirâtre, d'une odeur aflbupiflànte & défagréable , d'un gout âcre & amer. Nota. Ce Pavot , cultive dans nos Jardins , ne donne point d'Opium.

The text on this page is estimated to be only 19.60% accurate

TOME PREMIER. yj Vertus et Usages. L'Opium eft très-narcotique intérieurement; mais , fuivant la dofe , il fait fbuvenr. des effets contraires 5 car il endort , ou il empêche de dormir: il donne la mort, ou il appaife les douleurs par le fomineil ; la jufte dofe eft ordinairement d'un grain. Extérieurement il eft incilif , réfolutif, émollient. Il entre dans la Thériaque , lé Mithridat , le Diafcordium , l'Orviétan, le Philonium Romain, de Perfe , de Mefvé, les pilules de CynoglofTe , de Matthieu , le Baume Hypnotique de Charas , le Repos de Nicolas , les Trochifques de Karaté. Les graines entrent dans le Sirop de Jujubes , la Poudre de Rofes 3e l'Abbé d'Hali , le Repos de Nicolas , le Philonium , jes Trochifques d'Alkelcenge, de Gordon. Nota. On fait, avec les graines, de l'huile qui n'a aucune vertu aflbupiffante , qu'on nomme Huile d'GEillette, de façon qu'en bien des Pays oa s'en fert au lieu d'Huile d'Olive. PLANCHE I07. Acacia fpinis ternis , Acacia du Sénégal. CEt Acacia eft mal nommé à la tête de cette Planche ; car le nom à' Acacia folio feorpioides leguminofa eft une des Parafes de l'Acacia vera , Pl. 95, & celui-ci doit être nommé Acacia fpinis ternis 3 Acacia du Sénégal ; il donne , comme \A~ cacia vera, Pl. 515 , la Gomme Arabique , & nullement le fuc dont il eft ici queftion ; c'eft Y Acacia vera qui le donne : pour cet effet on prend fes gouttes non encore mûres , on les arrofe d'eau, on les broie , on les exprime , puis on les fait bouillit pour épaiffir le fuc dont on forme de petites maffes. Vertus et Usages. • Ce fuc eft incraffant , ftomachique , répereuffif , aftringent : la dofe eft depuis un demi-gros jufqu'à un gros. Il entre dans la Thériaque, le Mithridat, les Trochifques de Karabé , l'Onguent Styptique. A l'égard de l'Acacia du Sénégal repréfenté dans cette Planche 107. C'eft un arbre de quinze à vingt pieds , épineux.

The text on this page is estimated to be only 17.90% accurate

7* EXOTIQUES. fous eC°rCe §rife * 16 b°iS r°LIge ' leS feUllIeS VCrd pâle en ^ Les fleurs font en épi à cinq pétales rouges ; il leur fucceik des gouttes longues , blanchâtres , contenant des graines de même couleur , rondes , applaties : il ficurit en été. H vient en Afrique , au Sénégal. Vertus. Il donne la Gomme Arabique , pareille à celle de V Acacia, vcra : cette Gomme fort d'elle-même de l'arbre, & elle a les rrè, mes vertus. PLANCHE 108. Prunus fylveftris^ Acacia de notre Pays Prunelien ON fe fert du fuc de fes fruits, de fon écorce , des fleurs & feuilles. C'en: un arbrifleau épineux , fort commun dans les haies. La racine eft noire. L ecorce eft cendrée ; les feuilles font verd foncé. Les fleurs paroiflent avanr les feuilles ; elles font à cinq pétales blancs , un peu odorantes , tmeres ; il leur fuccede un fruit gros comme un grain de raifîn , d'un bleu très-foncé, d'un gout fort aftringent , contenant un petit noyau, imitant celui de h Cerife, mais plus alongé , lequel renferme une amande : ilfiew rit au printemps. Il vient par-tout dans nos climats. On exprime le fuc des fruits non tout-à-fait mûrs , 8c on le fait épaiffir en cuifant, jufqu'à confiftence d'extrait folide qu'on nomme Acacia nojîras, ou Acacia d'Allemagne , & on le fubftitue à celui d'Acacia vcra ci-deflus. Voyez l'explication de la Pl. 107. Vertus et Usages. Ce fuc eft plus aftringent que celui & Acacia vera. L ecorce, les feuilles & les fruits non encore mûrs, fonE aftringents , defficadfs , rafraîchiflants. Les fleurs fraîches & les fruits bien mûrs font laxatifs. Les feuilles entrent dans l'Onguent de la Comtefle.

The text on this page is estimated to be only 17.38% accurate

TOME PREMIER. 7, PLANCHE lOp. Hyppocijîis s Hyppociftc , Ann. ON fe fert de l'extrait de fon fuc. C'eft une plante parafite : elle vient au bas du tronc , ou fur les racines du Cifte, Pl. 86. La tige monte de trois ou quatre pouces , en s elargifiànt depuis quatre ou cinq lignes jufqu a un ou deux pouces : fa couleur , ainfi que celle de fes écailles , varient , foie blanchâtres , pourprées , jaunes , &c. Les rieurs font monopétales en cloche terminée en quatre parties rouges comme le calice du Grenadier, Pl. 361 ; il leur fuccede un fruit de la même couleur , plein d'un fuc clair & gluant, rempli de quantité de très-petites graines. Il fleurit en été. Pour avoir ce fuc on pile les fruits récents j on en exprime le jus, on le fait fécher au foleilj il s'y épaiffit j ufqu'à conliftence d'extrait folidd Vertus et \j s a g e s. Ce fuc a les mêmes vertus de celui d'Acacia ci-deflus ; il eft très-aftringenc : la dofe eft depuis un demi-gros jufqu'à un gros. II entre dans la Thériaque, le Mithridar } les Trocliifques de Karabé , l'Emplâtre Royal pour les hernies. PLANCHE HO. Areca palmœ foins Cachou. O N fe fert de l'extrait du fruit. C'eft un grand arbre. La racine eft épailîè de huit pouces , longue , noirâtre. L ecorce eft verd gai , liffe & très-unie ; le tronc a huit pouces de diamètre près la racine : les feuilles font vertes , luifanres. Les fleurs & les fruits ont chacun les gaines qui les enferment à part l'une de l'autre : ces gaines fon jaunâtres en dehors. Les gaines s'ouvrent ; les fleurs fe voient alors : elles font à ttois pétales ; celles des fruits ouvertes , les fruits mûriflent Se

The text on this page is estimated to be only 19.27% accurate

Se EXOTIQUES, deviennent jaune doré , remplis d'une moelle jaunâtre ; ils retfc ferment un noyau gros comme une aveline, couleur de canelles légèrement allongent. 11 vient aux Indes , vers la Mer , à Surate , au Pégu „ an Malabat. Vertus. Le fuc du fruit devient dur & folide pat ébullition j il eft aftringent , ftomachal , pecloral. DU JUS DE RÉGLISSE. Voye\ pour la defcrïpdon de la Plante, la PL 17. CE jus eft le fuc de fa racine , épaiffi par ébullition ; il devient compacte , fec & noir. Vertus. Ce fuc eft un excellent béchique. Il entre dans la Thériaque > dans les Trochifques noirs de Charas. PLANCHE ï IIAfundo faccharifera , Canne de lucre , ViV; ON fe fert du fuc extrait de la plante. _ La tige eft haute de neuf à dix pieds, line, luifanre; d'Un verd jaune, remplie d'une moelle blanche & douce 5 les feuilles font verd jaunâtre. Les fleurs font! étamines, renfermées dans un duvet léger: il leur fuccede une feule graine pointue, étroite. Cette efpece de Rofeau , nommé Canne de lucre , vient dans les Mes Canaries, dans les Indes, dans les Pays chauds de l'Amérique. On tire fon fuc en prenant la plante , & enfuité on le rend un extrait folide par ébullition. Vertus et Usages. Cet extrait , nommé fucre , eft béchique , adoilciflant , ftoînachal j il entre dans prefque tous les remèdes internes. Le fuc, extrait fur le lieu, devient gris ou roux, & fe nomme Mofcouade !

The text on this page is estimated to be only 17.63% accurate

TOME PREMIER. §t JVlofcouade : on le raffine ou purifie par plufieurs procédés ; ort a d'abord la Caffonade , puis le Sucre raffiné , le Sucre Royal j le Sucre Candi. Exrérieurement il eft vulnéraire. PLANCHE 112. Arundo mambu Bambou, Viv. ON fe fert de fon iiic épaiflî & durci. La racine eft genouillée & fibrée. Les riges avant que de donner leurs rameaux, s'élèvent de douze à quinzepieds : elles font verd brun étant tendres & nouvelles i elles deviennent, en vieilliflant , d'un blanc jaunâtre; elles fonc remplies de moelle : les feuilles font vertes. Les fleurs font à étamines dans des épis écailleux comme le froment. 11 vient aux Indes Orientales. La moelle du dedans du Mambu eft liquide : elle fuihte Se k durcit à l'air , de façon qu'elle paroît en confiftance de fuerg plus ou moins blanc ; alors fon gout eft un peu aftringent. Vertus. Ce Sucre eft adouciffant. PLANCHE Acer mont anum , Erable de Canada. ON fe fert de fon fuc épaiflî. C'eft un grand arbre. Les feuilles font verd foncé en deflus , prefque blanches eri deftous : leurs queues font rougeâtres. Les fleurs font à plufieurs pétales, d'un blanc verdâtre; il leur fuccede un fruit compofé de deux ou trois cnpfules ailées ; chacune contient une graine blanche arrondie : il fleurît au printemps, II vient en Canada. Le fuc fe tire par incifion j on le fait épaiflîr par ébullitioh ; il devient un fucre brun, pareil en tout au trai fucre, &rayane les mêmes vertus. $

The text on this page is estimated to be only 19.12% accurate

'84 î X O T ï Q U È S. PLANCHE 114Apocinum Syriacum > Apocin d'Egypte Viv. ON fe fert de fon fucre. Elle s'élève à Trois pieds , Iaiteufe , amere , acre ; toute la plante paraît faiipoudrée d'une farine blanche. Les rieurs lbnt à cinq pétales d'un jaune fafcané \ il leur fuc. cède des fruits taillés en Poire rerïverfée , verds dehors , jau. nés dedans , remplis d'un duvet blanc & moux comme de la foie , dans lequel font des graines, imitant en petit celles de la Citrouille » brunes en dehors , blanchâtres en dedans , d'un gout amer : elle fleurit en été. Elle vient en Egypte. La larme laiteufe , qui découle de cette plante, fe fige & fe durcit en efpece de fucre; mais ce fucre eft acre &c brûlant, & ne paroîr pas avoir aucunes qualités des Sucres précédents. ë mi , CHAMPIGNONS, GALLES, âc. PLANCHE ny. Tuhera cervina , Truffles de cerf, Ann. C'Eft une efpece de Truffle ou Champignon qni croît en terre comme les autres Truffles ; il s'en trouve depuis la groffeur d'une Aveline , jufqu'à celle d'une Noix : fon écorce imite le cuir : elle eft gris roux; la fubftance du dedans eft entre dure & molle, d'un noir pourpré, divifée en cellules pleines de petits -grains : cette Truffle fraîche a une odeur fpermatique forte. Elle vient fur les hautes montagnes d'Allemagne 6c dans le* bois en Hongrie. Vertus. Elle eft aphrodifiaque : la dofe en poudre eft d'un gros à un gros ôc demi. Aurïcula Judœy Oreille de Judas , Ann. C'eft une excroiiïance tirant furie Champignon, qui vient vers

The text on this page is estimated to be only 17.17% accurate

TOME PREMIER. $$ Jobas du tronc des vieux Sureaux ; elfe eft attachée an tronc comme l'Agaric ci-deflous-, noirâtre en - deflus, gris blanc en deilbus, unie, fpongieufe, coriace, faifant quelques replis qui imitent une Oreille. Vertus. Extérieurement elle eft delïicative , aftringente. PLANCHE II 6. Agaricum s Agaric, Viv. C'Eft une fubftance fongueufe imitant le Champignon. II en vient fut différents arbres • mais on ne fe fert en Médecine que de celui qui fe trouve attaché fur le tronc du Meleze , Pi. 79, où il eft figuré en petit ; il s'en rencontre de différentes groffeurs,, ou comme le poing , ou comme la tête. L'écorce eft dure , gris, roufleâtre ; la fubftance du dedans eft fongueufe, blanche, friable, & comme de la farine, d'ua gout d'abord douceâtre, puis amer, acre, dégoûtant, légèrement aftringent. On fe fert de fa fubftance intérieure. Vertus et Usages. L'Agaric eft purgatif hydragogue , béchique, incifif : la dofe eft en fubftance, depuis un demi-gros jufqu'à un gros & demi; & en infufion ou en décoction, depuis deux gros jufqu'à une de mi- once. 11 entre dans la Thériaque , le Mithridat, la Confection Hamecli, PHiere Picre avec l'Agaric, l'Hiere de Coloquinte, le Sirop de Rofes avec le Séné & l'Agaric, d'Hellébore, de Quercétan , les Pilules d'Agaric, Sine quïbus 3 Mercuriales. Galloe, Noix de Galles d'Alcp. C'eft une extravafion de la feve nourricière des feuilles du Chêne , occafionnée par la piquure de certains Moucherons qui en même-temps y dépofent leurs œufs ; la feve recouvre ces ceufs , &: forme autour une enveloppe ronde dure , plus ou moins raboteufe , de couleur rouffé. Quajid les Infe&es, qui y ont cru, en veulent fortir , ils y foat F 1

The text on this page is estimated to be only 19.62% accurate

84 Exotiques. un trou; fi on n'y apperçoir aucune ouverture, on les y trouve pu en Nymphes , on en Moucherons. Les meilleures Noix de Galles font celles d'Alep en Arménieplies font grottes comme une petice Noix ou une Aveline, verdâtres ou noirâtres , réfmeufes en dedans. Vertus. Elles font aftringentes , fébrifuges : la dofe eft depuis un demi-gros jufqu'à un gros. Extérieurement elles font répercuffives. o PLANCHE ÏI7. Ilex aculeata , Kermès. N fe fert de l'Infecte qui fe nourrit fur l'arbrifleau qu'on va décrire. L'arbriiTeau eft un Chêne verd ; c'eft-à-dire, dont les feuilles toujours vertes ne tombent point* La racine s'étend en rampant en long & en large, rougeâtre pu noirâtre. Les feuilles font d'un beau verd; lecorce du tronc eft blan. châtre ou cendrée. Les fleurs font mâles & femelles fur le même pied ; les mâles font à étamines raiïemblées fur un chaton lâche ; les femelles font fans étamines , en forme de bouton , qui devient un gland ïïflez petit, Il fleurît au printemps. Il vient en Italie , en Éfpagne, en Languedoc, en Provence, Le Kermès eft un petir Infecte qui fe nourrit & pafle fa vie fur le Chêne verd qu'on vient de décrire. Voyez A 5. fur la Planche. Cet animal, plus petit qu'un grain de Millet, fe 6xe, au premier printemps , en grand nombre fur l'arbre ; il y relie immobile , fuçant fa feve j il s'enfle ainfi peu à peu. Enfin , il devient rond & gros comme un pois ; alors il eft tour entouré d'un duvet cotoneux. La femelle fait fes petits fous elle : elle meurt enftute; & fa carcaflè, relfemblant à une moitié de coque, les met à couvert jufqu'à ce qu'ils en forrenr pour recommencer la même manœuvre : ils font alors d'une belle couleur écarlate ; on détache, avec l'ongle, les coques, œufs & petits ; on arrofe le four de vinaigre , puis on fait fécher au foJeil , après avoir féparé |es coques comme inutiles,

The text on this page is estimated to be only 22.42% accurate

TOME PREMIER. z$ Vertus et Usages. Le Kermès eft aftringent, ftomachal, cordial, hyftérique : Ia dore en iubitance efl: depuis un demi-fcrtipule jufqu'à une demionce ; 8c en Sirop, depuis une demi-once jufqua une once. Le Sirop entre dans la Confection Alkermès , & la Poudre dans la Confection d'Hyacinte , la Poudre de Perles rafraîchiffante. PLANCHE II 8. Opuntia , Raquette , Cochenille. N fefert de l'Infecte qui fe nourrit fur la Plante qu'on va décrire. La Plante fe nomme en François , Raquette ou Figue d'Inde: elle n'a point de tiges, mais des feuilles fingulieres , d'un verd clair, ^ très- épaifles & charnues, parfemces en quinconce de petites épines imitant des éperons : dans cette efpece d'Opuntia , les fleurs font jaunes à pbfieurs pétales : il leur fuccede des fruits rouges relfemblant pour la forme & lagroÛeur, à des Figues ordinaires : elle fleurit en été, Elle vient en Amérique , au Mexique. Le petit Animal , qu'on nomme Cochenille , & qui s'attache fur cette Raquette , eft du genre du précédent , de la même groffeur, fe fixant de même fur la plante pour fe nourrir de fon fuc ; du refte fes procédés font les mêmes : fa couleur eft cramoifi , autrement d'un rouge pourpre. On en fait la récolte en les détachant de delfiis la plante , puis on les fait mourir dans l'eau bouillante , enfuite fécher au foleil ou au four : ils deviennent alors gris cendré mêlé de rouge. Vertus et Usages. La Cochenille a les mêmes vertus que le Kermès : elle eft alexipharmaque & fébrifuge. File entre dans la Confection Alkermès. Fin du premier Tome & des Exotiques.

The text on this page is estimated to be only 14.87% accurate

INDIGENES. Tome II. A, hanche î 19. Abrotanum mas , Aurone mâle, Viv. ON fe fert de fes feuilles Se fommités fleuries. La racine elr ligneuie , un peu fibrée. Les tiges s'élèvent de quatre ou cinq pieds, rougeârres, cannelées , remplies de moelle blanche ; les feuilles font verd blanchâtre , d'une odeur forte , d'un gout acre Se amer. Les fleurs font à fleurons très-courts , jaunâtres j il leur fuccede de petites graines fans aigrettes : elle fleurit en été. Elle vient fur îes montagnes en Italie & dans nos Pays chauds. Vertus et Usages. Elle eft apéritlve, incifive, hyftérique, vexmifuge; mais oii s'en fert rarement. Elle entre dans l'Onguent Martial-. PLANCHE I20. Abrotanum fœmina 3 Garderobbe , Viv. ON fe fert de fes feuilles, fommités fleuries Se graines, La racine eft ligneufe , branchue. Les tiges s'élèvent d'un pied & demi, garnies d'un duvet blanchâtre, ainfl que les feuilles qui font d'une odeur aromatique à forte, d'un gout acre & amer. Les fleurs font à fleurons jaunes y il leur fuccede Une grainâ longuette brune, fans aigrette : elle fleurit en été. Elle vient en Provence , en Italie , aux lieux incultes; Vertus et Usages. Elle a les mêmes vertus Se ufages de la précédente , Se elle eft ftufli rarement en ufage, G a.

The text on this page is estimated to be only 18.64% accurate

INDIGENES. PLANCHE 121. Abfcynthium majus, Grande Abfynthe, B. Ann. ON fe fert de fes feuilles & fommkcs fleuries. La racine eft fibreufe s ligneufe , d'un gout aromatique , agréable. La tige s'élève à deux & trois pieds de hauteur , cannelée , blanchâtre , moëlleufe. Les feuilles font blanchâtres , d'une odeur aromatique forte, d'un "out très-amer. Les fieurs font à fleurons jaunes : il leur fuccede une petite graine fans aigrette : elle fleurît en été. On la cultive dans les Jardins. Vertus kt Usages. Elle eft ftomachique, apéritive, hyftériqne, fébrifuge; la dofe, en infufîôri dans le vin ou dans l'eau, eft de quatre à fix onces. Extérieurement elle eft vulnéraire , réfolutive. Elle entre dans la Poudre de Palmarius , contre la rage, le Sirop Cachectique, Lientérique , la Confection Hamech, les Pilules Sine quitus 3 Aggrégarives , de Rhubarbe ftomachiques , l'Onguent Martiatum , le Mondificatif d'Ache , l'Emplâtre de Mélilot , le Baume Tranquille des Cordeliers , l'Eau Vulnéraire. PLANCHE 122. Abfcynthium minus Jîve Ponticum , Petite Abfynthe , Viv. ON fe fert de fes feuilles 8c fommirés fleuries. Les racines font petites & en quantité, ribreufes, d'un gout aromatique. Les tiges s'élevenc d'un pied & demi ou de deux pieds , verdâtres ou pourprées ; les feuilles font garnies d'un duvet court ëc blanc ; leur odeur eft douce ; leur gout amer. Les fleurs reffemblent à celles de la précédente j mais plus petites Se plus odorantes que les feuilles : dU fleurie en été. On la cultive dans les jardins.

The text on this page is estimated to be only 18.22% accurate

TOME SÈCONÛ. 9S Vertus. Elle a les mêmes vertus de la précédente j mais plus foibles. PLANCHE 12-3JcanthtiS fativus vd mollis ^ Branche Urfine, Viv» ON fe fert de fes feuilles. La racine eft charnue, fe répandant de roits côtés, noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans , garnie de chevelu. La tige s'élève à trois pieds j les feuilles font verd foncé , luifautes. Les fleurs font grandes , monopétales , couleur de chair \ il leur fuccede un fruit en forme de Gland partagé en deux loges , chacune renfermant une graine applatie routfeâtre ; clic fleurit m étéToute la plante eft remplie d'un fuc gluant. Elle vient en Italie , en Sicile. Vertus. Elle eft une des cinq Plantes émollïentes. Elle eft adoucilfante \ on l'emploie en lavements, cataplafmes , fomentations. PLANCHE 124. Acetofa pratenfis , Ofeille longue, Viv. /~\N fe fert de fes feuilles , racine & graine. \J La racine eft longue , jaunâtre , fibreufe , d'un gout amer, altringent. Les tiges s élèvent jufqu'à un pied & demi ; les feuilles fonc verd foncé , d'un gout acide. Les fleurs font à étamines ; il leur fuccede un fruit à trois angles , qai contient une graine triangulaire couleur de Châtaigne : elle fleurit en été. Elle vient dans les prés Se bois : on la cultive dans les Potagers. Acetofa hortenjisy Ofeille ronde, Viv. On fe fert. des mêmes parties de la précédente.

The text on this page is estimated to be only 18.74% accurate

9x t N D I 'G E M £ î. La racine eft rampante , menue , d'un gout aftringent. Les tiges s'élèvent d'un pied j les feuilles font verd de mer, Les fleurs & fruits comme la précédente : elle fleurit en été. On la cultive dans les Potagers. Vertus et Usages des deux Oseilles. Elles ont les mêmes vertus j on s'en fert intérieurement & extérieurement. Intérieurement -elles -font adouciffantes , rafraîchiflantes , fébrifuges , antifcorbutiques. La racine eft apéritive , diurétique. La graine eft cordiale, aftringente , adouciflante. Extérieurement les feuilles font réfolutives, maturatives , fuppuratives. ' Elle entre dans l'Opiat de Salomon. Sa graine entre dans k Confection d'Hyacinthe, la Poudre de 'Perles rafraîchiÏÏànte , le Sirop d'Ellébore , le Diafcordium. PLANCHE 12. J. Adiantum verum , Capillaire de Montpellier, ViV. ON fe fert de toute la plante. La racine eft menue , fîbreufe, oblique en terre. Les tiges ont environ un demi-pied de longueur : elles fe répandent obliquement fur terre. Les feuilles font verd ordinaire , an peu odorantes ; leur gouc eft légèrement amer, aftringent , agréable : elles font vertes toute l'année. Elle n'a point de fleurs apparentes -, les fruits font des amas de petites graines prefque imperceptibles , cachées fous les replis des bouts des feuilles. Elle vient en Languedoc , aux bords des puits , fur les rochers humides. Adiantum Americanum , Capillaire de Canada, Viv. On fe fert de toute la plante. La racine eft très-menue , fibrée Se garnie de chevelu noir. Les tiges s'élèvent depuis huit pouces jufqu'àdeux pieds & plus , pourpre foncé , luifantes.

The text on this page is estimated to be only 17.53% accurate

TOME SECOND. Les Feuilles font verd ordinaire, d'une odeur & d'un goût Agréable , un peu acte. Elle n'a point de fleurs apparentes ; les fruits viennent aux mêmes endroits qu'à la précédente. Elle vient en Amérique , dans le Bréfil , la Virginie & le Canada. PLANCHE 126. Aiiantum nigrum, Capillaire noir commun, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft mince, oblique en terre, garnie de fibres & de chevelu noir , d'un gout âcre &c un peu douceâtre. Les feuilles & leurs queues font longues d'environ huit pouces, noires, luifantes. Elle n'a point de fleurs apparentes ; les fruits font appliqués à" l'envers des, feuilles, compofés de petites graines , formant des lignes qui imitent des nervures. Elle vient à l'ombre fur des racines d'arbres , furies vieilles murailles. PLANCHE 127. Adiantum album , Capillaire blanc , Vi v. ON fe fert de toute la plante. La racine elt un peu plus grolfe que celle de la précédente^ garnie de fibres noirâtres : elle eft verdâtre , d'un gout douceâtre , très-afhingent. Les feuilles Scieurs queues d'un verd' noirâtre , font de la longueur de la précédente. Elle n'a point de rieurs apparentes j les fruits viennent à l'envers des feuilles , par petits boutons , remplis par des graines roufleâtres imperceptibles. Toute la plante eft quafi infipide au gout , ÔC douce, avec fore peu d'aftriclion. Elle vient à l'ombre , fur le bord des fontaines & fur de vieilles murailles. •sue*

The text on this page is estimated to be only 23.19% accurate

INDIGENES, PLANCHE IZ8. Adiantum ruta muraria , Sauve-vie, Viv. ^■~"\N fe fert de toute la plante. V^/ La racine eft menue , chevelue , noirâtre , d'un gout un peu aftnngent. Les riges ont deux- ou trois pouces de long , verdâcres , noirâtres, rougeârres. Les feuilles font vertes en deflus , roulTeâtres par-delîous , d'un gout acre , douceâcre , un peu aftringent, Elle n'a pas de fleurs apparentes j les fruits parodient à l'envers des feuilles , en pouiîieres fines imitant des nervures. Elle vient fur les rochers , dans les puirs , fur les murailles. Adiantum Polytrïchum^ Polytric, Yiv. On fe fert de toute la plante. La racine eft chevelue , fibreufe , noirâtre. Les riges ont cjuatre à cinq pouces de long , rouge foncé , liûfantes. Elle n'a point de fleurs apparentes ; les fruits font ralTemblés par lignes à l'envers des feuilles. Elle vient à l'ombre dans les fentes des vieux murs, des rochers humides. Vertus et Usages des six Capillaire s. Ils font ftomachiques, pectoraux , fplcniques , apéritifs , fortifiants; on les emploie en infufion , en décoction , en Sirop: la dofe eft une poignée de chaque efpece dans quatre livres d'eau. Tous les Capillaires entrent dans le Sirop Capillaire compofé de Renaudot ; le Capillaire de Canada entre dans le Sirop d'Althœa , de Jujubes , de Tuflîlage compofé , de Chicorée compofé , l'Aatinéphrétique , le Chalibé apéritif, purgatif , l'Electuaire lénitif ; le Capillaire commun entre dans le Sirop d'Alrlm, de Chicorée compofé y le Polytric dans le Sirop de Chicorée Compofé.

The text on this page is estimated to be only 20.66% accurate

TOME SECOND. «,5 PLANCHE 129. Adiantum aureum , PercemouflPc , Viv. ON fe fert de route la plante. La racine eft longue , menue , fibrée. Les tiges ont cinq à fix pouces de haut j les feuilles font jaunâtres. Elle n'a point de Heurs apparentes ; les fruits nailfent au haut des tiges en forme d'une petite tête qui renferme une potiflîere très-fine. Elle vient dans les bois. Vertus. Elle eft peu en ufage parmi nous ; cependant on l'emploie quelquefois comme Capillaire , attendu qu'elle eft pectorale & diaphorétique. On s'en fert en décoction. PLANCHE 130. Ageratum , Eupatoire de Mefvé , Yiv. ON fe fert de fes feuilles , fleurs & graines. La racine eft ligneufe , ondée , fibreufe. Les tiges ont un pied & demi & plus de hauteur, rougeâtres ou verd pâle. Les feuilles font odorantes. Les fleurs font radiées toutes jaunes \ il leur fuccede une petite graine jaune pâle : elle fleurit en été. Elle vient en Languedoc j on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. Elle eft hépatique, défobftruante , vermifuge, réfolutîve , &c. On s'en fert en décodbion & en infufion. Extérieurement elle eft réfoluciye. G 4

The text on this page is estimated to be only 18.78% accurate

5* INDIGENES. o PLANCHE Agnus Cajlus. N fe fert de fes feuilles , fomrnitçs fleuries & fruits, C'eit un arbrifieau. Les feuilles font verd brun en deifus, verd cendré par-defTcms. Les fleurs font monopctales , ou pourprées , ou mélangées ds blanc , odorantes ; il leur fuccede un fruit rond plus petif qu'rm grain de Poivre gris noirâtre, partagé en quatre loges, chacune contenant une graine oblongue très-petite ; il a un goyc âcre peu aftringent. // fleurit en été. Il vient près des Torrents & dans les Marais d'Italie & des Pays chauds. Vertus, On n'eft pas bien d'accord fur fa vertu aphrodifiaque ; les uns la foutiennent , d'autres difent qu'il a un effet contraire. On l'emploie comme hyftérique, difcuilïf, adouciffant. PLANCHE 132.. Agrlmonia , Aigremoine, V*v, ON fe fert de fes feuilles. La racine eft grotte , fîbreufe , noirâtre. La tige s'élève à trois pieds , velue ; les feuilles font verd foncé, velues , d'un gout un peu âcre aftringent. Les fleurs font à cinq pétales- jaunes -y il leur fuccede un fruit hérifle de crochets , qui renferme une ou deux graines oblongues : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux herbus incultes. Vertus et Usages, Elle eft apéritive, hépatique, aftringente : la dofe eft uns poj^née pour une livre de liqueur. Extérieurement elle eft vulnéraire , dérerfive. Elle entre dans la décoction apéritive rouge de de Lorme, le Sirop hvdragogue apéritif, cachectique mariai, apéritif purgatif , les Pilules polyereftes , le Mondifîcatif d'Ache a l'OnguetU ïïïaçtialj fjfc.au vulnérairç.

The text on this page is estimated to be only 18.36% accurate

TOME SECOND, $7 PLANCHE 133Alcea, Mauve fauvage, Viv, ON fe fert de fes racines & feuilles. La racine eft Iigneufe , oblongue , blanchâtre. La tige s'élève à trois pieds , un peu velue , moëlleufe ; les feuilles font verd foncé, velues en deflous. _ ' Les fleurs font monopétales partagées en cinq , couleur de chair , quelquefois blanches j les fruits rçffemblent à ceux de la Mauve, Pl. ? 57 : elle fleurk en été, Elle vient dans les lieux incultes. Vertus. Elle a les mêmes vertus de la Mauve , mais plus foibles; ainfi pn l'emploie rarement. Voyez Maha3 Pl. 357» PLANCHE 134. Alchimiila, Pied de lion, Viv, ON fe fert de fes feuilles. La racine eft grofle du petit doigt, oblique en terre,' rioirâcre, fibreufe, d'un goat aftringent. Les tiges s'élèvent de neuf pouces \ Jes feuilles font velues. Les fleurs font à étamines ; leur calice eft en croix dunefeule pièce; le piftil devient une ou deux graines rondes jaunâtres, fuifantes au fond du calice : elle fleurit en été. Elle vient aux endroits herbus dans les montagnes , en Provence , aux Alpes , aux Pyrénées. Vertus.. Elle eft vulnéraire , aftriugente : la dofe en poudre eft un gros; le fuc eft quatre onces , la décoction eft fix onces. Elle a les mânes vertus, extérieurement.

The text on this page is estimated to be only 16.79% accurate

*% INDIGENES. PLANCHE 13 $. Alkekengi 3 Coqueret, Viv. ON fe fert de fon fruit. La racine eft genouillée fibrée. La tige s'élève d'un pied & demi, légèrement velue, rou geatre. ' u Les fleurs font monopétales découpées en cinq , blanchâtres Le calice devient une vdlie rouge dans laquelle ell un fruit charnu rouge, gros comme uneCerife,

The text on this page is estimated to be only 19.65% accurate

TOME SECOND. 99 PLANCHE 13 6. Allium , Ail, Viv. ON fe fert de fa butbe qu'on nomme gonfle*. La racine eft compofée de filets déliés , au-de(ïus defquels fe forme une bulbe ou oignon tirant fur le purpurin , compofé de plufieurs tubercules ou caïeux enveloppés feparément, mais joints enfemble par la racine. L'odeur de cette bulbe eft trèsvive , & fon goût fort âcre. La tige s'élève d'un pied & plus , lifte, creufe : les feuilles font plates. Les fleurs font raflemblées au haut de la tige, formant une tête enveloppée d'abord d'une peau blanche terminée en pointe. Cette peau s'ouvre ; alors les fleurs paroiflent : elles font blanches à fix pétales. Il leur fuccede un fruit rond gros comme un Pois , purpurin en dehors , blanc en dedans , partagé en trois loges remplies de graines rondes noirâtres : elle fleurit ene'té. On la cultive dans les Potagers. Vertus, Elle eft alexipharmaque , ftomachale , apéritive : la dofe eft une petite goufle dans fix ou huit onces de vin blanc , ou trois gouttes dans une livre de lait. Extérieurement elle eft réfolutive. PLANCHE 137. Allioprafum 3 Roquembolle, Viv. ON fe fert des bulbes qui forment fa tète. C'eft une efpece d'Ail qui reflemble à la précédente. Les différences font que la tige fe contourne vers le haut, & forme une ou deux fpirales , que cette rige eft terminée par une tête enveloppée dans une gaine blanchâtre fi ni flanc en pointe , qui renferme les bulbes dont onfe fert , & quelques fleurs comme celles de l'Ail. Toute la plante a une forte odeur d'Ail : elle fleurie en été. On la cultive dans les Potagers : fon grand ufage eft pour la, cuifine.

The text on this page is estimated to be only 18.52% accurate

PLANCHE I38. Alnus , Aulne. ON fe fert de fon écorce , rarement de fes feuilles. C'eft un grand arbre. Le tronc en eft droit , d'une médiocre grofleur j V écorce eft raboteufe, noirâtre ; le bois rougeâtre, léger; les branches moètleufes ; leur écorce eft grifatre en dehors , jaune en dedans , d'un goût amer défagréable , un peu aftringent. Les feuilles font vertes , vifqueufes. Les fleurs mâles ou ftériles font des chatons longs de deux pouces rongeâtres , dont les fleurs font à étamines. Les fleurs femelles , ou qui portent les fruits , naiflent à part : ce font des chatons courts gros comme une Noifette , rougeârres en mûrif. fant, garnis de petites graines inégales , rougeâtres , qui renferment une amande blanche. Tous les chatons font légèrement amers aftringents : il fleurit au printemps. Il vient aux lieux humides & marécageux. o V J- R T U S. L'écorce , les chatons & les fruits , en décodion , font aftringems, répereuffifs, réfohitifs , adoucifïanrs. Les feuilles fraîches, appliquées extérieurement, font v-ulné* raires , fudorifiques. PLANCHE 139. Alfme média , Morgeline, Ann, ON fe fert de toute la plante. Les racines font fibrées , chevelues, Les tiges fe couchent par terre, longues de quatre à fîx pouces & plus , genouillées , velues. Les fleurs font à cinq pétales fendus en deux , blancs ; il leur fuccede un fruit en cône , rempli de graines rouileâtres menues ; elle fleurit prefque toute l'année. Elle vient en tous lieux.

The text on this page is estimated to be only 19.74% accurate

TOME SECOND. tQt Vertus. Elle eft rafraîchiflante , difcufiïve , réfolntive , ophtalmique : îa dofe des feuilles en Poudre , féchées à l'ombre , eft un gros ; celle du fuc déparé eft une once. Extérieurement elle eft vulnéraire , dcterfive. PLANCHE 140. Althcea y Guimauve ^ Vi v. ON te fert de fes racines , & plus rarement de fes feuilles i fleurs & graines. La racine eft une têce d'où partent des branches nombreufes , groiïes du doigt , fibreufes, mucilagineufes. Les tiges s'élèvent jufqu'à trois pieds ôc demi; les feuilles font blanchâtres , cotoneufes. Les fleurs font mcmopétales découpées en cinq , d'un blane rougeâtre ; il leur fuccede un fruit rempli de. graines arrangées en rond : elle fleurit en été. Toute la plante eft remplie d'un mucilage gluant & douceâtre. Elle vient aux endroits humides , le long des ruifièaux , dans les marais. Vertus et Usages. Elle eft adoucitfante , pectorale , diurétique : la dofe , en décoction , des racines eft une once par pinte de liqueur, des feuilles une poignée j des rieurs & graines jufqua deux gros par livre d'eau. Extérieurement elle eft maturatîve , réfolutive; les feuilles un peu plus que les racines. Les racines entrent dans le Mucilage , le Sirop compofé , les Tablettes, l'Onguent d'Altha>a, l'Onguent Marriatum , l'Emplâtre pour les fractures, de Mucilage , de Mélilot. Les graines entrent dans le Sirop de Guimauve, d'Hyflope, de Jujubes, de Marrhube , les Trochifques de Gordon , le Looc de Santé , le Sirop antinéphrétique.

The text on this page is estimated to be only 19.89% accurate

loi PLANCHE I41Amygialus , Amandier doux. ON fe fert du fruit. La racine eft force & brancîme. Le tronc eft: d'une fubftance dure & roufteàtre. Les rieurs font à cinq pétales , blanches ou purpurines : elkj viennent au premier printemps, avant les feuilles ; il leur fuccede un fruit verd dur , qui renferme une amande blanche couverte d'une pellicule roufte , d'un gout doux & agréable. On le cultive ici dans les Jardins , & dans les Pays chauds on le met dans les campagnes fablonneufes. Amygdalus amara } Amandier amer. L'Amandier, dont les amandes font ameres, ne diffère en rien du précédent. Vertus et Usages. On tire par expreffion l'huile des amandes douces. Terre huile eft très-adouciflante , peftorale, laxative : la djfe eft depuis une once jufqu'à quatre ou huit. On tire également l'huile des amandes anieres ; mais on s'en fert rarement pour l'intérieur, à caufe de leur amertume , quoiqu'elles foient incifives, déterfives, apéricives, diurétiques; mais a l'extérieur on s'en fert comme plus réfolutives que les précédentes. Elles enrrent dans l'Electuaire de baies de Laurier , dans les Trochifques de Câpres. PLANCHE 142. Anacampferos 3 Orpin , reprife , ViV. ON fe fert des racines Se feuilles. La racine eft compofée de tubercules blancs & charnus. Les tiges s'élèvent à un pied de haut j les feuilles font charnues , verd pâle. Les fleurs font à cinq pétales rouge clair ; il leur fuccede un fruit compofé de cinq cap fuies affemblées en rond, la pointe en

The text on this page is estimated to be only 17.33% accurate

TOME SECOND. ie, haut , remplies de graines très - menues : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux humides , à l'ombre , le long des haies. Vertus et Usages. Les feuilles font déterhves , aftringentes intérieurement, prifes en décoction ; mais on s'en fert rarement. Extérieurement elle eft déterfive : elle entre dans l'eau vulnéraire. PLANCHE I43. Anacampferos rhodia radix , Orpin rofe, Yiv. ON fe fert de fa racine. La racine eft en forme de gros tubercules bruns : elle a une odeur de rofe. Les tiges ne s'élèvent que de fix à fept pouces. Les feuilles , fleurs &c fruits reffemblent à la précédente : elle fleurit en été. Vertus. Elle eft céphalique , aftringente. PLANCHE 144. AnagaLlis 3 Mouron , Ann. ON fe fert de fes feuilles 8c fleurs. La racine eft fimple , blanche , fibrée. Les tiges fe répandent à terre, longues de quarre à cinq pouces, lhTes , quarrées ; les feuilles font tachetées en deflbus de points rouge foncé. Les fleurs font monopétaies découpées en cinq , rouges ou bleues ; la plante fur laquelle toutes les fleurs font rouges , a été nommée le ..mâle; Se celle qui ne porte que des fleurs bleues, h femelle : il a plu de faire cette diftinttion fans aucune raifon apparente; il leur fuccede un fruit rond rempli de graines menues brunes : elle fleurit en été. Toute la plante a un gout d'herbe falée 8c un peu âcre. £de vient par-tout indifféremment,

The text on this page is estimated to be only 20.16% accurate

i<>4 INDIGENES. Vertus et Usages. Elle eft cépîialique , alexitaire, vulnéraire : la dofe eft , en décoction , quatre onces. Extérieurement elle a les mêmes vertus. Elle entre dans le Mondificatif d'Ache-. PLANCHE I4T* Anethum, Aneth, Ann. ON fe fert de fa graine , feuilles & fommités, La racine eft menue , blanche , fibrée; La tige s'élève d'un pied &c demi ; les feuilles font verd clair, d'une odeur forte. Les fleurs font en parafol , jaunes ; il leur fuccede deux graû nés accollées , cannelées , jaune pâle : elle fleurit en été: On la cultive dans les Jardins de Botanique^ Vertus et Usages. C'eft une des quatre graines carminâtives : elle eft carminative, diurétique, hyftérique : la dofe de la graine ëft un gros. Extérieurement les trois parties ci-deuus font réfolutives, maturatives. Les fommités entrent dans l'Huile de Renard par infudon, l'Emplâtre de Grenouilles avec le Mercure , le Diachilum avec les Gommes , l'Emplâtre de Mucilage. PLANCHE 146Anifum, Anis, Ann. ON fe fert de la graine, rarement des feuilles, La racine eft menue , blanche , fibrée. La tige s'élève vers un pied & demi ; les feuilles font verd gat* Les rieurs font en parafol , blanches; il leur fuccede deux graines accollées , menues , cannelées j d'un verd grifâtre , d'une odeur & d'un gout très-agréable , doux , un peu acre : elle fleurit en été. On la cultive principalement en Touraine4 Vertus

The text on this page is estimated to be only 18.99% accurate

TOME SECOND. ÏQ5 Vertus et Usages. C'eft une des quatre grandes femences chaudes ; elle eft cârmiuative, ftomachale , béchique , diurétique, hyftérique. La dofe eft en poudre depuis un fcrupule jufqu a un gros. Elle entre dans le Sirop d'Armoife, Ântiafthmarique 5 la Poudre de Rôles , de Joie, la Thériaque , le Mithridat, leCatholicon double, le Lénitif, la Confection Harnech , l'Electuaire de Pfyllium j les Trochifques de Rhubarbe, les Pilules dorées, Polyehreftes. PLANCHE 147Anonis , Bugrandé, Arrête-bœuf, Viv. ON fe fert de la Plante entière, fur -tout de fa racine St écorcé. Les racines ont plus d'un pied de long , courant de toutes parts, brunes en dehors, blanches en dedans, d'un gout défagréable» Les tiges font rougeâtres , velues, épineufes ; les feuilles font verd foncé velues , d'une mauvaife odeur , d'un gout lcgumineux. Les fleurs font légtimineufes couleur de chair ou blanches ; il leur fuccede une goulfe courte, contenant des graines en forme de rein- : elle fleurit en été. Elle vient dans les plaines & lieux . découverts. Vertus et Usages. C'eft une des cinq petites racines apéritives ; elle eft apérîtîve / diurétique , réfolutive : la dofe de la racine ou de lecorce en poudre eft un gros , & en déco&ion une demi-once de racine. Extérieurement la décoction elt déterfive. La racine entre dans le Sirop antinéphrétique, dans l'Eau diurétique fie antinéphrétique. PLANCHE 148. Aparine , Grattcron, Ann. ON fe fert de toute la plante. La' racine eft menue , fibreufe* les tiges s'élèvent, quand elles font accottées, jufqu'lfix pieds, H

The text on this page is estimated to be only 18.75% accurate

ioff INDIGENES, quarrées , rudes au toucher , noueufes : les feuilles font rudes, Les fleurs font monopétales découpées en quatre , blanchâtres ; il leur fuccede un fruit dur velu , noirâtre, double : dans chacun eft une graine creufée dans fon milieu : elle fleurit an printemps. Elle vient dans les haies , dans les bleds. Vertus. Elle eft incifive, apéritive, défobftruante , diurétique. PLANCHE 149Apium , Ache, B. Ann. ON fe fert de . fa racine, feuilles & graines. La racine eft épaifle , profonde en terre, blanchâtre, fibrée , d'une odeur forte aromatique, d'un gout dcfagtéable, acre , un peu amer. La tige s'élève de trois à quatre pieds creufe , cannelée ; les feuilles font d'un beau verd , luifantes, d'une odeur forte, d'an gout acre. Les rieurs font en patafol , blanches -y il leur fuccede deux petites graines accolîées grifârres , cannelées, acres, aromatiques, un peu ameres : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux humides & marécageux : on la cultive dans les Potagers , fous le nom de Céleri. Vertus et Usages. La racine eft une des cinq racines apéritives ; les graines font du nombre des quatre petites femences chaudes : elle eft incifive , défobftruante , diurétique , fudorifique , fébrifuge , béchique. Extérieurement elle eft vulnéraire déterfîve. ^ La racine encre d.ms le Sirop de Chicorée compofé apéritif, cachectique, antiafthmatique , d'Hyffope, des cinq racines apéritives. Lefuc entre dans t'Eleduaire de Pfyllium , l'Emplâtre de Bétoine. Les feuilles entrent dans l'Onguent Mondificatif d'Ache. les graines encrent dans la Poudre Lithrontiptique de Renandot , la Bénédicte laxative , le Philonium Romain s les Pilules dorées.

The text on this page is estimated to be only 14.48% accurate

TOME SÈCONa lof PLANCHE ÏJO. Aquifolium , Houx. N fe fert de fa racine, de fon écorœ, rarement de fes fruits. seft un arbriiîeau toujours vetd; l'écorce extérieure eft verd cendre ; l'intérieure eft pâle , d'une odeur défagréabJe; le bois eft dur blanchâtre ; les feuilles d'un beau verd ; luifarites. Les fleurs font monopétales découpées en quatre, blanchesil leur fuccede un fruit ôu baie molle rouge , d'un gout doul ceâtre , dcfagréable , qui renferme quatre petits offelets blancs* // fleurie en Automne. Il vient dans les forêts. Vertus, , La raci,n? & 1 ecoree en déco&ion font émollierites t réfoiu.-; tives extérieurement. PLANCHE ïjl* Aquilegla , Ancolie, Yiv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft grofTe du pouce, s'enfonce avant en terre, branchue, flbreufe, blanchâtre, d'un gout douceâtre. La tige s eleve d'un pied & demi rougeâtre , un peu velue. Les fleursTontpolypérales irrégulieres , compofées de cinq pé* taies plies & cinq creux , d'une couleur violette ; il leur fuccede Un fruit cornu rempli de petites graines greffes comme le Millet, noires, luifantes , renfermant une petite amande : elle fiew Tic au printemps*. Elle vient dans les bois; On la cultive dafis les Parterres. Vertus. Elle eft apéritive, hyftérique : la dofe de la racine en poudra eft i' 1 ■ ■ * • un gros dans ie vin blanc.

The text on this page is estimated to be only 18.63% accurate

ioS INDIGENES. PLANCHE I 5ZArgcntina , Argentine , Viv. ON fe fert de la plante. La racine eft noirâtre , d'un goût aftringent. Elle n'a point de tiges ; fes feuilles iont vertes par-deflus , & garnies d'un duvet argenté en deflbus. Les fleurs font à cinq pétales jaunes ; il leur fuccede un fruit ou tète ronde formée de quantité de petites graines arrondies jaunâtres : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux humides } au bord des eaux. Vertus. Elle eft rafraîchiftante , réperculïïve , aftringente , defficative • la dofe de fon fuc eft depuis quatre onces jufqu'à fix , & la graine pilée eft un demi-gros. Extérieurement elle eft vulnéraire , aftringente. PLANCHE Armenïaca malus , Abricotier. ON fe fert de l'amande du fruit. Ç'eft un arbre de médiocre grandeur : le tronc en eft affez gros , l'écorce noire. Les fleurs viennent au premier printemps , avant les feuilles: elles font à cinq pétales blancs j il leur fuccede un fruit de la grolfeur d'une Pomme de reinette , charnu , jaune , couvert d'une peau jaune rougeàtre , d'un gout doux & agréable , renfermant un noyau uni dur, contenant une amande blanche recouverte d'une peau jaune , l'amande un peu amere : ce fruit fe nomme Abricot. On cultive cet arbre dans les Jardins fruitiers. Vertus, L'amande du fruit eft vermifuge.

The text on this page is estimated to be only 21.18% accurate

TOME SECOND. PLANCHE IJ4Artemifia } Armoife, herbe S. Jean, Viv. ON fe fert de toute la planre. La racine eft groife du doigt , rampante, fibreufe , dun gout aromatique doux. Les tiges s élèvent jufqu a cinq pieds fouvent purpurines, cannelées', un peu velues : les feuilles font vetd foncé delfus , blanchâtres deflous. Les rieurs font à fleurons pourprés, très-petites, d'une odeur aromatique agréable : il leur fuccede une graine femblable à celle de l'Abfynthe, Pl. 121 : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux frais incultes. ViRTUs et Usages. ■ Elle eft utérine , antihyftérique , antifpafmodique prife en décoction , en boiifon , en bains & lotions. On s'en fert confite , en firop en extrait : elle entre dans la poudre contre la rage, l'Eau hyftérique, l'Onguent martial, l'Emplâtre diabotanum , l'eau vulnéraire de Blonde!. PLANCHE IJJ' Arums Pied de veau, Yir. ON fe fert de fa racine. La racine eft grofle du pouce, charnue, laïteufê, blanche : elle n'a point de tiges. Les feuilles font vertes , luifantes. Quelques pieds en portent qui ont vers leur milieu des taches blanches , d'autres des taches noires. Le pédicule de la fleur s'élève d'un pied & demi cannelé ■ la fleur efc un feul pétale d'un blanc verdâtre ; le piftile eft ou jaune, ou rouge , à la bafe duquel croiftenc des fruits ronges pleins de fuc , qui occupent enfin le haut du pédicule, chacun contenant une ou deux petites graines arrondies un peu dures : elle fieurit au premier printemps. Toute la plante a un gout acre & brûlant.

The text on this page is estimated to be only 18.44% accurate

Jio INDIGENES. Elle vient à l'ombre , dans les bois Se lieux frais. Vertus et Usages. Elle eft înciaVe, atténuante, réfoïutive , ftomachaie , Fébrifuge s la dofe de la racine fraîche ou feche eft depuis un demigros jufqu'à un fcrupule. Elle entre dans la Poudre Cachectique de Quercécan. PLANCHE Ijé. Afarum , Cabaret. ON fe fert de la racine &z des feuilles. La racine eft menue j rampante, brune ou cendrée, fi. breufe , un peu amere , aromatique , ayant l'odeur de la Valériane des Jardins , Pl. 608. Elle n'a point de tiges ; les feuilles font vertes toute l'année , verd foncé , luifantes , acres & arriéres. Les fleurs fortent près de la racine : elles font à éramines pourpres; le calice eft pourpre foncé j le fond du calice devient un fruit divifé en fîx loges qui contiennent de petites graines arrori» dies comme des pépins de raifin , brunes en dehors , blanches çn dedans , un peu acres : elle fleurit au printemps. Elle vient dans les forêts, notamment dans le Parc de SaintMaur près Paris. Vertus et Usages, Les racines Se feuilles font purgatives &c vomitives, diurétiques , fudorifiques , hyftériques , apéritives : la dofe en poudre eft depuis un demi-gros jufqu'à un gros ; & en infufion, depuis Vn gros jufqu'à quatre , avec cette différence, que fi la Poudre eft fine, elle fera vomir <3c excitera les urines & les règles ; mais (1 la racine n'eft pilée que groffiérement , elle ne purgera que par bas j fi on la fait bouillir dans le vin , elle fera émériquefii purgative; & dans de l'eau, elle ne Peft plus, mais altérante, diaphorétique & diurétique. Les feuilles purgent plus fort que Jes racines, à la dofe depuis cinq jufqu'à neuf dans du vin. Extérieurement la Poudre des feuilles eft un excellent fterrM* çatoire, racine entre dans lç Sirop Hydragogue de Charas.

The text on this page is estimated to be only 17.77% accurate

TOME SECOND. m PLANCHE IJT?* Jfclepias, Dompte venin, Viv. ON fe fert des racines &c feuilles. La racine eft accompagnée de groifes fibres longues blanches ; fon odeur eft forte , fon gout eft acre , un peu amer , défagréable. . _ , , . . , La tige s'élève d'un pied & demi a deux pieds velue ; les feuilles font un peu velues, verd clair. Les fleurs font monopétales découpées en cinq , blanchâtres ; il leur fuccede deux gaines longues qui contiennent des graines touifes applaties , aigretées : elle fleurit en été. Elle vient dans les bois arides. Vertus et Usages. Les racines font alexipharmaques , fudorifiques , hyftériques; la dofe en poudre eft un gros ; & en infufion ou en décoction , depuis une demi-once jufqu'à une once dans deux livres deau. Extérieurement les feuilles & graines font deternves. PLANCHE Afparagus, Afperge, Viv. ON fe fert de la racine &c graine. Les racines font nombreufes : elles partent d une tete -, elles font charnues, blanchâtres, d'un gout douceâtre. Les tiges s'élèvent de trois ou quatre pieds : elles ionr vertes , ainfi que les feuilles, Les fleurs font à fix pétales verd pâle; il leur fuccede une baie molle rouge, groffe comme un pois , douceâtre , qui renferme deux oh trois graines noires dures : elle fleurit en ete. On la cultive dans les Potagers. Vertus et Usages. La racine eft une des cinq grandes racines apéritives. La dofe eft depuis une demi-once jufqu'à une once. ^ , „ . Elle entre dans le Sirop des cinq racines apentives , de Guimauve , Antinéphrétique, de Chicorée compofé. Les graines en

The text on this page is estimated to be only 14.39% accurate

'tu INDIGENES. jrent dans la Poudre Lithrontiptique , la Bénénédicte laxative, Nota. Qu'il^e rencontre à la campagne une efpece d'Afperge fauvage leflerablant en tout à la précédente , mais plus mince en toutes les pani« s die en a les vertus, & même fupérieures. PLANCHE I5'9Afperula^ petit Muguet, Viv, ON fe fert de toute la Plante. La racine eft rampante , menue , fibrée. Les tiges s élèvent de huit à neuf pouces quarréesj les feuilles font vetd clair , un peu rudes. Les rieurs font monopétales découpées en quarre, blanchesil leur fuccede un fruit double; c'eft-à-dire, compofé de deux globules : elle fleurit au printempsSon odeur eft très-agréable , fon gout eft un peu falé Se auftere. Elle vient dans les bois à l'ombre. Vertus, Elle eft fortifiante, apéritive. Extérieurement elle eft vulnéraire, aftringente. PLANCHE l6o. Attriplex,. Arroche, bonne Dame, Ann, ON fe fett de fes feuilles & graines. La racine eft droite en terre, longue de trois ou quatre pouces , fibreufe. La tige s "élevé de quatre à cinq pieds ; les feuilles' font verd Jaune , d'un gout fade. Les fleurs font à étainines ; il leur fuccede une capfule unique, plate & large, qui contient une graine d'un gout défagréable ; elle fleurit en été. Nota. Il y a une autre efpece d'Arrocbe toute pareille à celle-ci, &

The text on this page is estimated to be only 12.93% accurate

TOME SECOND. ïi| V E R T U S. Elle eft émolliente , laxative, carmbatiVe : la dofe des feuilles eft depuis une poignée jufqu'à deux. Extérieurement elle eft émolhente , calmante. PLANCHE Attripkx vulvaria , Arroehe puante, Ann, ON fe fert de toute la plante.^ La racine eft menue , fibrée. . Tes âges font parties rampantes , parues droites , longues de neuf à dix pouces. Les feuilles font d'un verd gris , étant couvertes d'une pouffiere blanchâtre. . , ■ Les fleurs font à élimines j il leur fuccede une feule gra ne menue, Me, noirâtre , entourée d'une cap fuie faite en ctoilç , formée 'par le calice : elle fleurit en été. _ Toute la plante fent le Hatang &1 urine. Elle vient aux lieux incultes. Vertus. Elle eft antihyftérique intérieurement & extérieurement. PLANCHE léz, Avena, Avoine, Ann, ON fe fert de la graine. Les racines font menues Se en grand nombre. Les tiges s'élèvent jufqu'à quatre pieds & plus. Les fleurs font à étamines ; le piftil devient une graine obbnguefanneufe, blanchâtre, renfermée dans les écailles du calice . elle fleurit en été. _ -, Nota. Une antre efpece d'Avoine qu'on nomme no.re , n a d autre d.fte rence de la précédente , que fa graine qui eft noirâtre. On les cultive dans les campagnes. Vertus. t 'A, -ne eft pectorale, de quelque manière qu'on la prépare. ^«7^ :cataplafme elle eft digeftive, deincauve.

The text on this page is estimated to be only 20.51% accurate

INDIGENES. PLANCHE 163. Aurantium dulci medullâ, Oranger doux. ON fe fert de fes feuilles , fleurs 3c de toutes les parties ds fon fruit. C'eft un arbre d'aflez grande taille. La racine eft épaifle , branchue , jaune en dedans. Le tronc eft. dur , blanc vers le cœur , odorant ; l'écorce efl: verd blanchâcre ; les feuilles font toujours vertes. Les fleurs font à cinq pétales blancs \ il leur fuccede un fruit gros comme une pomme , dont l'écorce eft d'un jaune doré en dehors , blanche en dedans , un peu amere. La moelle ou fuc qu'elle renferme , eft féparée en plufieurs loges, Il eft doux & agréable au gout. // fleurit en été, Aurantium acri medullâ 3 Oranger aigre. Cet arbre ne diffère du précédent que par fon fruit, dont l'écorce eft plus épaiffe , verte , amere , acre & piquante avant fa maturité , & le fuc qu'elle renferme , acide : on la nomme Bigarrade. Ils viennent dans les climats chauds des quatre parties du mon. de : on les cultive ici dans des Jardins à part. Vertus et Usages des deux Orangers. L'eau, diftillée des fleurs , eft céphatique , hyftérique, alexipharmaque , carminative , nervine, fudorifique j l'eau , diftillée des feuilles , a les mêmes vertus : la dofe eft depuis une once, jufqu a deux. Lecorce d'Orange aigre eft ftomachale, incifive , carminative , hyftérique , vermifuge. La dofe en poudre eft depuis un fcrupule jufqu a un gros. Les graines font vermifuges. Elle entre dans la teinture amere de Londres, l'Eau Thériacalo de Charas.

The text on this page is estimated to be only 18.93% accurate

TOME SECOND. >- B PLANCHE 164. Bardana , Bardane , Gloutcron, Viv. ON fe fert de fa racine , feuilles & graines. La racine eft longue d'un pied, droite en terre, épaifle, fibrée , noirâtre en dehors , blanche en dedans , douceâtre , un peu ftyptique. La tige s'élève à rrois pieds & plus velue ; les feuilles font velues, verd foncé deflus , blanchâtres deffous , ameres. Les fleurs font à fleurons purpurins \ il leur fuccede une graine oblongue, cannelée, noirâtre, garnie d'une courte aigrette; elle fleurît en été. Toute la plante a un gout acre , un peu amer. Elle vient dans les endroits humides , incultes. Vertus et Usages. La racine eft diurétique , fudorifique , pe&orale , utérine, fébrifuge , vulnéraire : la dofe en poudre eft un gros ; &c en décoction jufqu a une once par livre d'eau. Les feuilles & fleurs ont les mêmes vertus , leur fuc dofé à quatre onces. La femence eft très-diurétique : la dofe eft jufqu'à un gros dans le vin blanc. _ . Les feuilles extérieurement font vulnéraires , refolutives : elles entrent dans i'Onguent populeum de Nicolas de Salerne. PLANCHE l6$. Beccabunga^ Viv, ON fe fert de toute la plante. , La racine eft rampanre, fibrée, Les tiges s'étendent de côté & d'autres, longues de deux pieds ou environ ..rougeâtres : les feuilles font verd foncé , ludantes. Les fleurs font monopétales découpées en quatre , bleues ; il leur fuccede un fruit plac , en cœur , divifé en deux loges qu» contiennent plufieurs petites graines plates ; elle fleurit en etc.

The text on this page is estimated to be only 19.32% accurate

The text on this page is estimated to be only 20.96% accurate

Tomé second. ixf Bellis minor 3 Pafquerette, Viv. On fe fert de fes feuilles , fleurs & racines. La racine eft menue, fibreufe. Elle n'a point de tiges; les pédicules des fleurs deviennent longs d'un demi-pied j les fleurs fonr radiées, bien plus petites que celles de la précédente, leur reflemblant en tout,& pour les couleurs ; les demi-fleurons de celle-ci font quelquefois teints en dehors d'un pourpre clair ; il leur fuccede une petite graine fans aigrette : elle fleurit au printemps. Les deux Marguerites ci-deffus viennent dans les prairies. Vertus et Usages des deux Marguerites. Elles ont toutes deux les mêmes vertus : elles font émollientes, vulnéraires , réfolutives , déterfives : la dofe des feuilles Se fleurs en décoction , eft une poignée. La décoction de la grande Marguerite cueillie avant les fleurs, ainfi que l'infufion des feuilles & fleurs, eft diurétique, vulnéraire. La Pafquerette eft antipleurétique, vulnéraire. Elles entrent routes deux dans l'Eau vulnéraire de Charas. PLANCHE Btrberis y Epine-vinette. ON fê fert de fa racine , fruits & graines. C'eft un artrrilTeau. La racine eft jaunâtre, rampante, branchue, fibreufe , amere & ltyptique. Les tiges ou Jets ont cinq pieds de long, épineux, jaunes en dedans ; les feuilles font verd gai, liftes, d'un gout acide. Les fleurs font à fix pétales jaunes , d'une odeur forte ; il leur fuccede un fruit rouge mol , contenant un fuc acide , dans lequel font un ou deux noyaux allongés : il fleurit en été. H vient dans les haies * on le cultive dans les Jardins fruitiers. Vertus et Usages. Les fruits font rafraîchiflants , aftringents , cordiaux , alexipharmaques j leur fuc s'emploie à la dofe d'une once.

The text on this page is estimated to be only 18.19% accurate

i$ INDIGENES. Les noyaux font defficatifs, aftringencs à la dofe d'un gros eh poudre. 5 La partie jaune de 1 'écorce de la racine effc apéritive. Les fruits entrent dans le Sirop Myrrhin de Charas. Le à> dans le Sirop de Corail , dyfentérique. Les noyaux dans la p0Ui dre de Rofes , le Diaprun fimple , l'Eledtuaire de Pfyllhim. PLANCHE 169, Berula , Berle, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft rampante , fibreufe , blanche Les tiges font longues d'un pied & demi à deux pieds, ca& nelées, creufes. Les fleurs font en parafai , blanches ; il leur fuccede deux périîtes graines accollées , cannelées , d'un gouc acre ; elle fleurit en éii. Elle vient au bord des ruilTeaux & dans l'eau. Vertus, Elle eft antifcorbutique, apéritive, diurétique, hyftérique. Extérieurement elle eft réfolurive. PLANCHE 170. Beta3 Bête, Poirée, Viv. ON fe fert de fes feuilles &C racine. La racine eft groiïe du petit doigt , longue , blanche. La tige s'élève de trois ou quatre pieds j les feuilles font tantôt verd pâle & tantôt plus foncé. Les fleurs font à étamines jaunâtres; il leur fuccede un fruit rond & par bofles , qui contient une "raine ronde roueeâtre : elle jieurtt en ete. Nota, Qu'il y a une efpece de Bête ou Poirée dont les feuilles font rouget, d'ailleurs touce femblable à la précédente. On les cultive dans les Potagers. Vertus. C'eft une des quatre plantes êmollientes. La déco&ioû de feuilles eft laxative , adouciffànte. Son fuc eft décerfif, fternutatoire.

The text on this page is estimated to be only 19.49% accurate

TOMÉ SËCOMD. tt9 PLANCHE I7I. Betonica, Bétoine, Viv, ON fe fett de fes feuilles & fleurs. La racine eft grofle du pouce , fibreufe , d'un gout amer. Les tiges font hautes d'un pied & demi, quarrées; les feuilles font verd foncé velues. Les fleurs fonr monopétales en gueule , pourpres ; il leur fuccede quatre graines brunes au fond du calice : elle fleurit en été. Elle vient dans les bois. Vertus et Usages. ^ Elle efl: céphalique, utérine, diurétique, vulnéraire, réfolutive : la dofe eit une poignée en infufion comme le Thé, ou en décoction. Les feuilles féchées , & en Poudre, font un excellent fternutatoire. Elle entre dans la Poudre conrrela rage, le Sirop d'Armoife, de Guimauve de Lemery, l'Emplâtre de Bétoine, de gracia Dei\ le Mondiiicatif d'Ache , l'Onguent Martiatum , l'Eau vulnéraire de Lemery. PLANCHE 172. Betula , Bouleau. ON fe fert de fon écorce & feuilles , & de fes larmes. C'eft un arbre aflez haut. 11 y a plufieurs écorces; la première eft raboteufe , blanchâtre; la féconde ttès-mince, lifle , luifante y le bois eft très- blanc j les rameaux s'inclinent vers la terre; les feuilles font d'un beau verd, odorantes, d'un gout amer. Les fleurs font mâles & femelles fur la même branche, à part urne de l'autre ; les mâles font des châtons rougeâtres longs d'un pouce & demi , à éramines & ftériles ; hs femdles font auflï des charons, mais qui n'ont qu'un demi-pouce delong étant verds j ils s'allongent enfui te jufqn'A un pouce. graines font fous leurs écailles j elles font plates brunes ; il fleurit au printemps.

The text on this page is estimated to be only 19.07% accurate

iié INDIGENES. Le Bouleau répand au premier printemps des pleurs , & pat incifion il en fort une liqueur douce bonne à boire. Vertus. Les feuilles , ainfi que 1 ccorce & les jeunes rameaux , font apéritifs, réfolutifs , très -déterfifs -, Us larmes font apéritives, diurétiques , défobftruantes : la dofe eft jufqu à deux livres. Bijîorta, Biftorre, Viv. On fe fert de fa racine. La racine eft épaifTe , affez longue , tortue, dun brun noirâtre en dehors , rouge pâle en dedans , d'un gout un peu acre , ^LeFciges s élèvent d'un pied Se plus ; les feuilles font verd foncé en deflîis , verd de mer par-deflbus. Les fleurs font à étamines ; le calice efl: couleur de chair : il leur fuccede une graine à trois angles, ronfle foncée, luifante, renfermée dans le calice : elle fleurit en été: Elle vient aux lieux humides des montagnes. Nota Qu'il s'en trouve une efpece dont les feuilles font plus granfc& la racine moins tortue , d'ailleurs tout-à-fait reffemblante à la précédente. Vertus et Usages. Elle efl aftringente , alexipharmaque , rafraîchilTante , fudorifique • la dofe en tifanne eft depuis une demi-once jufqu'à une dans trois livres d'eau; en poudre depuis un demi-gros jufqu'à un ; en infufion depuis deux onces jufqu a quatre. ^ Elle entre dans le Vinaigre thériacal, la Poudre dyfenteriqiie, l'Elettuaire Diafcordium. PLANCHE 173Boletus , Morille , Ann. S Es fleurs & fes fruits font Inconnus jufqu'à préfent. Sa couleur eft d'un faune rougeâtre, blanche en dedans; 1* tige eft blanche ; fes racines font des filaments. Elle vient dans les bois au Printemps. Elle ne fert point en Médecine j ainfi M. GéofFroi auroit pa fe difpenfer d'en faire mention. PLANCHE

The text on this page is estimated to be only 16.10% accurate

TOME SECOND. O PLANCHE I74. Bonus-Henricus , Bon-Henri , Viv. N fe ferc de toute la plante» La racine eft épaifle, fibrée , jaunâtre, âcre, amere Les tiges font cannelées, creufes, hautes d*un pied & demi * d'un gout nitreux. * Les fleurs font à éramines jaunes ; il leur fuccede une petite graine faite en rein au fond Cu calice : elle fleurit en été Elle vient aux lieux incultes „ près des mafures Se des haies. Vertus. Elle eft émolliente , Iaxative, adoucifTante Extérieurement elle eft réfoiudve, digeftive, anodine : les iemiies font deterlives. PLANCHE 175. Borrago , Bourache , Ann. ON fe fert de fes feuilles & fleurs. La racine eft grotte du doigt, blanche , fibrée , d'un eout gluant. 6 La tige s'élève d'un pied & demi , velue > creufe ; les feuilles fenc verd foncé , velues , rudes. Les fleurs font monopccales découpées en cinq , d'un beau bleu, quelquefois blanches ou rouges ; il leur fuccede quatre naines noirâtres en forme de têtes de Vipères au fond du calice : elle fieurit en été. Toute la plante eft remplie d'un fuc vifqueux & fade. On la cultive dans les Jardins. Vertus et Usages. La fleur eft une des quatre fleurs cordiales : elle eft digeftive , apénrive, diurétique, pedborale, fudorifique : la dofe du fuc eft depuis deux onces jufqu'à fix. Elle entre dans l'Eledbuaire de Pfyllium corrigé , le Sirop de iornmes compofé , le Sirop de longue vie, Dérjfimum. I

The text on this page is estimated to be only 18.93% accurate

INDIGENES. PLANCHE 176. Botrys ambrojîoidss , Piment, Ann. ON fe fert de route la plante. La racine eft petite , blanche, s'enfonçant droit en terre> peu fibrée. Les tiges & rameaux s'élèvent d'un pied, velues • les feuiHss font m ver fées de veines rougeâtres. Les fleurs font à étamines jaunâtres j îl leur fuccede de trèspetites graines enfermées dans le calice de la fleur : elle fleurît en €té. Toute la Plante eft enduire d'un mucilage réfineux : elle eft d'une odeur forte , aromatique , atfêz agtéable , d'un gout aromatique, un peu acre : elle fleurît en été. Elle vient dans la Provence , aux lieux arides & fablonneux. Vertus. Elle eft béchique , incifive : la dofe en Poudre eft un gros j & en infufion jufqu'à fix onces. Extérieurement elle eft adoucifiante. PLANCHE 177. Botrys Americana } Botrys du Mexique, Ànn. ON fe fert de toute la plante. La racine eft longuette , brune , fibrée , blanche en dedans. La tige s'élève de plus d'un pied cannelée , ayant quelques poils \ les feuilles font verd pâle. Les fleurs font à étamines jaunâtres j les fruits comme ceux de la précédente : elle fleurit en été. Toute la plante a une odeur forte aflez agréable , Se un gout aromatique. Elle vient au Mexique ; on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus. Elle eft ftomachique, carminativé, apéritive , diurétique, kyftérique.

The text on this page is estimated to be only 16.72% accurate

TOME SECOND. PLANCHE I78. Brafflca 5 Chou pommé , B. Ann. IL y a tant de variétés de Choux qui ont tous la même verni ; qu'il feroit inutile ici de les décrire chacun en particulier $ j'ai feulement donné le defTein du Chou pommé blanc & du Chdîi fleur. Le Chou pommé blanc & rouge font les feuls qui foienc «de quelque ufage en Médecine ; la defcription du rouge ell la même que celle du blanc ; il n'y a que la couleur qui en faffela différence. A 1 égard du Chou-fleur, la différence m'a paru affèz confidérable pour en faire le defTein \ ce dont cependant j'aurois fore bien pu me pafTer. La racine du Chou pommé eft fibrée , blanche. La tige s'élève de trois ou quatre pieds ; les fleurs font à quatre pétales en croix, jaunes; il leurfuccede une goutte longue , ronde, remplie de graines arrondies noirâtres. Mais , avant les rieurs , les feuilles d'en bas s'accumulent l'une fur l'autre , & forment une grofle boule verte qui a quelquefois un pied de diamètre. On nomme cette boule pomme de Chou j enfin îa pomme s'ouvre j Se la tige en fort, &c. il fleurit en été. PLANCHE 179. Brajjîca Cauli-fiora 3 Chou-fleur, B. Ann* LEs feuilles d'en bas font longues d'un pied & demi j celles d'au-delfus forment un rond creux qui entoure une grande quantité de tiges nauTantes avec leurs boutons de Heurs , ce qui forme piulieurs pommes blanches. C 'eft ces pommes qu'on coupe alors pour les manger; fi on les laide, elles s'élèvent toutes j les tiges fe féparent ; les fleurs jaunes éclofent, puis lesfiliques & les graines comme aux autres Choux. Vertus et Usages du Chou pommé blanc* et rouge, Le Chou rouge en décoction eft pedtorai , adouciflànc« II

The text on this page is estimated to be only 20.70% accurate

î2+ INDIGENES. Le Chou extérieurement eftdéterfif, vulnéraire. Le Chou entre dans le Mondilicatif d'Ache. PLANCHE l8o. Brundla y Brunelle, Viv. ON fe fert de route la plante, La racine eft menue , fibrée , oblique en terre. Les tiges s'élèvent de huit à neuf pouces , quarrées, velues j les feuilles font verd foncé. Les fleurs font monopétales en gueule, de couleur pourpre; il leur fuccede quatre graines arrondies au fond du calice : dit fleurit en été. Elle vient dans les prés. Vertus et Usages. Elle eft adouciflante , vulnéraire, aftringenre : la dofe du fuc eft jufqua quatre onces, en décoction jufqu a fix onces. Extérieurement elle a les mêmes vertus. Elle entre dans le Baume polycrefte de Bauderon , l'Emplâtre pour les fra&ures , pour les hernies , l'hau vulnéraire. "planche i 8 i . Bryonia y Couleuvrée , Viv. ON fe fert de fa racine. La racine devient grofle comme le bras & plus : elle eft charnue , garnie de grottes fibres , d'une odeur fétide , d'un gout défagréable , acre , un peu amer. Les tiges fonr grimpantes & montent allez haut, au moyen de longs filets qui s'accrochent : elles font cannelées , un peu velues. . Les fleurs font mâles & femelles ; les mâles ou ftenles iont monopérales découpées en cinq , blanc verdâtre , avec des lignes vertes : elles font plus grandes que les femelles : celles-ci iont pofées fur un embrion qui devient une baie grofle d'un pois, fucculenre, rouge, renfermant des graines arrondies : elle fleurie en été.

The text on this page is estimated to be only 16.14% accurate

TOME SECOND. n5 jvW. Qu*i' y en a une efpece dont les baies deviennent noires : on s'en fett rarement. Elle vient dans les haies & dans, les bois. Vertus et Usages. La racine eft un purgatif violent & acre : elle eft antihyftérique & céphalique. La dofe eft en Poudre depuis un fcrupule jufIj'à un gros. Le fuc depuis un gros jufcjua une demi-once. C'ejl avec cette racine qu'on centrerait la Mandragore antique. Elle entre dans le Sirop Cachectique , l'Ougueot Agrippa , d'Arragon. PLANCHE 182. Bryonia nigra racemofa f Racine Vierge , Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft très-grofle , longue, tubéreufe, pleine d'un fuc gluant , noire en dehors, blanche en dedans, d'un gouc acre, afTez agréable. Les tiges font farmenteufes grimpantes , s'élevant très-haut , d'un rouge noirâtre \ les feuilles font verd gai , d\m gout gluant. Celle-ci porte les fleurs mâles ou ftériles monopétales découpées en fix , d'un jaune verd. La femelle qu'on nomme Bryonia nigra baccifera 3 a la fleur plus grande , blanche , portée Air un embrion qui devient une baie rouge grotte comme une Cerife , laquelle contient nombre de graines arrondies : elle fleurit en été. Elle vient comme la précédente dans les bois & haies. Vertus et Usages. Extérieurement elle eft vulnéraire , réfolutive. Elle entre dans la Poudre pour les defeentes des enfants , dans l'Emplâtre Diabotanum.

The text on this page is estimated to be only 20.90% accurate

ïi* INDIGENES. PLANCHE 183. Buglojfum , Buglofe , Vi v, N fe fert de toute la plante, o La racine eft groffe du doigt , oblongue , d'un rouge noi, rârre en dehors , blanche en dedans , remplie d'un fuc gluant. Les tiges s'élèvent de trois pieds & plus , velues j les feuilles font verd de mer , velues. Les rieurs font monopétales en entonnoir , partagées en cinqs d'un bleu pourpre ; il leur fuccede quatre graines rouffes ridées au fond du calice ; elle fleurit en été. Elle vient dans les champs. Vertus et Usages. La fleur eft une des quatre fleurs cordiales ■ la Buglofe a les mêmes vertus que la Bourrache , Pl. 175, Le fuc entre dans le Sirop de longue vie , de Fumeterre , de Pommes compofé, l'Eleétuaire Pfyllium , les Pilules Angéliques. Les fleurs entrent dans le Sirop Elléborifé de Quercéran. La. conferve des fleurs entre dans l'Opiat de Salomon , l'Elecluaire purgatif de Citron. PLANCHE Bugula , Bugle, Viv, ON fe fert de toute la plante. La racine eft menue , fibreufe, blanche, d'un gout ftyp» tique. Les tiges rampent & prennent racine de diftance en diftance; celle du milieu, qui doit porter les fleurs, s'élève de quatre i cinq pouces. Les feuilles font verd foncé , luifantes , dïin gout douceâtre, puis un peu amer , aftringent. Les fleurs font monopétales, labiées, bleues; il leur fuccede quatre graines arrondies au fond d.H calice : elle fleurit au printemps. Elle vient dans les bois.

The text on this page is estimated to be only 19.30% accurate

TOME SECOND. 12? Vertus et Usages. Elle eft vulnéraire , aftringenre. La dofe des feuilles dans les potions vulnéraires , eft une poignée. Celle des fleurs eft depuis une pincée jufqu'à deux, te fuc des feuilles eft depuis quatre onces jufqu'à fix. Extérieurement elle aies mêmes vertus. Elle entre dans l'Eau vulnéraire de Lémery , le Baume polycrefte , le Mondificatif d'Ache. PLANCHE 1 8 f. Burfa Pajloris , Tabouret , Bourfc à Berger , Ann. ON fe fert de toute la plante. La racine eft droite en terre, menue, fibreufe, blanche, d'un gout fade & dégoûtant. La tige s'élève d'un pied, & demi. Les rieurs font à quatre pétales en croix blanches } il leur fuccede un fruit verd plat en cœur , qui renferme de petites graines rouffeâtres : elle fleurit en été. Elle vient en tous lieux. La plante entière a un gout d'herbe un peu falé.» aftrkigent., gluant. Vertus. Elle eft vulnéraire , aftringenre , rafraîchiffante : îa dofe des feuilles en poudre eft un gros. Toute la plante en infufion eft une poignée. Le fuc eft de quatre à fix gros. Extérieurement elle a les mêmes vertus. P L A N C H E l86. Buxus , Buis. ON fe fert des feuilles. C'eft un arbre de taille médiocre... La racine eft longue , tubéreufe , noueufé. Le tronc devient gros comme la jambe; l'écorce eft raboteuie , blanchâtre ; le bois jaune & dur. Les feuilles font toujours vertes i luifantes \ leur odeur eft défagréable ; leur gout amer. I4

The text on this page is estimated to be only 11.60% accurate

?*f INDIGENES. Les fleurs naifTent à part des fruits fur le même arbre font ftenles à éramines jaunâtres ; les fruits devienne^ ?" comme un Pois, partagés en dedans en trois loges, dontS? aine contient deux graines, couleur de Châtaigne. // fieurkl' printemps. ° J^uru au On le cultive dans les bofquets. N°'*- Sf il7u,ane a".fe efpCCede Buis tol»-à-fait «ftmblantà céni Si2ï? ^ S ^ 3 CnVlr°B Pi£d & dcmi > 11 f£rt dc bo^reTaS Vertus. Les feuilles partent pour purgatives; on a fubftitué la dccoc O PLANCHE 187. Calamimha Vulg. Calament, Viv, N fe fert de toute la plante. if uLe$ tig£S s'éI,event d'un demi-pied &p!us, quarrées: les feuilles ont une odeur agréable , un gout âcre. Les fleurs font monopétales en gueule , purpurines , d'une odeur agréable; il leur fuccede quatre graines noirâtres lûtes au rond du calice. Elle vient dans les bois : elle fleurit en été. PLANCHE 188. Calamimha Pulegii odore 3 Calament à odeur de Pouliot , Viv. L refiemble au précédent ; mais les feuilles & fleurs font plus . pentes. r Elle a l'odeur & le gout du Pouliot, Pl. 3 Si. Elle vient en Languedoc : elle fleurit en été. c

The text on this page is estimated to be only 19.87% accurate

TOME SECOND. PLANCHE 189. Calamintha montana, Calament de Montagne, Viv. S Es feuilles & fleurs font plus grandes , & d'une odeur plus agréable que les précédentes. 11 vient fur les Alpes & les Pyrénées : U fleurit en été. PLANCHE I90. Calamintha aruenjîs , PouliotThim, Viv. C'Eft une efpece de Menthe , ce qu'on reconnoît à fes fleuri qui font femblables à celles des Menthes (Pl. $76 Ôc Vivantes) ; d'ailleurs elle reflemble au Calament ordinaire ci-deffus par la figure & l'odeur de fes feuilles ; elle vient aux lieu* incultes : elle fleurit en été. Vertus et Usages des quatre Calaments. Tous les Calaments d-defTus ont les mêmes vertus. Ils font incififs , ftomachiques , carminatifs, hyftériques, diurétiques, vulnéraires , déterfifs : on les prend en infufion comme le Thé. Extérieurement elles font répercutantes, atténuantes, réfolutives. Elles entrent dans la Décoction Céphalique , le Looc de Santé, le Sirop d'Armoife de Stxchas , de Marrhube , la Thériaque. PLANCHE 191. Calcitrapa , Chaufletrape , B. Ann. ON fe fert des racines , feuilles & graines. La racine eft grofle du doigt , blanche , longue , fucenlente. Les tiges s'élèvent de deux pieds anguleufes \ les feuilles font velues. Les fleurs fortent d'une tête épineufe : elles font à fleurons pourpres; il leur fuccede une graine aigretée, oblongue, luifante : die fleurit en été.

The text on this page is estimated to be only 18.89% accurate

*S° , INDIGENES. Elle vient dans les champs , le long des chemins» Vertus et Usages, Elle eft diurétique , fébrifuge, vulnéraire: la dofe du-fUC(je feuilles eft de quatre à fix onces. La décoction des graines pilées eft diurétique à la dofe d'un gros. Extérieurement le fuc eft confondant. Elle entre dans la Poudre de M. de Lamoignon de Baftiille contre la Néphrétique. 1 jpnretiqi PLANCHE I92. Calcndula , Souci , Ann,,. ON fe fert des feuilles & fleurs. La racine fe fépare en plufieurs greffes fibres oblongues. Les tiges s'élèvent d'un pied, velues j les feuilles font venUÎ velues , d'une odeur forte d'un gout d'herbe. Les fleurs font radiées , entièrement jaunes ; il leur fuccecîe des capfules courbes remplies d'une graine oblongue ; elle fleurit en été. On la cultive dans les Parterres. Nota. Qu'il y en a une autre efpece fauvage qu'on trouve communément dans les vignes , qui eft totalement pareille , mais beaucoup plus petite en toutes fes parties : elle fe nomme Calendula Sylvejlris. Vertus et Usages des deux Soucis. Elles ont toutes les deux les mêmes vertus. Elles font apéritives , réfolutives, hyftériques, alexipharmaques: la dofe du fuc de toute la plante eft depuis une once jufqu'à quatre. L'infufion des fleurs & feuilles depuis trois onces jufqu'à fix. Extérieurement les feuilles piiées font vulnéraires , réfolutives. «

The text on this page is estimated to be only 20.80% accurate

TOME SECOND. PLANCHE 193. Camphorata 3 Camphrée , Yiv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft longue , grofTe du pouce , ligneufe. Les tiges font ligneufes , longues d'un pied & demi , un peu velues, blanchâtres; les feuilles font velues, d'une odeur de Camphre, d'un gout un peu acre, amer. Les fleurs font à étamines , couleur de rofe ; il leur fuccede une petite graine noire au fond du calice: elle fleurit en été. Elle vient en Provence & en Languedoc, Vertus. Elle eft apéritîve , diurétique, hyftérique, fudorifique ; ladofeen décoction eft une once dans deux livres d'eau. PLANCHE 194. Cannabis , Chanvre , Ann. ON fe fert des feuilles & des fruits. La racine eft ligneufe , fibreufe , blanche. La tige eft quarrée, creufe : elle s'élève de cinq à fix pieds, velue, rude; les feuilles font verd foncé , d'une odeur torte aflez xléfagréable. Les fleurs ftériles font à" étamines jaunâtres j le calice eft purpurin en dehors , blanchâtre en dedans ; elles viennent fur un pied de Chanvre, Les fruits viennent fur un autre ; ce font des graines arrondies , liftes , couvertes d'une écorce gris brun , fous laquelle eft une amande blanche d'une odeur forte, enfermée dans une capfule terminée en pointe : elle fleurit en été. On cultive cette plante en beaucoup de Pays , parce qu'on fait , avec fes tiges , du fil & de la corde. V e r t u s. Les feuilles & fruits nommes Chenevi j font extérieurement

The text on this page is estimated to be only 19.72% accurate

iji INDIGENES. PLANCHE 19 Capparis f Câprier. ON fe fert de l'écorce de la racine & des boutons de les fleurs. C'eft un arbriifeau. Les racines font nonibreufes , revêtues d'une écorce épailTe acre , amere. Les branches ont vers trois pieds de long, épineufes j les feuilles font ameres. Les fleurs font à quatre pétales blancs ■ il leur fuccede un fruit gros comme une Olive qui renferme de petites graines en forme de rein : il fleurit en été. Toutes les parties de cet arbrifleau ont un gout un peu amer, aftringent. Vertus et Usages. L'écorce de la racine eft diurétique , apéritive, hyftérique, réfolutive : la dofe en poudre eft un gros \ en infufion ou en décoction , jufqu'à une once dans une livre d'eau. Les boutons à fleur nommés Câpres , Se l'écorce entrent dans l'Huile de Câpres de Mefvé ; l'écorce dans les Trochifques da Câpres , le Sirop Hydragogue , l'Huile de Scorpion compofée. PLANCHE 19^. Caprifolium , Chèvrefeuille, Yiv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft rampante , Hgnetife , fibreufe. Les tiges font rampantes & grimpent aux arbres; les feuilles font verd gai , duvettes en delfous. Les fleurs font monopétales en tuyau, blanc jaunâtre, d'une odeur très agréable ; il leur fuccede un fruit ou baie molle rouge remplie de graines un peu dures : elle fleurit en été. Elle vient dans les bois. Vertus. Elle eft diurétique. - Le fuc des feuilles eft vulnéraire , déterfif.

The text on this page is estimated to be only 17.75% accurate

TOME SECOND. PLANCHE 197. Cardiaca p Agri paume , B. Ann. ON fe fert de toute la plante. La racine eft une tête d'où partent plufieurs fibres. Les tiges s'élèvent de deux à trois pieds quarrées , d'un rouge foncé ou noir. Les fleurs font monopétales en gueule , purpurines , couvertes d'an duvet blanc j il leur fuccede quatre petites graines , couleur de Châtaigne , au fond du calice : die fieurit en été. Toute la plante a une odeur force & un gout un peu amer. Elle vient aux lieux inculces. Vertus. Elle eft ftomaehale d'ailleurs elle a peu de vertus. PLANCHE I98. Carduus benediclus , Chardon bénit > Ann. ON fe fert de fes feuilles , femences Se fommités avant la fleur. La" racine eftbranchue, fibrée , blanche, peu amere. La tige s'élève d'un pied & demi j les feuilles font velues, fort atneres. Les fleurs font a fleurons jaunes , fortant d'une tête épineufe 5 il leur fuccede une graine longue jaunâtre, cannelée, aigretée : elle fieurit en été. Toute la plante , excepté la racine , eft fort amere. On la cultive dans les jardins de Botanique. Vertus et Usages. Elle eft diaphorétique, fudorifique , alexitaire, antipleurétique, fébrifuge : la dofe en poudre eft un gros; en décoction jufqu'à fix onces. La graine eft antiplétirétique. Les feuilles entrent dans le Vinaigre Thériacal, l'Huile de Scorpion , l'Onguent Martiatum. Les graines dans l'Opiat de Salomon a dans la Décoction amere de la Pharm. de Londres.

The text on this page is estimated to be only 18.99% accurate

INDIGENES; PLANCHE 199Carduus attraclilis, Chardon bénit des Pariiiens, Ann< ON fe fert de toute la Plante. La racine s'enfonce droit en terre , fibreufe , blancîie; La tige s'élève d'un pied & demi : elle eft. verd clair , ainiî que les feuilles qui font épineufes. Les rieurs font à fleurons jaunes , fortant d'une tête épineufeil leur fuccede une graine anguleufe , d'un blanc jaunâtre, zml tées : elle fleurit en été. Elle vient dans les champs parmi les bleds4 Vertus. On la fubftitue à la précédente , comme ayant les mcmej vertus. PLANCHE 200, Carduus Maria , Chardon-Marie, B. Ann. ON fe fert de fa graine , quelquefois des racines & feuilles. La racine eft longue , fucculente. La principale tige eft grofle du doigt : elle s eleve de trois pieds & demi & plus , garnie d'un duvet blanc -y les feuilles font verd gai , épineufes , parfemées de taches blanc de lait. Les fleurs font à fleurons pourpres , fortant d'un calice épineux; il leur fuccede une graine hlfe, aigretée,, d'un goutdous; elle fleurit en été. Elle vient dans les champs , vers les chemins. Vertus. Elle eft apéritive, fudorifique, diurétique : la dofe en poudre ou en émulfion eft un ou deux gros. Le fuc de la plante eft fébrifuge à la dofe de quatre onces. La déco6lion des feuilles & racines eft apéritive,.

The text on this page is estimated to be only 19.05% accurate

TOME SECOND. PLANCHE 201. Caryophyllata 3 Benoîte, Viv. ON fe ferc de fes racines & feuilles. La racine eft fibrée , roufieâtre , d'une odeur de Clou de Girofle plus ou moins force , d'un gouc aromatique , acre. Les riges s'élèvent d'un pied & demi , velues ; les feuilles font verd foncé , duvetées. Les fleurs font à cinq pétales jaunes -, il leur fuccede une tête arrondie formée de quancité de graines terminées par un crochet pointu : elle fleurit en été. Elle vient dans les bois. V e r. x u s. La racine fraîche eft céphalique : la dofe en déco&ion eft un» once. La plante entière , une poignée dans une livre Se demie d'eau, eft fébrifuge, fudoriflque. La racine feche en poudre à la dofe d'un gros , eft ftomachale, vulnéraire , aftringence , ainfi que le fuc des feuilles à la dofe de trois onces. PLANCHE 202. Carvi , Ann. ON fe fert de fa graine. La racine eft grofte du pouce, longue, fibrée, d'un gouc acre , aromacique. La tige s'élève jufqu'à deux pieds , cannelée , lifTe j les feuilles fout verd foncé , lilles.. Les rieurs font en parafol , blanches , odorantes y il leur fuccede deux graines accollées noirâtres , cannelées , d'un gouc acre, aromatique : elle fleurit au printemps. Elle vient fur les Alpes, les Pyrénées, dans les Prés. Vertus et Usages. La graine eft une des quatre femences chaudes ; elle eft incifîve,

The text on this page is estimated to be only 17.87% accurate

If*. . INDIGENES, çarmïnative , diurétique , hyftérique : la dofe en poudre eft de puis un fcrupule jufqu a un gros ; en infufion un gros. Elle entre dans l'Eledbuaire de baies de Laurier , Micléta U Bénédicte laxative , l'Eau de iix graines. PLANCHE 203. Caryophyllus tunica , (Eillet, Viv. ON fe fert de fes fleurs. La racine eft fimple , fibreufe. Les tiges ont un pied & demi de haut -, les feuilles font verd de mer. Les rieurs font à cinq pétales , d'un ronge foncé (on préfera celles-ci comme plus efficaces) , d'une odeur de Clou de Girofle; il leur fuccede un fruit rond 8c long rempli de petites graines plates , noires : elle fleurit en été. On cultive cette efpece d'CEillet dans les champs. Vertus. Elle eft céphalique , alexipharmaque , cordiale : la dofe du Sirop eft une ou deux onces. PLANCHE 204. Caflanea, Châtaignier. ON fe fert de fes fruits. C'eft un grand de gros arbre j l'écorce en eft noirâtre ou grife. Les fleurs mâles ou ftériles font de longs chatons à éramines jaunâtres. Les fruits viennent à la bafe des chatons , ronds , hériffés de quantité d'épines , velus en dedans , renfermant deux ou trois Châtaignes couvertes d'une écorce unie, luifante, brune, qui contient une amande affez dure, douce & agréable au gouc:;/ fleurit en été. 11 vient dans les bois fecs & dans les plaines fablonneufes. Vertus. Les fruits nommés Châtaignes font béchiques , adqucifTants. PLANCHE

The text on this page is estimated to be only 18.66% accurate

o ÏOME SECOND. t}? PLANCHE 20 J, Cemaunuin ma] us , grande Centaurée, Viv. N fe ferr de fa racine. La racine eft longue de crois pieds, grbfle, folide, noU râtre en dehors , rougeârre, marbrée de jaune en dedans , amere un peu aftringente. La rige s'élève de cinq pieds -, les feuilles font liffes, verd aai« Les rieurs forcent d'un calice écatlleux : elles font à fleurons purpurins j il leur fuccede une graine oblongue , lifte, aigretéei elle fleurie en été. Elle vient fut les Alpes : on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. Elle eft incifive , hépatique, aftringente : la dofe en poudre effc un gros ; en décoéfcion une once. Elle entre dans la Poudre du Comte de la Mïrandole. PLANCHE 206. Centaurium minus . petite Centaurée, B. Ann. ON fe ferr de fes fommités fleuries. _ La racine eft blanche, fibrce , ligneufe , fans aucun goût*' La rige eft haute d'un pied ; les feuilles font vérd gai, liftes , fort ameres. Les fleurs font monopétales en entonnoir , découpées en cinq , rouges , rrès-afneres : il leur fuccede un fruit oblong, à deux loges, qui contiennent des graines très-menues : elle fleurit en été. Elle vient dans les bois & aurres lieux incultes. Vertus et Usages. Elle eft incifive, défobftruante , fébrifuge , hyftérique : la dofe delà poudre feche eft depuis un gros jufqu'à une demi-once. Extérieurement elle eft vulnéraire, déteriive: c'eft une des Vulnéraires Suijfes. _ Elle entre dans la Poudre de Palmarius contre la rage, la Thé"aque , le Vinaigre Thériacal , le Sirop d'Armoife , la Poudre

The text on this page is estimated to be only 20.24% accurate

,38 INDIGENES. du Comte de la Mirandole , la Décoétion amere de la Pharm. fa Londres, PLANCHE 207. Cepa vulgaris , Oignon , B. Ann. ON fe fert de fa bulbe, La racine eft compofée de quelques petites fibres blanches qui donnent nourriture à une bulbe compofée de plufieurs enveloppes charnues & membraneufes , l'extérieure blanche ou rou^e , remplies d'un fuc âcre & fubtil. La tige s'élève de quatre pieds & plus : elle fe renfle vers le bas -, les" feuilles font rondes , creufes , d'un gout âcre. Les rieurs font à fix pétales blancs \ il leur fuccede un fruit rond partagé en trois loges , rempli de graines noires : elle fleurit en été. On la cultive dans les Potagers. Vertus. L'Oignon eft ftomachique , diurétique , hyftétique. Extérieurement il eft émotlient , adouciflant. PLANCHE 2,08. Cepa afcalonica , Echalote, Viv. ON fe fert de fa bulbe. Plufieurs bulbes aflemblées font portées fur un paquet de fibres blanches. Les feuilles qui partent de ces bulbes , font rondes, creufes, de fe féparent en deux ou davantage dans leur hauteur ; il s'eleve d'entr'elles des tiges d'un pied de haut portant fleurs & fruits comme l'Oignon ci-deffus : elle fleurit en été. On la cultive dans les Potagers. , Tonte la Plante a le gout de l'Oignon, mais plus agteable; fes vertus font les mêmes du précédent.

The text on this page is estimated to be only 15.81% accurate

TOME SECOND; m o PLANCHE 20C^ Cepa fijjilis , Ciboule, N fe fer: de fa bulbe. Elle reffemble à l'Oignon , excepté que fes bulbes fonl allongées , le leparent, & font comme une touffe de petits Oh gnons joints par une racine ou amas de fibres : elle eft plus hauta que l'Echalote , & plus petite que l'Oignon : elle fleurit en été. On la cultive dans les Potagers. Ses vertus font égales aux deux précédentes. PLANCHE 2,10. Cerafus } Cerifier. IL y a beaucoup de variétés de Gerifes ; mais comme les QM rifiers font tous du même genre, fins beaucoup de différences dans les parties dé l'arbre, j'ai feulement defïiné le Cerifier ordinaire. Oii fe fett de fes fruits & amandes. C'eft un arbre médiocrement haut & peu droit ; 1 eeorce elt rouge noirâtre , le bois blanchâtre , noirâtre au cœur. Les fleurs font à cinq pétales blancs ; il leur fuccede un fruii tlmnù rouge, fucculent , d'un gout agréable ; ayant dans fort rnilieu un noyau dur qui enferme une amande amere : il rleurÏÈ au commencement du printemps , avant fes feuilles. On le cultive dans les Jardins fruitiers & en pleine campagne* Vertus. Les Cerifes font rafraîchiffantes , laxatives j les amandes font diurétiques. PLANCHE 211. Cerafus fylvejlris , MeriJîen ON fe fert de fes fruits. 1 C'eft un grand arbre dont le tronc eft droit ; lecorce eft«une ou cendrée en dehors 3 Mç} verdâcre en dedans; le bois J s

The text on this page is estimated to be only 19.30% accurate

,i4o î N D 1 -G E N E S. eft ferme , roufleâtre ; les feuilles font Enfantes, un peu ameres. Les fleurs reflèmblent à celtes du précédent j il leur fucceàe des fruits bien plus pecics que la Ceriie ordinaire ci-defTus , peu charnus, d'une douce amertume agréable,, pleins d'un fuc noir; il fleurit au printemps en même-temps que les feuilles. Il vient dans les bois. Vertus et Usages. Les Merifes font céphaliques , apéritives. Elles entrent dans l'Eau pour la paralylie 6c apoplexie de Charas. PLANCHE 2,12. Cœterac, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft formée de fibres capillaires noirâtres. Les feuilles font longues de trois pouces , liifes , vertes endeffusj le deflous eft garni de petites écailles remplies de capdiles rondes qui , en s'ouvrant , laitfent échapper une fine poufllere dorée qui eft la graine. Elle n'a point de fleurs apparentes. Les feuilles ont un gout d'herbe un peu aftringent. Vertus et Usages. Elle eft adouciflante , pectorale , apéritive ; on la mêle fouvent parmi les Capillaires , Pl. 125 & fuivantes. Elle entre dans le Sirop de Capillaire de Renaudor. PLANCHE 2,13. Chcerophyllum , Cerfeuil, Ann. ON fe fert de toute la plante. La racine eft blanche , fibrée , un peu acre. La tige s'élève de deux pieds Se plus , cannelée , creufe ; les feuilles font un peu velues , d'une odeut & d'un gout aromatique agréable. Les fleurs font en parafol , blanches j il leur fuccede deux

The text on this page is estimated to be only 17.94% accurate

TOME SECOND. i4r petites giîaines oblongues , accollées , liilès > noirâtres : elle fleurit au printemps. On la cultive dans les potagers. Vertus. Elle eft incifive , apéritive , diurétique , hyfterique, extérieurement rafraîchiftante. La dofe du fuc eft de trois ou quatre onces ; la décoction de cinq ou fix onces. PLANCHE 214. Chamœdris y Gcrmandrée, Viv. ON fe ferc des feuilles & fleurs. Les racines lont traçantes , fibreufes. Les tiges s'élèvent de neuf pouces , quarrées , velues ; les feuilles font verd gai , ameres. Les fleurs font monopétales en gueule, purpurines; il leur fuccède quatre graines au fond du calice : elle fleurit au printemps. Elle vient aux lieux fecs , dans les bois. Vertus et Usages. Elle eft incifive , fébrifuge , apéritive , hyftérique , fudotinque : la dofe en infufîon eft une pincée ou deux , & en poudre jufqu'à un gros. Elle entre dans la Thériaque , l'Hyere de Coloquinte , le Sirop d'Armoife , deGermandrée , Hydragogue , Apéritif, Cachectique > la Poudre du Comte de la Mirandole , l'Huile de Scorpion compofé , l'Onguent Martiatum , le Mortdificatif d'Ache. PLANCHE 2.1 y» Chamœmelum Romanum , Camomille Romaine, Yiv. ON fe fert de fes feuilles & fommités fleuries. Les racines font menues, fibreufes. Les tiges s'élèvent jufqu'à fix pouces & plus. Les fleurs font radiées; le difque jaune, la couronne blanche; il leur fuccede des graines menues > oblongues } fans aigrettes : elle fleurit en été. J i

The text on this page is estimated to be only 16.37% accurate

x+i INDIGENES, Les feuilles & fleurs ont une odeur aromatique très-agréable, Elle vient dans l'herbe , aux endroits incultes. La Camomille ordinaire, Cham&mdum vulgare reffemble prefqueen tour à la précédente, excepté que les feuilles font pllt3 allongées , & leurs découpures moins prelfées , que la Plante a très-peu d'odeur s ÔC qu'elle vient dans les bleds & autres grains. Vertus et Usages. L'une Se l'autre de ces Camomilles font digeftives , laxatives cmollientes , carminatives , céphaliques , adouciffantes : la dofe des fleur* en poudre eft depuis un demi gros jufqua. un grosj rinfufiqn ou décoction jufqua fix onces dans l'eau ou le vin • le fuc jufqu'à z, j 8i 4 onces. La Romaine eft plus atténuante , échauffante. L'ordinaire eft plus émolliente & adouci (Tante. Extérieurement elles font résolutives adouciifantes. Elles entrent dans l'Onguent Martiatum , l'Emplâtre de Mélilot, pour la Motrice, de Grenouilles. PLANCHE 2.l6. Chamœmelum fietidum , Marmite, Ann. ON fe fert de toute la plante. Elle s'élève jufqu'à un pied & demi : elle reffemble ara précédentes pour les fleurs & fruits j mais le port en eft bien différent. Voyez l'Eftanipe. Elle fent très-mauvais, cjuoiqu'avec une odeur aromatique; elle fleurit en été. Elle vient dans les bleds & autres grains. Sun odeur la rend falutaire peur laPafhon, hyftérique en fomentation 6c en fumigation. O PLANCHE 2,17. Chamcepithis s Yvette , Ann, ON fe fert de toute la plante. La racine eft menue , fibrée , blanche. Les tiges fe panebent vers rerre : elles font longues de neuf pouces j les feuilles font verd jaune , velues.

The text on this page is estimated to be only 20.97% accurate

TOME SECOND. i4î Les fleurs font monopétales , labiées , jaunes ; il leur fuccede quatre graines triangulaires au fond du calice : elle fleurit en été. Elle vient dans les bleds & autres grains. Toute la plante a l'odeur de la réfine du Pin, Pl. 65. Vertus et Usages. Elle eft apéritive, céphalique , hyftérique : la dofe en poudre eft un gros. • Extérieurement; elle efl; vulnéraire , déterfive. Elle entre dans la Thériaque , le Sirop du Comte de la Milandole , les Pilules d'Yvette, l'Onguent Marriatum. PLANCHE 2l8. Chamœpitkis mofchata, Yvette mufquée, Viv. ON fe fett de toute la plante. Elle relfemble allez à la précédente pour le porr de la plante & la hauteur ; mais fes feuilles ne font pas découpées ; les fleurs font rayées de lignes rouges ; les graines font noires , ridées , longuettes. Toute la plante eft velue, d'un gout amer, d'une odeur d« réfine mufquée. Elle vient en Languedoc , en Provence : elle fleurit en été. Elle a les mêmes vertus que la précédente. PLANCHE ^I?. Ckelidonium ma jus , grande Eclaire, Viv. ON fe ferr de fes feuilles & racines. La racine eft une tête de laquelle partent des fibres garnies de chevelu ; fa couleur eft rouge vermillon ; elle eft remplie d'un fuc jaune foncé, acre, brûlant. La tige s'élève d'un pied & demi , creufe ; les feuilles font d un beau verd en deffus , verd de mer en deiîous , avec quelques poils. Les fleurs font à quatre pétales jaunes ; il leur fuccede une fiîïque longue d'un pouce & demi , roufleâtre , contenant des graines noires luifantes: elle fleurit m été. J4

The text on this page is estimated to be only 17.47% accurate

ï44 INDIGENES. Toute la plante a une odeur forte , & eft remplie d'un fac jaune fafrr.né , acre , piquant , un peu amer. Elle vient à l'ombre & aux lieux humides. Vertus et Usages. On ne l'emploie point à l'intérieur. Extérieurement elle eft vulnéraire , déterfîve , ophtalmique Elle entre dans l'Orviétan , le Mondific.itif d'Ache , l'Emplâtre Diabotanum, Veau dijiïlUe entre dans l'Eau Ophtalmique (Je M. Daquin. PLANCHE 220. Chelidonium minus, petite Eclaire, Viv. ON fe fert de toute la plante , fur-tout des tubercules de la racine. La racine eft compofée de plufieurs petites fibres auxquelles font attachées plufieurs petites bolfes ou tubercules allongés , de la groffeur d'un grain de bled , pâles en dehors , blancs en dedans. Les tiges fe répandent fur rerre : elles ont fix ou fept pouces de long ; les feuilles font hùfantes. Les fleurs font à huit ou neuf pétales jaune doré ; il leur {accède un fruit arrondi couvert de petites graines ; elle fleurit au premier printemps. Elle vient aux lieux humides & herbus, Vertus. Elle eft antifcorbutique tempérée : on emploie les feuilles fraîches en infufion. Extérieurement elle eft vulnéraire, déterfîve, adouciffante. PLANCHE 22 T. Cicer Pois chiche, Ann. ON fe fert des fruits ; on préfère les rouges. La racine eft menue , fibreufe , d'un blanc rouffeâtre. Les tiges font velues ainiî que les feuilles. Les fleurs font légumineufes , ronges ou blanches 3 il leur fuc

The text on this page is estimated to be only 19.32% accurate

TOME SECOND. r45 cède une eapfule ronde terminée en pointe, qui contient une ou deux graines plus grofles que le pois ordinaire, rougeâtres ou blanches : elle fleurit en été. On la cultive dans les champs , aux Pays chauds de la France, en Efpagne Se en Italie. Vertus et Usages. La décoction des fruits eft diurétique. Extérieurement elle eft atténuante , réfolutive , déter/îve foiolliente. Elle entre dans le Sirop de Guimauve de Fernel. PLANCHE 2,22. Chicorium fylveflre, Chicorée fauvage , Viv. ON fe fert de toute la plante , excepté des tiges. La racine eft longue d'un pied , épaifle d'un pouce , oblique en terre , fibreufe , pleine d'un fuc laiteux , d'un gout amer. La tige s'élève de deux pieds & demi , velue ; les feuilles font verd foncé , velues. Les fleurs font à demi-fleurons , bleues-, il leur fuccede une gaîne remplie de petites graines fans aigrette : elle fleurit en été. La tige & les feuilles font pleines d'un fuc laiteux amer. Elle vient aux lieux incultes. On la cultive dans les Potagers. Vertus et Usages, C'eft une des quatre petites femences froides : elle eft incifive, apéritive , déterfive, ftomachale, fébrifuge, tempérante. Ladofe des feuilles en poudre eft un gros : la décoction fix onces; le fuc trois ou quatre onces. Elle entre dans le Sirop de Chicorée limple, compofé avec la Rhubarbe. PLANCHE 2.23. Cicuta major 3 grande Ciguë, B. Ann. ON fe fert des feuilles &c racines. La racine a un pied de long : elle eft grofle du doigt , branchue ; les branches font pleines avant que la tige poulie ;

The text on this page is estimated to be only 17.98% accurate

i4* INDIGENES. mais elles deviennent creufes à mefure qu'elle s'élève; PéCOr de la racine eft jaunâtre en dehors , blanche en dedans. La tige s'élève de quatre à cinq pieds verd gai. , tachée de quan. tité de points rougeâtres , comme une peau de ferpent ; les feml les font liffes, verd noirâtre , d'une odeur défagt éable de Perfil Les fleurs font en parafol, blanches; il leur fuccede deux grai! nés accollées petites, cannelées d'un verd pâle : elle fleurit en été Toute la plante rend une odeur forte très-défagréable. Elle vient à l'ombre, aux lieux incultes. Vertus et Usages, Quoique la Ciguë", prife intérieurement, foit réputée poifon cependant depuis peu quelques Médecins en ont employé l'extrait en petite dofe pour les cancers , avec réuffire. Extérieurement elle eft réfolutive , adouciflante , émollisnte, Elle entre dans l'Emplâtre Diaboranum de Blondel. PLANCHE 2.24. Cicuta minor , petite Ciguë, Ann. ELle reflèmble en tout à la précédente ; mais elle ne devient jamais fi grande. Ses feuilles reflemblent davantage aux feuilles de Perfil. Ses vertus font bien plus foibles. PLANCHE 22, ^ Cinara , Artichaut, Viv. ON fe fert de fes racines. La racine eft épaifle , ferme. La tige s'élève à un ou deux pieds, cannelée, coronneufe; les feuilles font duvetées , fur- tout en deflous. Les fleurs font à fleurons , d'une couleur pourpre bleuâtre» forçant d'une tête écaîllëttfè , dont la couleur eft verd de mer ; il leur fuccede une graine oblongue un peu renflée, coionr.eufe, garnie d'aigrettes blanchâtres : elle fleurit en été. On la cultive dans les Potagers.

The text on this page is estimated to be only 18.65% accurate

TOME SECOND. j47 Vertus. La racine eft très-diurétique en décoction. L PLANCHE 2,26. Cinara Cardones , Cardons d'Efpagne, Viv. A plante reffemble à la précédente : elle en diffère feulement en ce qu'elle vient plus hante, & que fes feuilles Se fes rères font tres-épineufes : elle fleurît en été, On la cultive dans les Potagers, Elle a les mêmes vertus. PLANCHE 2-2-7, Citreum , Citronnier - Cédra. ON fe fert de routes les parties de fon fruit. C'ell un arbre médiocrement haut. La racine s'étend en plufieurs branches couvertes par une écorce jaune en dehors , blanche en dedans. Le bois eft dur , blanc; fon écorce eft verd pile-, les feuilles fout plus vertes défais que deifous, & ne tombent point pendant l'hiver; plusieurs ont une épine à leur bafe : elles ont une bonne odeur, & font ameres au garni ; elles paroiffent parfemées de points ttanfparents qu'on découvre au travers du jour. Les rieurs font à cinq pétales blancs parfemés de rouge par dehors 3 d'une odeur foible , d'un gout douceâtre, puis amer: il s'en trouve fans piftils : celles-là 'four mâles ou ftériles. Les fruits qui fuccedent aux fleurs fertiles ou femelles , ont une écorce raboteufe & par boffes, d'un jaune d'or, odorante , aromatique; ils font de figure ronde irréguliere ; leur longueur va depuis lîx à neuf pouces jufqu'à beaucoup plus ; car il s'en trouve qui pétrit jufqu'à trente livres : ce fruit eft charnu, partagé en plusieurs loges remplies d'un fuc acide & de quantité de graines d'un demi pouce de long , pointues aux deux bouts , couvertes d'une peau jaune , dans laquelle eft une amande blanche douce-amere * H fleurit en éçé.

The text on this page is estimated to be only 20.59% accurate

i4? INDIGENES, Vertus et Usages. Le fruit nommé Cédra eft antifcorbutique , rafraîehilTafit cordial, alexipharmaque, L'écorce extérieure du Cédra ou Citron eft ftomachique, vermifuge , carminative , alexitaîre. L'écorce entre dans l'Opiat de Salomon , l'Electuaire de Ci. tron purgatif, les Tablettes purgatives , contre les vers , la pou. dre de Joie , Digeftive. Les graines entrent dans le Diamargaritum froid , les Tablettes contre les vers , la Poudre Pannouj. que, la Confection d'Hyacinthe, l'Opiat de Salomon. Limon f Lirnonnier. On fe fert du fruit. C'en: un arbre médiocre qui reflemble beaucoup au Citron? nier ou Cédra ci-deffus. Les feuilles font plus courtes ; les épines moins longues; les fruits beaucoup plus petits, faits en forme d'œuf , moins jaunes , moins odorants ; ils ont à proportion plus de fuc , & plus acide : il fleurit en été. On cultive celui-ci & le précédent dans nos Pays chauds. Vertus. Le Limon eft plus rafraîchiflant que le Cédra ou Citron; du refte il a les mêmes vertus. PLANCHE 2.-8. Cïtrullus y Citrouille, Ann. ON fe fert de fa graine. Les racines font menues , droites en terre, fîbiées. Les tiges font farmenteufes , rampantes , s'érendant au loin, velues, garnies de vrilles, avec lefqnelles elles s'attachent auï corps qu'elles rencontrent. Les rieurs font monopétales en cloche, découpées en cinq; les unes font ftériles ou mâles: celles qui font fertiles s'élèvent fui un embrion qui devient un fruit rond & oblong très-gros , dont l'écorce eft épaifle , verd foncé , lilfe , contenant une chair, ou jaune, ou blanchâtre , ou rougeâtre, d'un go ut agréable., dans

The text on this page is estimated to be only 16.41% accurate

TOME SECOND. i4? i centte de laquelle font des graines larges oblongues , ridées , 'umâcres , qui enferment une amande blanche agréable au gout : die fleurit en été. On la cultive dans les Potagers. Vertus et Usages. La graine eft une des quatre grandes femences froides : elle eft «fraîchifiànte , adoucilîante. • Elle entre dans la Poudre de Haly , de Perle rafraichiflante, l'Electuaire de Prunes , de Pfyllium , de Suc de Violette. PLANCHE 2.2.9. Cockkaria , Herbe aux cuillieres , Ann. ON fefect de toute la plante. , La racine eft un peu épaifTe , droite, blanche, hbree. Les ti^es s'élèvent d'un pied & plus ; les feuilles font verd foncé, lune odeur peu agréable, d'un gout acre, amer, piqTes fleurs font à quatre pétales blancs en croix; il leur fuccede un fruit rond à deux loges qui enferment de petites graines touffes : elle fleurit en été. Elle vient fur les Côtes de Flandres, furies Pyrénées. Vertus. Elle eft antifeorbutique par excellence , incifive employée verte. Extérieurement elle a les mêmes vertus. PLANCHE Colchicum , Colchique , Yiv. N fe fert de la racine. La racine eft compofée de quelques fibres qui donnent nourriture à une bulbe arrondie , noirâtre à fa fuperhcie , blanche en dedans, charnue, d'un gout doux fuivi d'une légère amerLes fleurs reûemblent à celles du faftan, PL 4^5 ^ CÛU"euI eft purpurine i elles paroiflèni en automne, toutes ieules. 0

The text on this page is estimated to be only 17.43% accurate

«S» . INDIGENES. Les feuilles ne forcent qu'an commencement du printemps L l'année fuivance : les fruits viennent en même- temps • île k oblongs partages en trois loges remplies de graines, roux-noirâtrequand les graines font mûres les feuilles fe fanent Se péril* fent : elle vient dans les prés. Vertus. L'oignon ou bulbe , pris intérieurement , eft un poifon; Extérieurement pendue au col en forme d'amulette , on dit qu'elle réfifte au venin de toute maladie épidémique, mêmeàlaj pefte 5 autant qu'une amulette en eft capable. PLANCHE 23 I* Consolida major 3 grande Confoude , Viv. ON fe fert de fa racine , feuilles &c fleurs. La racine eft épailfe, fibrée, charnue , gluante, noirë en dehors , blanche en dedans ; les tiges s'élèvent à un pied & demi de haut , creufes , d'un velu rude } les feuilles font verd foncé , velues. Les fleurs font monopécates en entonnoir , terminées pat cinq petites découpures; elles font de couleur pourpre ou blanches; il leur fuccede quatre graines noirâtres, Enfances, à cê te de Vipère au fond du calice : elle fleurit en été. Elle vient dans les prés, au bord des ruifleaux. Vertus et Usages. Elle eft vulnéraire, aftringente, calmante : la dofe de la racine en poudre eft un gros, &c en infuiiori ou en décoction j depuis demi-once jufqu'à une once. Extérieurement elle eft vulnéraire , aftringente , co'nfolidante. Elle entre dans la Poudre de Bauderon , le Baume poiycrefte, l'Eau vulnéraire de Lémery, le Mondificatif d'Ache , l'Emplâtre pour les hernies , pour les fraétures 6c luxations , royal pour la hernie du Prieur de Cabrieres*

The text on this page is estimated to be only 18.11% accurate

TOME SECOND. t yt PLANCHE 232. Coriandrum majus, Coriande., Ann. ON fe fert de la graine. La racine eft menue, blanche, fibrée. La tige s'élève de plus de trois pieds liffe. Les fleurs font en parafai , d'un blanc purpurin , plus grandes & inégales au pourtour du parafol ; il leur fuccede &deux graines accollées, formant enfemble un périt globe jaune-pâle : die fleurit en été. Toute la plante fent la punaîfe j mais l'odeur des graines s'adoucit avec le temps , & devient d'un gout agréable. On la cultive aux environs de Paris. Vertus et Usages. Elle eft carminative, ftomachale, un peu aftringente. (Elle entre dans l'Eau de fix graines , l'Eau de Méliffe compose , la Poudre digeftive de Charas. PLANCHE 233. Cornus, Cornouiller. ON fe fert du fruit. C'eft un arbre de grandeur médiocre. L'écorce eftrougeâtre, le bois eft blanc & dur; les feuilles font liffes verd foncé. Les fleurs paroilfenr dès le premier printemps. Avant les feuilles, elles font à quatre pétales jaunes; il leur fuccede des fruits moins gros qu'une olive, charnus, rouges, mois; leur gout eft acide, agréable avec quelque aftridtion :Us contiennent un noyau oblong , très-dur , à deux loges , chacune renfermant une petite amande douceâtre. Vertu s. Les fruits font aftrinçents, rafraîchiffants , defficatifs. Extérieurement les feuilles & les boutons font très-deflicarifs. Corylus, Coudrier noifetier. On fe fert du fruit nommé noifette. "C'eft un arbriffeau.

The text on this page is estimated to be only 18.79% accurate

*5,t INDIGENES. La racine eft épaiflè , profonde en terre , s'étendant ah Iarg? Les tiges font grottes ; le bois eft blanc & mol ; les femi[ej font vertes , plus blanches en deflbus. Les chatons des fleurs à étamines paroittenc au Printemps' il3 font jaunes. Les fruits naiffenr à part ; leurs enveloppes font velues , verres, d'un gour acide, aftringent : la coque qui renferme le fruit eft dure , roulfe , lifte. Le fruit ou amande qui y eft contenue eft enveloppé d'une peau roufleàtre ou rouge : cette amande eft ferme , blanche , douce au gour. Il vient par-tout dans les bois : on en cultive une efpece dont l'amande, qui eft plus grotte que celle du Coudrier des bois, fe nomme aveline. V E R T V S. Les noifettes font béchiques. PLANCHE 2,34. Cotonta malus 3 Coignaffier. ON fe fer: de fes fruits & graines. Oeil un arbre médiocrement haut. Les racines font nombreufes , droites en terre , quelquefois obliques, couvertes d'une écorce brune. L'écorce du tronc eft lifle gris brun ; le bois eft aflez fermes pâle; les feuilles font vertes & liftes en defllis, blanchâtres, très-coton neu fes en deflbus. Les fleurs font à cinq pétales couleur de chair 5 il leur fuccede un fruit, qui devient gros comme une pomme ordinaire; (il y a des pieds dont les fruits font faits comme une poire.) Les uns & les autres font recouverts d'un duvet ou coton épais; leur chair eft: jaune de cire , d'une odeur très-forte , d'un gout aftringent, un peu acide; leur centre eft occupé par cinq loges , qui contiennent des graines ou pépins gluants , couleur de châtaigne en dehors , blancs en dedans. On le cultive dans les jardins fruitiers. Vertus et Usages. Les fruits font ftomachiques, fort aftringents, fur- tour étant mangés cruds. Extérieurement

The text on this page is estimated to be only 16.20% accurate

TOME SECOND. Extérieurement l'infulion des graines ou pépins eft adoucit fente. Le fuc des fruits entre dans îe Sirop d'Abfymhe, émétiqua de Charas. Les pépins encrent dans le" Sirop de Jujubes. 0 PLANCHE 13^ Crudata, Croifecte, Vm N fe fert de toute la plante. La racine eft traçante, fibreufe. Les riges. s'élèvent d'un pied & plus, quarréôs, velues ainfî que les feuilles. Les fleurs font monopétales en cloche, découpées en quatrd jaunes ; il leur fuccede un fruit, compofé de deux graines arrondies, renfermées dans une membrane ou peâu velue : elle 'fleurie l'été. Elle vient dans les lieux herbus , dans les haies. Vertus. Elle eft vulnéraire, aftringente, intérieurement & extérieurement. 0 PLANCHE 236. 1 Cucumis faùvus, Concombie, Ann4 N fe fert de la gtaine. Les racines font droites , fibrees , chevelues. Les tiges font farmenteufes , longues ^ rampantes , garnies Vrilles pour s'accrocher ; les feuilles font rudes au toucher. Les fleurs font monopétales découpées en cinq , jaune pâle S les unes ftériles , les autres portées 'fur un embrioii , qui deTient un fruit long de plus d'un demi- pied , jaunâtre bu blan«latte, inégal, anguleux, plein d'une chair ferme , fucculente, oun gout auftere , partagé en trois ou quatre loges, remplies Je graines oblongues, pointues, blanches, le dedans eft lairea* & doux : elle fleurit en été. On la cultive dans les PotagersK

The text on this page is estimated to be only 18.50% accurate

IS4 INDIGENES» Vertus. La graine eft une des quatre femences froides : elle eft rafht chilfante. PLANCHE 237, Cucumis afininusy Concombre fauvage, Ann. ON fe fert de toute la plante. La racine eft grofle de deux ou trois pouces , longue d'un pied, fibreufe, charnue, blanche, amere, répugnance. Les riges font rampantes , un peu rudes. Les fleurs font monopétales découpées en cinq, jaunâtres, mêlées de veines verdâtres ; il leur fuccede des fruits d'environ deux pouces de long, cylindriques, un peu velus & rudes, verds, partagés en trois loges, remplies d'un fuc amer, qui contient des graines luifantes, noirâtres : elle fleurit en été. Elle vient dans nos pays chauds , aux lieux incultes ; on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. Le fuc de la plante, exprimé & épaiffi, connu fous le nom &ELzt&riurn3 eft un purgatif, à la dofe d'un demi-grain à un grain; mais comme il 'eft trop malfaifant, il eft bien rare qu'on t'emploie. f Extérieurement le fuc eft émollient, réfolunf. VElaterium entre dans l'extrait Panchimagogue , l'Onguent Agrippa , Arragon , de Arthanita , l'Emplâtre diabotanum PLANCHE 238. Cucurbita> Courge, Ann. \ ON fe fert des graines. La racine eft tendre , blanche , fibrée.^ Les tiges font farmenteufes , greffes du doigt, anguleufes, rampantes & grimpantes, en s'atcachant par fes vrilles ; les feuilles font coconneufes. ^ , . , Les fleurs font monopétales découpées en cinq, blanches, velues en dedans; les unes mâles ou ftériles , les autres portées

The text on this page is estimated to be only 17.79% accurate

t Ô M E S E C O N D. ni ÏUr an embrion , qui devient un fruit fort gros , renflé par la bas , long quelquefois de cinq à lix pieds. L'écorce en eft dure, jaunâtre, le dedans elt plein d'une moelle blanche, infipide, partagée en fix loges, qui contiennent des graines longues de près d'un pouce, plates, larges * enfermant une amande blanche , douce , d'un gout agréable $ la pulpe du fruit eft bonne à manger. Vertus. La graine eft une des quatre femences froides : elle eft câfriîà chiflante , adouciflante. PLANCHE 239. Cuminum , Cumin , Ann. ON fe fert de la graine. La racine eft branchue , menue , fibreufe. La tige eft à peine haute d'un pied. Les fleurs font en parafol, blanches; il leur fuccede deux graines accollces , gris brun, longues de trois lignes, d'une odeur très-forte , d'un gout aromatique fort acre , un peu amer j elle fleurit en été. On la cultive à Malthe. Vertus. Elle eft ftomachale , carminative, intérieurement Ôc ex té-" rieurement. PLANCHE 2.40, Cupreffus > Cyprès. N fe fert de fes fruits. C'eft un grand arbre. On comprend fous ce nom deux arbres delà mêmeefpecé^ différents feulement par leur port, portant tous deux les mê-' mes fruits , quoiqu'on en appelle un le mâle & l'autre la femelle mal à propos : le mâle eft donc celui qui écarte fes rameaux , Se la femelle celai qui les ferre contre la tige & Ï4 termine en pointe. O

The text on this page is estimated to be only 19.47% accurate

\%6 INDIGENES. Le tronc eft dtoit, lecorce eft brune, le bois eft dur, roitgeâtre , d'une odeur agréable ; l'arbre refte verd toute l'année Les - fleurs font des Chatons ftériles; les fruits viennent \ part fur le même arbre ; ils font ronds , gros comme mie ponv. me d'api, durs, roux, imitant les compartiments de l'écaillé de Tortue, d'un gout acerbe ; ils enferment des graines roufles pleines d'une petite amande : il fleurît au printemps. Il vient dans Fille de Candie & en Orient} on le cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus. Les fruits font très-aftringents , fébrifuges ; la dofe en poudre eft un gros dans du vin. Extérieurement ils font vulnéraires, aftringents. PLANCHE 2-41. Cufcuta, Cufcuté, Ann-. ON fe fert de toute la plante. C'eft une plante parafite , c'eft-à-dire , qui vit aux dépens des plantes fur lefquelles elle s'attache. Elle a d'abord des racines chevelues-, mais quand les tiges, en s'allongeant, fe font appliquées au moyen de petits fuccoirs ou radicules , aux plantes qu'elles rencontrent , elles fe nourriffent de leur feve, & reproduifant de nouvelles riges, leurs racines meurent : elles n'en ont plus befoin. Les tiges ne font que des filaments fins comme des cheveux , ronds , rougeâtres , d'un gout âcre , peu allongent , ne pouffant jamais de feuilles ; mais feulement des paquets de rieurs de diftance en diftance, blanc incarnat, monopétales en cloche, découpées en quatre; il leur fuccede un fruit arrondi à trois ou quatre angles , renfermant des graines brunes trèsmenues : elle fleurit en été. Quand cette plante occupe le thim , on la nomme Epithim, Vertus et Usages. Elle eft apéritive, antifeorbutiquej la dofe eft depuis une pincée jufcju'à deux ou trois. Elle entre dans les pilules tartareufes, la poudre de Joie, *

The text on this page is estimated to be only 19.16% accurate

TOME SECOND. I$r-Ele&uaire de Pfyllium , de Séné, la Confection ftamech, le Sirop apéritif, cachectique. Les graines entrent dans le Snop de Chicorée compofé , de Fumeterre. PLANCHE 242. Cyanus , Bluet, barbeau, Ann. ON fe fert de fes fleurs. La racine eft ligneufe , garnie de fibres, très-fines. La tige s'élève à un pied & demi & plus, anguleufe , creufe, cotonneufe j les feuilles font verd cendré» Les rieurs font à fleurons plus petits dans le centre, plus grands autour , tous découpés en cinq , bleus ou blancs ou pourpres j il leur fuccede une petite graine longuette , luifante- , blanche, aigretée. Vertus. Les fleurs font ophtalmiques -, on en diftille une eau qu'on nomme Eau de cajjelunettes. PLANCHE 243. Cyclamen, Pain de pourceau, Yiv. ON fe fert de fes racines. La racine eft ronde, épanTe, charnue, fibfée, noirâtre en dehors, blanche en dedans, fans odeur, d'un gout acre, brûlant, défagréable. Les fleurs viennent avant les feuilles , fur la fin de F été j les feuilles qui font pourpres en deffous, viennent enfuite, paffent l'hiver & périment vers la fin d'avril de l'année fuivante. Les rieurs font monopétales découpées en cinq parties qui fe relèvent j elles font pourpres, d'une odeur agréable; quand elles font tombées, le pédicule qui les portoit, fe replie en plutïeurs tours de fpirale, jufqu'à ce que le jeune fruit qui leur fuccede, foit arrivé- fur terre, où il achevé degrofïïr & devient prefque fphérique , renfermant des graines oblongues , d'un brun rougeâtre» Cette plante ne s'élève que de quatre à cinq pouces»

The text on this page is estimated to be only 18.15% accurate

M8 INDIGÈNES. On la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. Extérieurement elle eft incifive , réfolutive , vulnéraire , dé% terfive, émolliente ; fon fuc entre dans l'Onguent arthanita; les racines entrent dans l'Emplâtre diabotanum , pour les ganJ glions. PLANCHE 2.44. CynogloJJum, Langue de chien, Viv, ON fe fert de fa racine Se feuilles. La racine eft droite en terre, de la forme d'une rave, d'un rouge noirâtre en dehors , blanche en dedans , d'une odeur narcotique forte, d'un goût doux & fade. Les tiges s élèvent à deux pieds j elles ont un duvet épais; les feuilles font cotonneufes^ blanchâtres , d'une odeur forte Se défagréable. Les fleurs font monopétales en entonnoir découpé en cinq, d'un rouge fale; il leur fuccede un fruit, compofé de quatre capfules hériffées de crochets, qui enferment une graine apptatie; elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes , à l'ombre, Vert us. Elle eft narcotique , anodine, légèrement aftringente : la dofe de la racine en déco&ion eft jufqua une once, & des feuilles jufqu'à une poignée. Extérieurement elle eft émolliente , réfolutive. Les Pilules de Cynoglofte font narcotiques, calmantes: la dofe eft depuis quatre jufqu'à dix. : D. PLANCHE 24 5"Daucus Credcus , Daucus de Candie , B. Ann, N fe fert de fa graine, La racine eft épaule du doigt, longue, fibrée, d'un o goût de panais,

The text on this page is estimated to be only 17.45% accurate

TOME SECOND. IJ5 La tige s'élève de neuf pouces & plus de haut, cannelée, velue ' les feuilles font cotonneufes , quelquefois liftes. Les fleurs font en parafol , blanches ; il leur fuccede deux graines accollées , oblongues , cannelées, blanchâtres, velues, d'une odeur foible , d'un gout aromatique , acre : elle fleurit au printemps. Elle vient dans l'Ifle de Crête, fur les Alpes. o PLANCHE MA Daucus vulgaris > Carotte , B. Ann. N fe fert de fa graine. La racine eft droite en terre, jaune. La tige s'élève de deux pieds & plus, moclleufe, cannelée, velue j les feuilles font verd foncé , velues en defTous. Les fleurs font en parafol, blanches , quelquefois la fleur du centre du parafol eft rouge ; les fruits qui leur fuccedent reffemblent à ceux de la précédente ; mais plus courts , plus larges & hérifles , d'une odeur pénétrante , d'un gout femblable à la première ci-deflus : elle fleurît en été. Elle vient aux lieux incultes : on la cultive dans les Potagers. Vertus et Usages des deux Daucus. Les vertus des deux Daucus ci-deflus, font les mêmes; on fubftkue l'une à l'autre. La graine eft une des quatre petites femences chaudes; elle eft incifive, apéritive , diurétique, hyftérique. Elle entre dans la Thémque, le Mithridate, le Triphera magna , l'Ele&uaire de baies de laurier, le grand Philonium, l'Aurea Alexandrin* , le Sirop de Calament, de Marrhube. PLANCHE 247. Bars Iconis latiore folio, Pifïenlit, Viv. ON fe fert de fa racine & feuilles. La racine eft groflè du petit doigt , laiteufe. Elle n'a point de tiges 5 les feuilles font lifles. Les pédicules des fleurs s'élèvent de neuf pouces ; les fleurs K 4

The text on this page is estimated to be only 10.19% accurate

j£ , , . a INDIGENES. àemi-^ons jaunes j il leur fuccede une BraîflB ! Citron ou rouge, aigre cée ■! die fleurit en été S ^ h* EUe vient en tous lieux. Toutes fes parties font laiteufes, ameres. Vertus et Usages. Elle eft apéritive, diurétique, fébrifuge ! vulnéraîr* . i \ , en mfufion ou en décoction! eft de quafre'i fix on I k 3°? du lue eft de trois à quatre onces. » a dofe Elle entre dans 1'Apofeme n^r;f,ï^ pr^ bn rouge ; dans ie ipïfi^ «T*** PLANCHE 248. Digualis, Digitale, Viv. kN fefert de fes feuilles. Les fleurs font monopéta es e n uZ Ver '^T^ mêlée de blanc en dehors le dS 7 a Ukur CCarlace> blanc & de noir parfem/ l t ^ P0^' PanacW & fruit ou coque "iîJ^™ t^f ^ fuccede un «es rouffeâL \ S^K* «S P ^ ** Vertus. On ne s'en fert point intérieurement. Extérieurement elle eft vulnéraire, déterfive. PLANCHE 249. Dipfacus faùvas, Chardon à foulon, B. Ann. ON fe fert de fa racine. La racine eft afTez longue , blanche. nelée "E.lr T^ ^ * ^ Pkds> droire> «eufe>canpeiee , ayant quelques épines. Les feuilles font verd gai. Les Heurs forcent d'encre les écailles des Eêces; elles font i

The text on this page is estimated to be only 20.38% accurate

TOME SECOND. iGi fleurons blancs ou purpurins 5 il leur fuccede mie graine anguleuse , amere : elle fleurît en été. On la cultive dans les champs. Vertus. Intérieurement elle eft alexitaire, diurétique. PLANCHE 2JO. Dracunculus major, Serpentaire, Viv, ON fe fert de fa racine & feuilles. La racine eft groCfe comme une pomme, profonde en terre, fibrée, garnie par fes côtés de petites bulbes, jaunâtre en dehors , blanche en dedans , d'un goût brûlant. La tige s'élève d'un pied & demi &phis, droite, lilfe, panachée de taches de couleurs différentes, imitant une peau de Serpent; les feuilles font luifantes. La fleur eft un feul pétale , verd en dehors , pourpre clair en dedans , d'une odeur défagréable & un piftile noirâtre , plus gros Se grand que celui du Pied de veau, Pl. 155. Vers la bafe de ce piftile , nailTent des baies Succulentes , rouges , plus groffes que celles du Pied de veau,- &c leur reflemblenr, d'un gout brûlant, contenant une ou deux graines arrondies : elle fleurit en été. Elle vient dans nos pays chauds ; on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. Les vertus de cette plante font les mêmes que celles du Pied de yeau , qui cependant eft plus doux j c'eft pourquoi on ne fe ferc de celle-ci qu'à l'extérieur. Elle eft vulnéraire, déterfivej les racines & feuilles fraîches font adoucilfantes. La racine entre dans la Poudre pour le cancer OU Poudre bénite de Fufchius, dans l'Emplâtre diabotanum.

The text on this page is estimated to be only 17.24% accurate

iH INDIGENES, O PLANCHE 2JI, Dracunculus ptarmicay Herbe à é remuer, Viv. N fe fert de fa racine &: feuilles. La racine eft oblique en terre , fibreufe , d'un pm acre, brûlant. 6 La tige s'élève de deux à trois pieds ; les feuilles' font verd brun, d'un gout brûlant. Les fleurs font radiées, blanches; il leur fuccede de petites graines : elle fleurit en été. i Elle vient dans les Prés. Vertus. La racine eft mafticatoire ; la plante en poudre eft fternwatoire. PLANCHE 2J2. Dracunculus efculentus, Eftragon, Viv. ON fe fert de route la plante. La racine eft compofée de grofTes fibres , brun pâle. Les tiges s'élèvent jufqu a trois a quatre pieds ; les feuilles font verd foncé, d'un gout piquant, aromatique, agréable. Les fleurs font très-psrites à fleurons ; il leur fuccede une petite graine fans aigrette : dk fleurit en été. On la cultive dans les Potagers. Vertus. ^ Elle eft très-incifive, apéritive, digeftive, carminative, hyftérique. PLANCHE 253/ Dulcamara, Doucc-aiffere , Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft perite , fibreufe. Les tiges font farmenteufes , grimpantes, s 'allongeant jufqu' a

The text on this page is estimated to be only 18.53% accurate

TOME SECOND. itfj pieds 5 l'écorce eft cendrée extérieurement, d'un beau verd ApAms ; le bois eft moelleux : les feuilles font verd gai. Les Heurs font monopétales découpées en cinq , d un violet clair - il le«r fuccede une baie allongée , rouge , fucculente , d'un goiJt' vifqueux , défagréable , remplie de perites graines blanchâtres : clic fleurit en été, Elle vient dans les haies , dans les bois humides. Vertus. Elle eft calmante, apérkive, adoucifiante, extérieurement, 0 PLANCHE l$4r Ebulus 3 Hieble, Viv. N fe fert de fa racine , de l'écorce de la racine , des feuiî, les Se fruits. ^ (La racine eft longue, grotte du doigt, éparfe de côte & d'autre, charnue, blanche, d'un gout âcre un peu amer , répugnant. Les tiges s'élèvent de trois ou quatre pieds, vertes, anguleufes , moëlleufes ; les feuilles font ameres. Les fleurs imitent le parafol ; elles font monopétales découpées en cinq, blanches, odorantes; il leur fuccede une baie noire, amere, pleine d'un fuc pourpre, qui contient trois graines oblongues : elle fleurit en été. Elle vient dans les terres labourées & près des chemins. Vertus et Usages. Elle eft purgative, hydragogue; les fleurs font fudorifiques : ladofe delà graine en poudre eft un gros, linfufion eft demionce dans fix onces de liqueur , le fuc de la plante eft une once, la décoftion de l'écorce, depuis demi-once jufqu'a deux onces. Extérieurement, les feuilles font adouciflantes , retolutives , l'écorce de la racine eft difeuffive, émolhente. Les racines & «aines entrent dans l'Hydragogue excellent de Renaudoc. La racine entre dans le Sirop Hydragogue de Charas, l'Emplâtre de Grenouilles avec le Mercure. Lesfeutlks entrent dans l'Extrait panchimagogue. de Crollius , 1 Onguent Martial,

The text on this page is estimated to be only 17.15% accurate

ï^4 INDIGENES. PLANCHE 2J5-. Elatine, Velvote, Ann. ON fe fert de toute la plante. La racine eft droite en terre , menue , peu fibrée Les tiges font rampantes ■ celle du milieu s'élève de fix \ y, pouces ; les feuilles font verd pâle , velues , fort ameres Les fleurs font monopétales , irrégulieres en m afqiïe /jaunesil leur fuccede un fruit ou coque, féparée en deaxloges rem* plies de pluûeurs graines arrondies : elle fleurit en été. LJle vxent dans les champs , dans les bois. Vhtus, Elle eft vulnéraire ,déterfive, apéritive , tempérance : ladofe en inhiiion ou décoétion eft de quatre à fix onces . le fuc deouis trois onces jufqua cinq. ^ Extérieurement elle eft déterfîve. L PLANCHE 2j6. Endivia, Chicorée blanche, B. Ann. Endivia latifolia, Scariole. Es racines font fibreufes , laiteitfes, La tige s'élève de deux ou trois pieds lifte, cannelée, laireufe, creufe • les feuilles font un peu ameres. Les fleurs font bleues 5 elles reflèmblent , ainfi que les graines , a la Chicorée fauvage. Endivia anguflifolia , petite Endive. Elle refTemble en tout à la précédente, excepté que les fleurs, iont plus étroites 8c plus ameres. Endivia crifpa 3 Chicorée frifée. Elle refTemble aux précédentes , excepté que les feuilles font plus grandes, qu'elles font frifées , la tige plus grotte, la graine noire. Toutes ces endives fleurirent en été & fe cultivent dans les Potagers.

The text on this page is estimated to be only 17.57% accurate

TOME SECOND. î£r5 On fe fert de leurs feuilles & graines. Vertus et Usages. La graine eft une des quatre petites femences froides. Elles font lafraîchiflanres , déterfives , apéritives-, tempérances. Extérieurement les feuilles font émollientes. Les Endives entrent dans le Sirop de Chicorée £mple 8z compofé* PLANCHE 2,57. Enula campana , Aunée, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft épaifle , charnue , branchue , bruhê en dehors , blanche en dedans , d'une odeur douce Se agréable , d'un gout aromatique un peu amer. La tige s'élève de quatre à cinq pieds, droite, cannelée, velue1, les feuilles font verd pâle en deffus , blanchâtres en deflfous. Les fleurs font radiées jaunes j il leur fuccede des graines longues , étroites , à aigrettes : elle fleurit en été. Elle vient dans les terreins gras & humides. Vertus et Usages. Elle eft béchique , ftomachale , fudorifique , diurétique , utérine , apéritive , alexipharmaque : la dofe de la racine fraîche eft depuis demi-once jufqu a une once, de la racine feche en Poudre depuis une once jufqu a deux. Extérieurement elle eft réfolutive , déterfive. Elle entre dans le Sirop d'Armoife, Hydragogue , Antiafthmatique, le Looc de Santé, pectoral, l'Ôpiat de Salomon, l'EJeftuaire Catholique Ample , l'Onguent Martiatum , l'Emplâtre de Vigo , le Diabotanum.

The text on this page is estimated to be only 20.05% accurate

t66 INDIGÈNES. PLANCHE 2j8. Equifetum majus, Pie fie, Viv. ON fe fert de toure la plante. La racine eft compofée de grand nombre de fibres , ^ liées , noirâtres. La tige s'élève de rrois à quatre pieds, creufe, très-canne, lée , blanchâtre. Elle eft compofée, ainfi que les feuilles de tuyaux articulés l'un fur l'autre. Les fleurs forment une tête longue; elles font à étaminesles fruits naiflent fur des pieds qui ne portent point d'ctami! nés; ce font des graines noires, rudes : die fleurit en tu. Elle vient dans les marais, le long des ruifleaux. Equifetum minus , petite Prefle, Viv. La racine eft menue, noire, rampante, fibrée. Les tiges n'ont qu'un pied de haut , Ôc relfemblent , ainfi que les feuilles , à la précédente. Les têtes des fleurs font à étamines blanches. Vertus des deux P k. e s l e s» Elles font les mêmes. Elles font fort aftringentes : la dofe de la Poudre eft un gros ^ ôc la dofe en décoétion quatre onces. PLANCHE Eruca fativa, Roquette 3 Ann. ON fe fert de fes feuilles & graines. La racine eft blanche , ligneufe , menue, d'un gout acre. La tige s'élève de deux à trois pieds, un peu velue; les feuilles font lifles , d'un gout acre. Les fleurs font à quatre pétales d'un blanc jaunâtre; il leur fuccede une gouffe longue, partagée en deux loges, remplies de graines jaunes : elle fleurit en été. L'odeur de la plante & fon gout font forts Se défagréables* On la cultive dans les Jardins.

The text on this page is estimated to be only 19.81% accurate

TOME SECOND. If? PLANCHE l6o. Eruca fylvejîris, Roquette fauvage, Viv. N fe fert de fes feuilles & graines. La racine eft aflez longue , épaiffe , blanche. Les tiges selevent comme celles de la précédente, creufes, cannelées, velues; les feuilles font verd foncé, liftes, d'un gout brûlant. o Les rieurs font à quatre pétales jaunes , odorantes ; il leur fuccede des filiques longues , remplies de graines acres & un peu aineres : elle fleurit en été. Toute la plante a une odeur fétide. Elle vient dans l'herbe, aux lieux incultes. Vertus et Usages des deux Roquettes. Les vertus font les mêmes; mais plus foibles dans celle de Jardins, que dans la fauvage. Elle eft ftomachale , diurétique , an tifcorbu tique , en bouillons , apofemes , &c. Extérieurement la graine eft mafticatoire. Elle entre dans l'Eledcuaire de Satyrion, dans les Tablettes de Magnanimité. PLANCHE 26l. Eryngium, Chardon rolant, Yiv. ON fe fert de fa racine & de fon écorce. La racine eft grade du doigt, d'un pied de long, rendre, cordée en fon milieu, noirâtre en dehors, blanche en dedans , d'un gout doux. La tige s'élève à un pied & demi, cannelée , moëlleufe ; les feuilles font verd de mer, garnies d'épines, d'un gout un peu aromatique. Les fleurs forrent d'une têre ronde ; elles font à cinq pétales blancs j il leur fuccede deux graines cannelées , convexes : elle fleurit en été. Elle vient dans les champs , le long des chemins.

The text on this page is estimated to be only 17.03% accurate

INDIGENES; PLANCHE 2,62. Eryngium marinum, Panicaut de mer^ Viv, ON fe fert des mêmes parties du précédent. Les racines font grades du doigt, fe répandant de côté &c d'autre, blanchâtres, un peu odorantes, d'un gout doux& agréable. Les tiges s'élèvent d'un pied & demi , un peu rougeâtres j les feuilles font épailles , épineufcs , bleuâtres , d'un gout aromatique. Les tètes des fleurs & les feuilles environnantes, font d'un beau bleu -, les fleurs femblables à celles de la précédente , blanchâtres : elle fleurit en été. Elle vient fur les côtes de la Mer. Vertus et Psages des deux Eryngium. Quoiqu'on fe ferve rarement du Panicaut de Mer , cependant il a les mêmes vertus du Chardon rolant. La racine e(b une des cinq petites racines apéritives; elle eft apéritive , hépatique, diurétique, néphrétique, utérine: h dofe de 1 ecorce feche eu décoftion , eft une once par livre de liqueur. La racine entre dans le Sirop Hydragogue , antifcorbuticjue, de Guimauve , l'Electuaire de Satyrion. t o PLANCHE 2.63. Eryjîmum, Vélart Tortelle , AnN^ N fe fert de toute la plante. La racine eft grofle du petit doigt , îigneufe , fentant la rave , d'un gout acre. La tige s'élève de trois pieds. Les fleurs font à quatre pétales jaunes ; il leur fuccede une gouife longue, en deux loges, qui contiennent de petites graines brunes , d'un gout piquant : elle fleurit en été. Elle vient aux endroits incultes, fur les murs, le long des haies. Vertus

The text on this page is estimated to be only 14.89% accurate

ÎOME SECOND' ^ Vertus. Elle eft béchique, incifive, antifcorbutique : la dofe eft une ol] deux poignées , macérée dans de l'eau ou du vin : la dofe dû la graine eft un gros. PLANCHE 264. Efula mino'r, petite Efule, Yiv. N fe ferr de la racine. La racine dt grofle du doigt, ligUeufe, fibreufe, ram. pnre , d un goût acre & piquant* La tige s'élève d'un pied. Les rieurs font monopétales en grelot divîfé en quatre , rer* datres ; il leur fuccede un fruit à trois angles , à trois capfules contenant trois graines arrondies : elle fleurit en été. Toute la fiante eft laitëufe. Elle vient par-tout , dans les bois* o PLANCHE ïèf. Efula major, grande Efule, Yiv. LA racine eft grofle du poucé, longue d'un pied, un pé« fibreufe, d un gout âcre. Y La tige s'élève un peu plus que la précédente; les rieurs &r les fruits font pareils ; elle eft laiteufe de même : elle fleurit fête. fille vient dans les champs. Vertus et D sages des deux Èsuies Elles ont les mêmes vertus. La racine Se fur- tout fon écotee eft très-purgative Hydragogue ; mais comme elle eft brûlante i il vaut mieux s'en abfteiur ou la tempérer avec des rafraîchiOanrs , alors la dofe en poudre eft un ferupuie & l'infufion jufqua deux gros. La racine entre dans l'Extrait Catholique & Cholagogue, îa «cne^aelaxative, l'Hydragogue de Renaudot, les Pilules de

The text on this page is estimated to be only 18.87% accurate

ï7o INDIGENES. PLANCHE 2.66. Eupatorium cannabinum, Eupatoire, Viv. N fe fert de toute la plante. _f La racine eft oblique en terre , accompagnée de grottes fibres blanchâtres. La tige seleve de cinq pieds, droite, velue, moclleufe, tirant fur le pourpre , d'une odeur aromatique ; les feuilles ont un gout amer. Les fleurs font à fleurons purpurins ; il leur fuccede des gcaines oblongues à aigrettes , dans le calice : elle fleurit en été. Elle vient au bord des bois humides & aquatiques. Vertus. Elle eft apéritive , hépatique , diurétique , hyfterique : la dofe de la décodtion des feuilles & fommités , eft une poignée dans une livre de liqueur. L'infufion des feuilles feches le fait comme le Thé. Le fuc des feuilles eft à la dofe de trois onces. Extérieurement elle eft réfolutive. PLANCHE 2.67. Euphrafia, Euphraife , Ann,, ON fe fert de la plante en fleurs. La racine eft menue , ondoyante, blanche, avec quelques fibres. > • » ï La tige s'élève de fept à huit pouces, velue, noirâtre; les feuilles font verd foncé , liftes , luifantes. Les fleurs font monopétales irrégulieres , en mafque , blanchâtres, marquées de lignes pourpres & jaunes; il leur fuccede un fruit ou capfule allongée, brune, partagée en deux loges, qui contiennent de petites graines longues, grifes : elkfiearit en été. Elle vient aux lieux arides , fur les montagnes. Vertus. Elle eft céphalique , ophtalmique : la dofe en Poudre eft depuis un gros jufqu'à trois gros. Extérieurement elle a les mêmes vertus.

The text on this page is estimated to be only 15.03% accurate

TOME SECOND. ifr nfPTP3Br?Fr"TTnirT""Tg~" uinn-i
PLANCHE 2,68* fiaba , Feve de Marais, Ann. ON fe fert du fruit. La racine eft en partie droite en rené êc en parrié rampante, fibiée. La tige eft droite; elle s'élève de deux pieds & demi, quarlée , creufe ; les feuilles font bleuâtres , liftes. Les rieurs font légumineufes , Férendard eft blanc , les pétales des cotes ont une tache noire à leur milieu, le pétale inférieur1 eft verdâcre ; il leur fuccede une gouffe longue, charnue, velue, qui contient quatre ou cinq graines qu'on nomme greffes Fèves, en forme de rein, blanches ou jaunes ou noires , &cu elle fleurit en été. On la cultive dans les champs & dans les Potagers. Vertus. Extérieurement la farine de groiîes Fèves eft une des quatrè farines réfolutives. Elle eft adouciffantei
PLANCHE 269. Pagopyrum , Bled noir , Sarrafin , Ann, ON fe fert de fa graine. La racine eft compofce de fibres menues. La tige s'élève d'un pied & demi & plus, lifte, verte ou pourpre ; les feuilles font liftes , verd foncé. Les rieurs font à étamines rouge-kres , le calice eft blanc purpurin , découpé en cinq ; il leur fuccede une graine triangulaire é noire, contenant une pulpe ou farine très- blanche : elle fleurie tn Automne. On la cultive dans les champs. Vertus. Extérieurement la farine des graines eft réfoluùve , émoliiente j digeftive, maturative, % 2

The text on this page is estimated to be only 17.32% accurate

17* INDIGENES. PLANCHE 270. Filipendula , Filipendulc, Viv. ON fe feEt* de fes racines & feuilles, La racine eft charnue , garnie de fibres menus , termî* jiés par des tubercules allongées, noirâtre en dehors-, blanche en dedans , d'un gout mêlé d acre & de doux , légèrement amer. La tige s'élève d'un pied , cannelée ; les feuilles font verd foncé. Les fleurs font à fix ou fept pétales , blancs en dedans, rougeatres en dehors , peu odorantes ; il leur fuccede un fruit rond , formé par nombre de graines oblongues 3 rudes : elle fleurit en -été. Elle vient dans les bois. Vertus. Elle eft incifive » diurétique , aftringente. PLANCHE 2-71Filix masi Fougère mâle, Viv» ON fe fert de fes racines. La racine eft épaifle, branchue, fibreufe , noirâtre en dehors , pâle en dedans , fans odeur , d'un gout d'abord douceâtre, puis un peu amer, aftringent. Elle n'a point de tiges ; les feuilles s'élèvent de trois pieds. Elle n'a point de fleurs apparentes ; les graines font à l'envers des feuilles , en rangées de petits points roux ; ces points font autant de coques , qui contiennent beaucoup de très-petites graines. Elle vient dans .les bois , aux lieux arides.

The text on this page is estimated to be only 19.02% accurate

TOME SEC O N D: i7} PLANCHE 2L72. Filix fcemina , Fougère femelle, Viv. LA racine eft quelquefois greffe du doigt; , rampante > gluante , noirâtre en dehors , blanchâtre en dedans , dîme odeur force , d'un gout amer. La tige qui porte les feuilles , s'élève jufqu a quatre ou cinq pieds. Elle n'a point de fleurs apparentes , les véficules des graines font à l'envers des feuilles, & y viennent fur leurs bords, lesquels fe replient par-deflîis comme pour les cacher. Elle vient aux mêmes lieux de la précédente. PLANCHE 273. Filix florida^ Fougcre fleurie, Ofmonde,, Yiy-. ON fe fert de fa racine , fruits & fom-mités. La racine confifte en quantité de fibres noirâtres , mêlées les unes dans les autres. Les tiges s'élèvent de quatre pieds &plus , cannelées, liftes; les feuilles font verd clair. Elle n'a point de fleurs apparentes -, les fruits font au haut des tiges , par perites grappes garnies de fruits & graines femblables aux précédentes. Elle vient aux endroits humides. Vertus des trois Fougères. La féconde ou femelle eft préférée au mâle ; elles font vermifuges : la dofe de la racine en Poudre eft un ou deux gros. La troifieme ou Ofmonde , a la même vertu , mais puis, foible.

The text on this page is estimated to be only 16.58% accurate

174 INDIGENES. PLANCHE 2,74. Fœniculum 3 Fenouil, Viv. ON fe ferr des racines, feuilles & graines, La racine eft girofle du doigt , droite en terre, d'u aromatique doux. La tige s'élève à quatre ou cinq pieds, moelleufe, droite, verte, lilfe; les feuilles font verd foncé, d'une odeur & d'un gout agréable. Les fleurs font en parafol jaunes ; il leur fuçcede un fruit cornpofé de deux graines , accollées s oblongues , convexes , cannefées , jaunâtres , d'un gout acre , un peu fort. Ce gout devient doux par la culture , alors on nomme la plante. Fenouil doux: elle fleurit en été. On la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. La racine eft une des cinq grandes racines apérhhes j la graine eft une des quatre grandes ftmences chaudes; elle eft ftomachale , apéritive , déterfive , pectorale, ophtalmique, otalgique : la dofe en poudre eft depuis demi-gros jufqu'à un gros. Le fuc des racines eft fébrifuge, à la, dofe de quatre onces. Les racines entrent dans le Sirop apéritif &ç cache&ique, antiafthmatique, antinéphrétique , de Chicorée co m p ofé , d'Arrmoife, de Marrhube , des ciuq racines apéritives. Les grainu entrent dans la Thériaque , le Mithridar , la Confection Hamech , le Carholicon double , la Poudre Diarrhodon , le grand Philoniuin , le Diaphœnic , la Bénédicte laxarive , l'Electmira de Pfyllium , de Citron. Les feuilles entrent dans l'Eau vulnéraire de Panicher. • PLANCHE 2.75^ F diium-grecum , Fénugrec. ON fe fert de la graine. La racine eft menue , blanche. La tige s'élève d'un pied, verte, creufe j les feuilles fon* vertes d^Vs, cendrées deffbus.

The text on this page is estimated to be only 13.69% accurate

TOME SECOND. ï7? Les fleurs font légumineufes , blanchâtres ; il leur fuccede de longues Cliques, remplies de graines jaunâtres fillonnées , d'uneodeur un peu forte : elle fleurit en été. On la cultive dans les champs. Veutus et Usages.] On l'emploie rarement pour l'intérieur. Extérieurement la farine en eft émolliente , digefhve , refolutive , anodine, , T j c Elle entre dans le Sirop de Marrhube, le Looc de Santé, l'Onguent de Guimauve, le Mondificatif de réfme, l'Onguent MartUtO», l'Emplâtre Diachilum , de Mucilage, de Mchloi. PLANCHE 276. m Fragaria, Fraifier, Viv.. ON fe fert de fes racines , feuilles & fruits. La racine eft roufleâtre, nbrée Se cheveke, dun gout aftEÏfn'a point de tiges-; mais des traînages, qui prennent ». cinede dXnce en dïftance; les feuilles font velues, vertes en defTus , blanchâtres en deflbus.. . Les pédicules des fleurs s'élèvent de quatre à onq .pouces S les fleurs font à cinq pétales blancs ; il leur fuccede un fruit rond , LnT, Lculent?Lge ou blanc , d'un gout ™ agréable, garni extérieurement d'un grand nombre de petites graines. _T Vertus et Usages. Les fruits nommés Frai fes, font rafraîchuTants , diuréuques, TefLines & feuilles font diurétiques., apéritives, un peu ^Lef feuilles entrent dans l'Onguent Marùatum magnum, le Mondificatif d'Ache, L4

The text on this page is estimated to be only 10.00% accurate

PLANCHE 277, Fraxinus excdfior , Frêne. ON fe fert de fon écorce, bois & fruits. C'eft un très- grand arbre. La ^cine trace de tous càtés vers la faperficie de la ter»Le tronc eft droit, lecorce eft unie, cendre, ie bois blanc, les feuilles font verd gai, dun gout un peu amer t ' piquant. ° fsu , acre, Les fleurs viennent avant les feuilles 5 elles font à écaiabesi il leur fuccede un fruit applati , long d'un demi-pouce qJ u j e oueur ag. eable : d fleura au printemps. Il vient dans les forêts. Vertus et Usages. a^éi>e? & 16 b°1S aCténuWC^ ddM* Je « eft La graine entre dans l'EIefoaire de Satyriori, PLANCHE 278. Fumariay Fumeterre, Ann, /^\N fe fert de toute la plante fleurie. V La {aci"e ^ droite en terre, menue, blanche. u^Klîntit: creufes> d'un verdâtre ^ ï Ies » deL/lSlf0n'ideUXpétaleS ^Uer5' formant une efpeca de gueule allongée, purpurine; il leur fuccede un fruit arrondi, It; Jt' ?ïi renferme un* petite graine ronde, d'un gout «mer defagreable : elle fleurit au printemps. § 1 oiîte la plante eft très-amere. Vertus et Usages. «iip XaT T' aPëririTe^omach^e, diurétique, hyrtérique la dofe eft une poignée dans une livre de petit lait/ twn ttamççn, le Sirop de Chicorée compqfé,

The text on this page is estimated to be only 17.31% accurate

*77 PLANCHE 2,79. Fungus efcultntus, Champignon, Ann. C'Eft «ne plante d'une efpece lînguliere, à laquelle on ne connoît bien , ni fleurs , ni fruits } ni racine. Elle paroît d'abord en forme d'un bouton blanc , le bas du bouton quitte enfuite fon pédicule & s'étend en rond, en forme de calotte garnie en deflbus d'un amas de feuillets près à près , qui vont du centre à la circonférence perpendiculairement à la terre : ces filets font couleur de rofe à l'efpece donc il s'agit ici j jl s'élève vers deux pouces , le pédicule eft gros , fa couleur eft blanche, d'une odeur & d'un gout agréable; il eft formé en peu ère temps. Il vient naturellement dans les friches &: pâturages -y on en fait venir par art fur des couches de fumier , dans les Potagers. Fungus vernus, Mouflcron, Ann. Ce Champignon reffemble beaucoup au précédent, excepté que la calotte refte plus convexe 8c que la couleur des feuillets eft blanche j ainfi toute fa fubftance étant blanche, on peut moins s'y tromper en le cueillant j il eft d'une odeur 8c d'un gout très-agréable. 11 vient naturellement au printemps , parmi l'herbe courte. Fungus pulverulentus t Vefce de loup , Ann. Cette efpece de Champignon ne forme qu'une tète , qui devient quelquefois groiîè comme le poing : le pédicule eft plitfe près de terre, la couleur du tout eft blanche ou grife; il eft un peu raboteux en dehors 8c moelleux d'abord en dedans ; mais enfuite cette moelle devient une poufliere roulfe, fétide , aftringente. Il vient aux lieux incultes, dans l'herbe. Vertus et Usages des trois Champignons. On mange les Champignons 8c les MoulTerons cuits, à-caufe de leur gout agréable ; mais il eft eflentiel pour la vie , de les bien diftinguer de beaucoup d'autres efpeces qui font poifons , de même que ceux-ci quand ils font paftes , c'eft-à-dire , quand ils deviennent d'une couleur brune ôc d'une odeur forte.

The text on this page is estimated to be only 19.10% accurate

17$ INDIGENES. En général le Champignon eft indigefte. Le conrrepoifon du Champignon eft l'Emérique-, avec beau, coup de lait & d'huile. La Vefce de loup eft toujours poifon , pris intérieurementpiais extérieurement elle eft incraffante , aftringente. Sa Poudre arrête le fang. G. PLANCHE 280. Galega, Galéga, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft longue } blanche , ligneufe , fe répandant de. tous côtés. Les tiges s'élèvent de trois pieds , cannelées , creufes. Les fleurs font légumineufes , blanches ou violet très-clair^ il leur fuccede une goufle longue & étroite , qui contient pluHeurs graines allongées en forme de rein : elle fleurit en été. Elle vient en Italie j on la cultive ici dans les Jardins, Vertus. Elle eft fudorifique , alexipharmaque : la dofe du fuc eft deux cuillerées Se une poignée dans un bouillon. • PLANCHE 2,8 I . Gakopjis procerior^ Ortie morte puante, V*v\ ON fe fert de toute la plante. La racine eft rampante , un peu fibrée. La tige s'élève à trois pieds, quarrée, creufe , velue; les feuilles font duvetées. Les fleurs font monopétales en gueule , pourpres , d'une odeur défagréable ; il leur fuccede quatre graines au fond du calice : elle fleurit en été. Toute la plante a une odeur très-défagréable & un gouc d'herbe un peu aftringenr. Elle vient dans les bois.

The text on this page is estimated to be only 15.97% accurate

TOME SECOND. PLANCHE 282. Çaleopfis paluftris , Ortie morte de Marais , Viv, ON fe fert de toute la plante. La racine eft par bofles , rampante, La tioe s'élève de quatre ou cinq pieds , quarrée , creufe , élue rude , un peu rougeâtre j les feuilles font velues , rudes , kne odeur forte, d'un gout un peu amer. Les fleurs font monopétales en gueule, le pourpre des lèvres panaché de blanc -, il leur fuccede quatre graines au fond du ç alice : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux aquatiques. Vertus des deux Orties mortes. Extérieurement elles font vulnéraires , réfolutives , calmantes. PLANCHE 283. Caîeopfis lamium luteum^ Ortie morte à fleurs jauT nés , Viv. o N fe fert de toute la plante. La racine eft inégale, garnie de fibres aftez greffes. Les tiges s'élèvent d'un pied & demi , quarrées , créoles. Les fleurs font monopétales en goeule, jaunes; il leur fuecede quatre graines au fond du calice : elle fleura en etc. Elle vient dans les bois, Vertus. Elle eftfpléniqae, diurétique ; on s'en fert rarement ; on la fiibftirue quelquefois à l'archangélique , Pl. 31/* PLANCHE 284. Gallium luteum, Caillelait jaune, Viv. ON fe fert des fommités fleuries. La racine eft traçante, longue brune. Les tiges qui s'élèvent depuis neuf a du pouces delong.jui ,

The text on this page is estimated to be only 13.80% accurate

l8° INDIGENES-. font ve^foncl.^1111' *"* **** > " Ies M, Les fleurs font monopoles en cloche, découpées en an» "n fmit comp°ré de d£ux srames '°X< 3 Elle vient dans les prés. c PLANCHE 28 J. Gallium album 3 Caillelait blanc, Viv. Etre plante reffemble prefque en tout à la précédente V->cepce que fes fleurs font blanches & que fes tiges , elle eft appuyée, montent bien plus haut : elle fleurit en été. Vertus et Usages des deux Caillelait. Le Caillelait jaune eft céphaliqne, aftringent, Lntiépilepi que : la dofe en poudre eft julqu'à un gros, la décoction L poignée dans une livre d'eau , le foc jufqrfà quatre onces. " Extérieurement il eft vulnéraire, aftringent. H entre dans l'Onguent Marriatum, Le Caillelait blanc a les mêmes vertus , mais bien plus foiblesce qui tait qu'on ne l'emploie qu'au défaut du jaune. PLANCHE 2,86. 1 Genijia vulgaris 3 Genec. ON fe fort des tiges, feuilles & graines. C'eft un arbriifeau. La racine eft dure , jaune , fibrée. Les tiges s'élèvent jufqua cinq & fix piedS) vertes, flexible*: les fouilles font velues 9 verd foncé. Les fleurs font légumineufes, jaunes; il leur foccede une gonfle applatie, noirâtre, partagée en deux loges, qui contiennent des graines plates en forme de rein, roufleatres : il fleurit en etc. Tout l'arbrifleau eft forr amer. Il vient dans les bois & lieux arides.

The text on this page is estimated to be only 17.12% accurate

TOME SECOND. tzt Cenifia Hifpanlca -3 Genêt d'Efpagnc. On fe fert des mêmes parties du précédent. Ceft un arbrifleàu. Il s'élève à la hauteur d'un homme ; fon tronc devient de la grofleur du bras, fes jets reflemblent au précédent, mais plus gros. Les fleurs fonr de la figure & couleur du précédent; mais plus amples & plus grandes , rrès-odorantes 8c agréables au gout j les fruits lui reflemblent aufli, leur couleur eft moins obfcure Se les grains plus nombreux : il fleurit en été. 11 vient dans le Languedoc ; on le cultive dans les jardins. Vertus des deux Genêts. Ils font apéritifs , diurétiques : la graine à la dofe d'un gros te demi , eft purgative. Le Gêner d'Efpagne pafle pour être plus efficace. PLANCHE 287. Géranium columbinum , Pied de pigeon , Ann. ON fe fert de fes feuilles. La racine eft blanche , branchne. Les tiges s'élèvent de neuf pouces & plus j les feuilles font verd gai. Les fleurs font à cinq pétales , d'un beau pourpre ; il leur fuccede un fruit allongé comme une aiguille , reffemblant au bec dune grue, Pl. 68$, à cinq capfules un peu velues, qui contiennent une graine oblongue , brune : elle, fleurit au printemps* Il vient aux lieux herbus , dans les prés. PLANCHE, 288. Géranium Roberdanum , Herbe à Robert, Ann. ON fe fert de fes feuilles. La racine eft menue, jaune comme le bois du Bais, Pl. 186, Les tiges s'élèvent d'un pied Se plus, velues, rougeâtres t les

The text on this page is estimated to be only 17.27% accurate


i8i INDIGENES. feuilles font velues , vertes , quelquefois routes rouges , d'un odeur de Panais, d'un gout aftringent. Les fleurs font à cinq pétales pourpres, rayées de poiuer' clair -, les fruits reiïemblent au précédent : elle fleurit en été. Toute la plante a une odeur laquelle , quoiqu'aflez forte îi'eft pas défagréable. Elle vient aux endroits inculres , à l'ombre , dans les haies, PLANCHE 2,89. Géranium fanguineum , Bec de grue fanguin , Viy. ON fe fert de fes feuilles. La racine eft épaifle, rouge, branchue, fîbrée. Les tiges s'élèvent d'un pied & demi, rougeâtres, velues^ les feuilles font velues, vertes en deflus, blanchâttes en deffous , d'un gout aftringent, Les fleurs font grandes, à cinq pétales, d'un beau rouge; !ei fruits reffemblent aux précédents : elle fleurit en été. Elle vient dans les bois. Vertus des trois Géranium. Les feuilles de Pied de pigeori font aftringentes intérieurement & extérieurement. Les feuilles de l'herbe à Robert font les plus en ufage ; elles lont vulnéraires , aftringentes , réfolutives , intérieurement & extérieurement. Les feuilles de Bec de grue fanguin font vulnéraires j aftringentes. Idem. PLANCHE 290. Gnaphaliilm , pes câti > Pied de chat,Viv,, ON fe fert de fes rieurs. Les racines font rampantes , fîbreufes. Les tiges s'élèvent de huit à neuf pouces ; les feuilles font verd gai en deftiis , cotonneufes en defTous, Les fleurs font à fleurons pourpres j il leur fuccede une grainG aigretcée ; elle fleurit au printemps. £Ue vient dans l'herbe, aux lieux fées & élevés.

The text on this page is estimated to be only 19.46% accurate

TOMÉ SECOND. igj i iQnaphalium feu impia, Herbe à coton , Ann. On fe fert de toute la plante. La racine eft fibrée & chevelue. La tige s'élève jufquaneuf pouces , droite , blanche, cotonneufej les feuilles font cotonneufes. Les rieurs font à fleurons très-petits } il leur fuccede une naine aigrectée : elle fleurit en été. ° Elle vient dans les champs. Vertus des deux Gnaphalium. Le Pied de chat eft béchique, incralTant, adouciffant, ra^ fraîchiflant, vulnéraire , aftringent, en infufion ou en décoction. L'Herbe à coton eft de peu d'ufage ; on la fubftitue quelquefois au Pied de chat : la dofe en décoction eft une poignée dans deux livres d'eau. 0 PLANCHE 2,91. Gramen loliaceum y Chiendenc , Viv. N fe fert de fa racine. La racine eft longue, rampante, d'un blanc jaunâtre, d'un gout douceâtre , un peu ftiprique. Les riges s'élèvent à deux pieds & plus. Les fleurs font à étamines; il leur fuccede des fruits, conformés à peu près comme ceux du bled : elle fleurit en été. Elle eft commune aux lieux incultes , dans les prés. v — r PLANCHE 2,92* Gramen daclylon , Chiendenc, Pied de poule, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft longue , rampante, blanchâtre, d'un gout douceâtre. Les tiges s'élèvent d'un pied ; les feuilles font velues. Les fleurs viennent dans cinq ou fîx épis, qui s'écartent l'un de l'autre à l'extrémité des tiges ; elles font à étamines ; les fruits qui fuccedenc, reflemblent à ceux de la précédente: elle fleurît «n été,

The text on this page is estimated to be only 10.91% accurate

i$4 INDIGENES. Elle Vient en abondance dans les terreins incultes de nos Pa chauds. ■> Vertus des deux Chiendents. Elle eft apérttive, un peu aftringente , rafraîcIiiflTante , ^ rétique, en tifa n es , bouillons, décoctions. Les deux ci-deff^ ont les mêmes vertus. Elle entre dans le Sirop de Guimauve, des cinq racines ap^, ritives. i INDIGENES.



The text on this page is estimated to be only 16.98% accurate

INDIGENES. Tome III. PLANCHE 293. Gratlola 3 Herbe à pauvre homme, Viv. ON fe fert de toute la plante avec fes racines. Les racines font obliques en terre , garnies de fibres perpendiculaires , blanches. Les tiges font droites , longues d'un pied Se plus ; les feuilles font liftes, fort ameres. Les fleurs font monopétales en tuyau découpé en deux , jaunâtres, 'rayées de lignes brunes; la lèvre d'en bas eft pourpre clair ; il leur fuccede une capfule roufleâtre , partagée en deux loges , remplies de petites graines roufleâtres : elle fleurit en été» Toute _ la plante eft ambre., un peu aftringente. Elle vient dans les prés humides. Vertus. Elle eft très-purgative Hydrngogue, apéritive, vermifuges la dofe eft un gros dans une demi-livre de petit lait ou une poignée de feuilles bouillies dans le petit lait , ou prife en lavement avec le petit lait. Extérieurement les feuilles fraîches font confondantes , déterfives. PLANCHE 2.94. Grojfularia , Grofeiller blanc épineux. ON fe fert des fruits. C'eft un arbrifteau qui s'élève de trois pieds &c plus/ La racine eft ligneute, fibreufe. Ee bois eft jaune pâle; il eft garni d'une, deux ou trois fortes épines à l'origine des feuilles; les feuilles font verd foncé, loifan tes en dsffiis, plus claires en delfous, un peu velues, d'un gout acide, M

The text on this page is estimated to be only 17.63% accurate

£ ' ■:' iU INDIGENES. Les fleurs font à cinq .pétales d'un verd blanchâtre, d'u^ odeur agréable , un peu forte; il leur fitccede un fruit ou baie jaunâtre, ronde, groife comme un grain de raiiîn, pleine de fnc d'un gout doux & vineux, qui contient plusieurs graines blanchâtres : il fleurit au printemps. Il vient dans les bois & haies ; on le cultive dans les Jardins fruitiers. GroJJularia ribes , Grofeiller rouge. On fe feft de fes fruits. C'elt un arbriffeau qui s'élevc jufqu'à trois pieds, La racine elt branchue , fibreufe , d'un gout aftringenr. Les tiges font couvertes d'une écorce brune ; le bois eft verd êc moelleux. Les feuilles font lifles, verd foncé en défais, duvetées Se blanchâtres en deflous , d'un gout âcre : il fleurit au printemps. Les fleurs -font à cinq pétales purpurins \ il leur fuccede un fruit ou baîe , groife comme un pois , rouge , ronde , remplie *Tun fuc acide agréable, contenant plufieurs petites graines. PLANCHE 295-. Grojfularia nigra > Gains , Grofeiller noir. ON fe lert de fes feuilles. C'eft un arbrifleau qui s'élève de trois à quatre pieds. Les feuilles font un peu velues en deflbus , d'une odeur &• fagréable. Les Betirs reflemblent à celles du Grofeiller épineux ci-defTus, d'une odeur forte & défagréable; il leur fuccede des baies noires, acides , d'un gout peu agréable : il fleurit au printemps. Il vient en Touraine; on le cultive dans les Jardins. Vertus des trois Grosetllers. Les fruits du premier, avant leur maturité, font rafraîchit fants , aftringents. Les fruits du fécond font modérément aftringents, tempérants , ftomachiques. Les feuilles du troifiçme font alexitaires , contre la rage, m

The text on this page is estimated to be only 15.07% accurate

TOME TROISIEME. H. PLANCHE 2.96. lîedera terrejiris , Lierre terreftrê , ViW ON fe fert de toute la plante. 5 La racine eft fibrée. Les tiges font quarrées , velues , les unes rampantes , prônant racine de diftance en diftance , au moyen de fibres qui entrent en terre , d'autres s élèvent de cinq à fix pouces ; les feuilles font un peu velues. Les fleurs font monopétales en gueule , bleues j il leur fuccede quatre graines. Mes au fond du calice : elle ■ fimrit au printemps. Toute la plante a une odeur forte aromatique , de un goût amer. Elle vient dans les bois, dans les prés. Vertus. Elle eft apéritive, difcuflîve, déterfïve, vulnéraire : la dofe en poudre eft depuis un demi-gros jufqii a un gros ; le fuc de* puis deux onces jufqu'à trois. Extérieurement elle eft vulnéraire > déterfïve. ' " .III^M».- ■ . PLANCHE 297. Heîianthemum , Herbe d'or, ViV. ON fe fert de fa racine & feuilles. La racine eft Ugneufe, blanche. Les tiges fe couchent fur terre de ont jufquà neuf pouces de long, velues j les feuilles font vertes en defïus, blanches en deflous. Les fleurs font à cinq pétales jaunes \ il leur fuccede un fruîe a trois angles , qui contient quelques graines roufles ; elle fleurit en été. Elle vient aux lieux fecs incultes, Ma

The text on this page is estimated to be only 18.43% accurate

lîss INDIGENES. Vertus, Elle eft vulnéraire, aftringente, intérieurement & extérieq rement. PLANCHE 2,98. Hefiantkemum tuhcrofum f Topinambours, Viv. ON fe fert de fa racine. Les racines font rampantes , garnies de plufieurs fibres capillaires & d'autres fibres longues ; de ces dernières , ainfi que du corps de la racine , il fe forme quantité de grolfeurs inégales , femblables à des truffles , rouifeâtres en dehors , blanches en dedans , quelquefois groifes comme le poing , qui pro. duifent de nouvelles plantes. Les tiges s'élèvent jufqu'à dix pieds, cannelées, velues, rii. des, moé'lleufes en dedans; les feuilles font verd pâles, rudes. Les fleurs font radiées jaunes-, il leur fuccede de petites graines noires : elle fleurit en automne. On la cultive dans les Potagers. Vertus. Elle eft adouciflante , béchique. PLANCHE 2,99. Heliotropium , Herbe aux verrues , Ann. ON fe ferr de toute la plante. La racine eft menue , dure. La tige &c fes rameaux s'élèvent d'un pied , moelleux , un peu velus , verd blanchâtre \ les feuilles font velues & de même couleur. Les fleurs font monopétales en entonnoir découpé en dix, blanches ; il leur fuccede quatre graines au fond du calice : elle fleurit en été. Elle vient dans les champs , dans les terres labourées. Vertus. Extérieurement elle eft vulnéraire , déteriîve,

The text on this page is estimated to be only 19.66% accurate

TOME TROISIEME. ,s9 PLANCHE 3O0. ffepatîca lichen , Hépatique commune, Viv. ON fe fert de toute la plante.. Les racines font capillaires très-fines. Les feuilles viennent à plate terre, larges d'un doigt, d'un verd un peu jaunâtre en deflus , garnies de points relevés. 11 s'élève de diftance en diftance fur les feuilles, un petit pavillon rond , au-deflous duquel pendent les fleurs mâles à éramines ; cette tète devient roulfe : de petites taries vertes qui croiffent aufli çà Se là fur les feuilles, contiennent dans leur fond plufieurs petites graines. Elle vient dans les pierres, dans les fentes des rochers humides, le long des eaux. Vertus et Usages. Elle eft hépatique , inciiîve , défobftruante , déterfive , aftringeiue, confondante : la dofe eft une poignée dans les bouillons. Extérieurement elle eft vulnéraire , aftringente. Elle entre dans le Sirop de Chicorée fimple & compofé. PLANCHE 301. Hepatica nobilis , belle Hépatique, Viv. ON fe fert de toute la plante. Les racines fe divifent en plufieurs têtes, garnies défibres capillaires noirâtres , qui s'entortillent l'une avec l'autre. Les fleurs paroilfent au Printemps avant les feuilles. Les fleurs s'élèvent fur des pédicules de cinq pouces de haut j elles font à fix ou huit pétales , ou bleues , ou couleur de chair , ou blanches ; il leur fuccede une petite tète , fur laquelle font entaflees nombre de petites graines pointues. Les feuilles font velues, verd foncé en derius, plus claires 8c quelquefois purpurines par deflous. On la cultive dans les Jardins Fleuriftes. Vertus. Elle eft rafrafchiffante, aftringente, delllcative , fortifiante. M }

The text on this page is estimated to be only 17.78% accurate

INDIGENES. PLANCHE 302. Herba paris , Railin de renard, Viv. ON fe fert de toure la plante. La racine eft menue , longuette , & rampe obliquement en terre. La tige s'élève d'un demi-pied & plus; elle eft terminé par quatre feuilles en croix, d'un verd foncé en défais, luifantes en deiïbus. Du centre de ces feuilles s'élève un pédicule, qui foutienc une fleur à quatre pétales verdâtres; il leur fuccede un fruit ou baie molle , pourpre foncé , à quatre loges , qui contient de petites graines noires : elle fleurit au printemps. Elle vient aux endroits incultes , dans les buiflons. Vertus. Extérieurement elle eft vulnéraire, adouciffante. PLANCHE 303. Herniaria, Turquette, Ann. ON fe fert de toure la plante. La racine eft menue , profonde en terre. Les tiges s'appliquent contre terre ; elles ont environ quatre pouces de long. Les feuilles font verd-jaune, d'un gout acre. Les fleurs font jaunâtres à étamines j il leur fuccede une petite graine noire , luûante : elle fleurit en été. Elle vient dans les campagnes , dans les grains , aux lieux fecs. Nota. Qu'il s'en trouve de toutes velues & d'autres qui ne le font point 3 mais cela ne fait pas différentes efpeceSj ce n'eft qu'une variété. Vertus. Elle eft aftringenre , diurétique , adouciffante ; fa grande vertu eft pour les defeentes : la dofe en poudre eft un gros ; l'infufîon eft une poignée dans une livre de liqueur, dont on fait prendre iîx ou huit onces. Extérieurement elle eft vulnéraire , aftringenre.

The text on this page is estimated to be only 15.97% accurate

TOME TROISIEME, i?i PLANCHE 304. Hordeum Orge , Ann. IL y a deux efpeces d'Orge, l'Orge d'hiver appeltée Efcourgeon; celle-ci eft bij "annuelle y c'eft- à-dire , qu'elle poulie fes premières feuilles en automne & ne monte en graine qu'à la fin de l'été de l'année d'enfuite ; l'autre fe feme au printemps de monte en graine en été. On fe fert de la graine delà première préférablement. La racine eft compofée de beaucoup ae petites racines fibreufes. La rige s'élève d'un pied & demi & plus, verd clair, ainû" que les feuilles. Les fleurs font à étamines , fortant d'un calice terminé par un long filet barbu, rude & piquant. L'embrion fe change en une graine longue , pâle , farineufe ; la' graine de l'Orge d'hiver eft plus plate, plus allongée, & le filet moins long. On les cultive dans les campagnes. Vertus. La farine eft une des quatre farines réfolutivcs. L'Orge étant "bouilli eft humectant, & rôti il eft deflicatif. PLANCHE 305. Hormïnum , Orvalle toute bonne, Ann. ON fe ferr de toute la plante. La racine eft ligneufe , brune , fibrée , d'un gout allez agréable , un peu fort. La tige s'élève de trois pieds, moëlleufe, quarrée, velue ; les feuilles font vifqueufes , velues, d'une odeur vive Se pénétrante. Les fleurs font monopétales en gueule , bleuâtres ; il leur fuccede quatre grottes graines arrondies , roufleâtres au fond du calice : elle fleurit en été. Toute la plante a une odeur forte 6c un gout amer.

The text on this page is estimated to be only 12.53% accurate

lS!X , INDIGENES. On la cultive dans les Jardins. Vertus et Usages. E"e eft hyftérique, antifpafmodique , ophtalmique Son fuc encre dans l'Emplâtre DiaLanurn. q * PLANCHE 306. Hyofciamus niger, Hann&ane, B. An*. fe fert de fes feuilles , fleurs & -raines Us fleurs font monopétales en entonnoir découpé en dnn jaunâtres a leurs bords, marquées de veines pourprées ni! ; foncées & noirâtres au fond de l'entonnoir: il eur Wdet ^e^emoH d^',^^ ^ calice rempli de piufieurs petites graines arrondies cendrées à une odeur narcotique déTagréable : elU fleurir ' ' J oute la plante a une odeur forte & alToupiûW. iUe vient aux endroits incultes, près des Wures, PUNCHE 307. Hyofciamus albus, Jufcjuiamc blanche, B. Ann. Eue plante_ ne diffère delà précédente, que parce qu'elle eft plus petite, que fes feuilles ont un duvet plus épais Se plus blanc, que fes fleurs font blanches & fes graines plus pales. tue vient dans le Languedoc j on la cultive dans les Jardins ce Botanique. Vertus et Usages des deux Jusquiames. La jufquiame tant noire que blanche, doit être bannie de 1 intérieur a caufe de fes mauvais effets , qui font de troubler le cerveau & de caufer la manie & le délire ; mais appliquée excalmante11"6"1 ^molliente , réfolutive , raffâichilfante, Les feuilles entrent dans l'Onguent Populeum; les graines

The text on this page is estimated to be only 19.29% accurate

TOME TROISIEME. 1$, dans l'antidole nommé Requies, le Philonium Romain ,1e grand pbilomum, le Triphera magna, les Pilules de Cynogloffe, les Xrochil'ques d'Alkekenge. PLANCHE 308. Hypericum 3 Milpcmiis ^ Viv. ON fe fert de fes feuilles , fleurs & graines. La racine eft. ligneufe, nbreufe, jaunâtre. Les tiges s'élèvent de deux pieds , droites , rougeâtres ; les feuilles regardées au travers du jour, paroilfenr percées de plusieurs petits trous; mais ces prétendus trous font de petites vélicules remplies d'un fuc huileux , clair & tranfparenc ; elles ont un gour ftiprique , un peu amer. Les fleurs font à cinq pétales jaunes; on voit quelques points noirs à l'extrémité de chaque pétale : elle fleurît en été. Elle vient dans les campagnes , dans les bois. Vertus et Usages. _ Elle eft vulnéraire, déterfive, refolurive, diurétique, hyftérique : la dofe des fommités fleuries , en infuiîon ou en décoction, eft une poignée & un gros des feuilles & graines. Extérieurement elle eft vulnéraire, déterfive, confondante, adou cillante. Elle entre dans le Sirop anrinéphrétique , apéritif, cachectique, d'Armoife , la Poudre de Palmarius, la Thériaque , le Mithridate, l'Huile de Scorpion compofé, l'Onguent Martiatuni, le Mondificatif d'Ache, l'Eau vulnéraire de Pénicher. PLANCHE 309. Hyjfopus , HyfTope, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft de la groffeur du doigt , dure , fibrée. Les tiges s'élèvent d'un pied & demi j les feuilles font liffes , verd foncé , d'une bonne odeur , d'un gout acre. Ees fleurs font monopétales labiées , bleues ; il leur fuccede quatre petites graines arrondies , brunes, au fond du calice : elle Mrit en été.

The text on this page is estimated to be only 16.02% accurate

i?4 INDIGENES, Toute la plante a une odeur forre , aromatique & un acre. b ^ Vertus et Usages. Elle eft incifive, pectorale, ftomachale, en infufion ott €iJ déco&ion. Elle encre dans le Sirop compofé deMefvé, d'Armoife, an tiafthmatique. J. PLANCHE 3IO. Jacea nigra, Jacée , Viv. ON fe ferr de fes feuilles & fleurs. La racine eft épailfe , fibrée , d'un gouf fade , aftringenc. La tige s'élève d'un pied & demi & plus, velue, cannelée, moclleulè; les feuilles font verd foncé. Les fleurs font à fleurons , fortant d'une tête écailleufe ; il leur fuccede de petites graines oblongues, d'un gris noir, aigrettées: elle fleurit en été. Elle vient dans les prés & aux lieux incultes , parmi l'herbe, Vertus. Elle eft vulnéraire , déterfive > mais elle eft rarement d'ufage parmi nous. PLANCHE 311. Jacobœa , Herbe de faine Jacques , B. Ann. ON fe fert de la plante. La racine eft garnie de nombre de grofles fibres blanchâtres. La tige s'élève à trois pieds de haut, droite, cannelée en lifle ou un peu cotonneufe , quelquefois purpurine ; les. feuilles font litres, verd foncé en demis. Les fleurs font radiées jaunes j il leur fuccede une graine très-menue, rougeâtre, aigrettée : elle fleurit en été. Elle vient dans les champs , dans les prés.

The text on this page is estimated to be only 20.04% accurate

TOME TROISIEME. I5J Vertus. Elle eft vulnéraire, déterfive ; nous nous en fervons rarement. PLANCHE 312. Juglans , Noyer. ON fe fert de fes fruits , nommés Noix. C'eft un grand arbre. Les racines font fort longues , nombreufes • l'écorce du tronc eft épaiife , cendrée, liife ; le bois eft folide, roux ondé ; les feuilles font liifes , d'un beau verd, d'une odeur qui rire fur celle du laurier; mais plus vive. Les rieurs mâles ouftériles, font des chatons qui viennent en incnie-temps que les feuilles , au printemps; ils font longs , à étamines jaunâtres; les fruits viennent à part, deux ou trois fur la même tige ; chaque fruit mûr eft compofé d'une écorce épaiffe, verte en dehors, blanchâtre en dedans, amere, un peu acre, qui enveloppe une coque dure, ridée, laquelle renferme une amande inégale , rortueufe , douce , agréable , couverte d'une pellicule amere , acre , défagréable ; le fruit entier vient de la grodeur d'une prune ou plus gras. On cultive cet arbre dans les Vergers. Vertus. Les Chatons fonrémétiques : la dofe de leur Poudre eft depuis un demi-gros jufqu'à un gros; le fuc de l'écorce du fruit eft aftringent ; l'huile du fruit a les mêmes vertus que celle d'amandes douces, Pl. 141. La dofe eft depuis une once jufqu'à deux. K. PLANCHE 313Keiri, Giroflier jaune,, Viv. ON fe fert de fes fleurs , feuilles 8c graines. Les racine^ font nombreufes, blanchâtres. Les riges s'élèvent d'un pied & demi de plus ; elles font blan

The text on this page is estimated to be only 17.15% accurate

Î9f INDIGENES. châtres- les feuilles font verdâtres en deflbus, d'un o0itt peu acre. & U!! Les fleurs font à quatre pétales jaunes , dune odeur aoré, ble , d'un gout un peu âcre &: amer ; il leur fuccede des jw les longues, plates, partagées en deux loges garnies de graineé rondes, ronfles, d'un gour acre Se amer: elle fleurit au temps. r Elle vient fur les rochers , fur les murailles. Vertus. Elle eft incifive, hyftérique, adoucifTante : la dofe eft une poignée mfuféedans une livre devin; ou en décodtion, dans l'eau; la dofe de la graine eft d'un à deux gros. PLANCHE 3 14. Lacluca capitata 3 Laitue pommée, Ann. iN fe fert de route la plante. La racine eft longue, épaifle , fibrée. La tige eft épaifle; elle s'élève de trois pieds, laiteufe , amere; les feuilles font liftes, verd-pâle, Iaiteufes ; elles forment d'abord une tête ou pomme comme le Chou , Pl. 17S. Les fleurs font à demi-fleurons jaunâtres ; il leur fuccede de petites graines noires aigrettées : elle fleurit en été. On la cultive dans les Potagers. O PLANCHE 31 J. Lacluca romana , Laitue romaine , Ann. . 1 Ette Laitue ne pomme point ; d'ailleurs il eft facile d'en » voir la différence avec la première , dans l'eflampe. Les fleurs Se graines font tout à fait femblables.

The text on this page is estimated to be only 17.44% accurate

TOME TROISIÈME, PLANCHE 31 6. Lacluca fylvejîris , Laitue fauvage, Ann. LA racine de celle-ci eft plus petite & plus courte ; les feuilles font bien différentes : voye% Uejlampe. La nervure ou coton du milieu de chaque feuille, eft garni en delfous d'un rang d épines un peu rudes j les fruits & graines font en tout pareils aux deux premières. Elles s élèvent toutes trois à la même hauteur. Celle-ci vient indifféremment en tout terrein. Vertus et Usages des trois Laitues. La graine eft une des quatre petites femences froides. Les Laitues font rafraîchiflanres, humectantes, laxatives , émollientes. La Laitue fauvage eft plus apéritive & déteriive. PLANCHE 317. Lamium archangelica, Ortie morte blanche, Viv. ON fe fert des feuilles & fleurs. La racine eft nombreufe , fibreufe, répandant à razeterre plufieurs rejetrons. Les tiges s'élèvent de plus d'un pied , quarrées , creufes , un peu velues ; les feuilles le font davantage. Les fleurs font monopétales en gueule , blanches ; il leur fuccede quatre graines triangulaires au fond du calice : elle fleurit en été, ainji que les fuiyantes. Elle vient aux lieux incultes. PLANCHE 318. Lamiitm purpureum non fœtens , Ortie morte rouge , Viv. CElle-ci ne diffère de la précédente , que parce qu'elle devient un peu plus haute Se que fes fleurs font rouge pourpre.

The text on this page is estimated to be only 17.52% accurate

INDIGENES. | L PLANCHE 319. Lamium fœtidum , Ortie morte puante. A racine eft menue, fibreufe, non rampante. Les tiges ne s élèvent que d'un demi-pied , quarrées crei f Les fleurs font petites, monopétales en gueule, pourpré^.' la lèvre inférieure eft marquée détaches noires; il leur ftcced' quatre graines triangulaires , brunes, luifantes , au fond du calic Ô Toute la plante fent mauvais* Elle vient comme les précédentes , aux lieux incultes. Vertus des trois Orties mortes. La blanche eft apéritive, béchique, aftringente , confondante» en infufion , en bouillons. La rouge a les mêmes vertus ; mais elle eft peu en ufage. La puante eft vulnéraire, réfolutive, adouciflànte ; d'ailleurs on la fubftîcue quelquefois aux précédentes. PLANCHE 32,0. Lampfana , Herbe aux Mamelles , Ann. ON fe fert de toute la plante. La racine eft blanche, dure, fibreufe. La tige s'élève de trois pieds, cannelée, creufe , rougeârre, avec quelques poils. Les feuilles font velues. Les rieurs font à demi-fleurons jaunes ; il leur fuccede une capfule cannelée , remplie de petites graines noirâtres , pointues . fans aigrettes. La plante eft remplie d'un lait amer : elle fleurît en été. Elle vient aux lieux incultes. Vertus. Extérieurement elle eft rafraîchiiïante , émolliente , détective; cependant elle eft peu en ufage.

The text on this page is estimated to be only 19.89% accurate

TOME TROISIEME. l99 PLANCHE 32,1. Lapathum. hortenfe , Patience de jardin, Viv. ON fe fert des feuilles. La racine eft droite en terre, longue, fibreufe, jaune en dedans. La tige s'élève à la hauteur d'un homme , cannelée. Les fleurs font à étamines ; il leur fuccede une graine triangulaire dans le calice : elle fleurît en été. Ou la cultive dans les Jardins. PLANCHE 322. Lapathum , Violon , B, Ann. ON fe fert de fes feuilles. La racine eft épaifle. La tige s'élève d'un pied & demi j les fleurs & fruits comme la précédente : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes. Vertus des deux Latathum. Elles font émollientes, rafraîchiflantes , Iaxativesj mais de peu d'ufage. PLANCHE 323. Lapathum fanguineum , fang de dragon , B. Ann. ON fe fert de fes feuilles & graines. Elle reifemble alfez à la Patience de jardin, ci-deffusj mais elle ne s'élève guères que de trois pieds. Ce qui diftingue celle-ci principalement de toutes les Patiences . eft la couleur rouge de fes tiges , queues & veines des feuilles s & le fuc rouge dont elle eft remplie : elle fleurit en été. On la cultive dans les Jardins de Botanique.

The text on this page is estimated to be only 17.07% accurate

zoo INDIGENES. V E R T U S. Elle eft laxative , émolliente, rafraîchifïante. La graine eft aftringente , fortifiante : la dofe en poudre eft jufqu'à un gros. PLANCHE 324 Piretrum 3 Piretre, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft lignéufe , fibreufe , blanche 5 d'un goût acra Qc piquant. Les tiges &c rameaux s 'élèvent de deux pieds & plus, blancs, ligneux; les feuilles d'un verd bleuâtre. Les rieurs font radiées , le difque jaune , la couronne blancheil leur fuccede des graines applaties , bordées d'un feuillet tranchant : elle fleurie en été. Elle vient aux Illes Canaries. Vertus et Usages. Elle eft mafticatoire , dentifrice. Elle entre dans le Philonium Romain, la Poudre fternuta» toire de Charas. Rhaponticum, Rhapontic, Viv. On fe fert de fa racine. La racine eft ample, oblongue, branchue, brune en dehors, d'une odeur allez agréable , d'un gout amer un peu allongeât* La tige s'élève à un pied & demi ou plus, cannelée, çteufe. Les fleurs font monopétales en cloche , découpées en cinq on fix , blanches ; il leur fuccede une graine triangulaire , longue de deux lignes : elle fleurit au printemps. Elle vient dans la Scytie , dans la 1 hrace ; on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. Elle eft purgative , aftringente plus que la Rhubarbe : la (lofe en poudre eft jufqu'à un gros ou demi-once, & en infufion ou décoétion depuis demi-once jufqu'à fix gros. _ _ Elle entre dans la Poudre Diarrhodon abbatis, Diatnon lantalon , la Thériaque d'Andromaque l'ancien. pLANCHE

The text on this page is estimated to be only 16.10% accurate

TOME TROISIEME; m PLANCHE 3 2 J* lapathum folio acuto piano, Patience fauvagc, VivJ ON fe fert de fes feuilles & racines, La racine eft plongée avant en terre, épaifTe s brune erï dehors, jaune en dedans. Les tiges s élèvent d'un pied & demi , cannelées, légèrement velues, rnoiflleufes; les feuilles font lifles. Les fleurs & graines font femblables aux précédentes â Pl. jztj & fui van tes. Les graines font couleur de Châtaigne. Lapathum folio minus acuto , autre Patience, VivV Celle-ci reifemble en tout à la précédente ; les feules différences font que fes feuilles font un peu plus larges Se leur pointa moins allongée , que la capfule qui entoure la graine eft deritelée par les côtés 3 & que la graine eft du double plus °-roffa & d'un châtain plus pâle. PLANCHE 3 lapathum folio crifpo , Patience frifée, Viv» ON fe fert de fes feuilles & racines. Elle eft femblabie aux précédentes; les différences fâ voient dans l'eftampe, qui font que les feuilles font frifées i quet la capfule qui couvre la graine n'eft point dentelée , la précédente étant la feule qui l'air dentelée , & que la graine eft châtain foncé. PLANCHE 327. Lapathum aquaticum , Patience d'eau, Viv. ON fe fert de fes feuilles & racines. La racine eft fibreufe > noire en dehors % couleur de buis «11 dedans , d'un gout amer très-aftringent* Les tiges s'élèvent jufqu'à cinq pieds ; les feuilles ont un gous un peu acide 3c fort aftringent. N

The text on this page is estimated to be only 16.68% accurate

loi INDIGENES. Les fleurs & Fruits reffemblent à toutes les Patiences décrites çi-ddius. Elles viennent toutes dans les lieux incultes, dans les prés : elles fleurirent toutes en été. Cette dernière vient au bord des folles , dans l'eau , dans les marais. Vertus des quatre Patiences sauvages. Elles font toutes laxatives, apéririves , un peu aftringentes, bonnes contre toutes les maladies de la peau : la dofe des feuilles 8c racines fraîches ou feches , eft une ou deux onces en infufioir. Les feuilles vertes font vulnéraires , deflicarives. Extérieurement toutes les parties de la Patience d'eau 8c fut. tout la racine , font trcs-aftringentes , agglutinatives , légèrement déterfives. La Patience crêpée entre dans l'Onguent Martiatum. PLANCHE 328. Lapathum fpinacia mas, Epinard mâle, Ann. ON fe fert de Tes feuilles. La racine eft menue, peu fibrée , blanche. Les tiges s'élèvent d'un pied, cteufes, cannelées. Celui-ci, qui devroit être appellé la femelle, ne porte quê des fleurs fans étamines ou plutôt des embrions , plufieurs enfemble , qui deviennent des fruits un peu gros , ovales , garnis ■d'épines fur un pied ou liffes &c fans épines fur un autre. r - - — — « PLANCHE 329. Lapathum fpinacia fœmina , Epinard femelle , Ann. CEtte plante d'Epinards , donr l'eftampe fait voir les différences avec la précédente, doit naturellement être le mâle *, car il eft ftérile &c ne porte que des fleurs à étamines ; il Jleurïi en été. On cultive les Epinards dans les Jardins Potagers. Vertus, Leurs feuilles font rafraîchiffantes , cmollientes, pectoralefj laxatives.

The text on this page is estimated to be only 14.62% accurate

TOMÉ TROISIEME. l0. PLANCHE 330, Lavendula major > Afpic., ViVi ON fe fert de fes forhmités fleuries , graines , feuillesi La racine eft dure , fibrce. Larige Si les jers font ligneux; ils s'élèvent jufqu'à trois pieds ; ils font quarrés j les feuilles font verd très-clair , d'unei odeur forte & agréable , d'un gout amer. Les fleurs vont monopétales en gueule, bleues; il leur fuc* cède quatre graines au fond du calice : elle fleurit en été. PLANCHE 331. Lavendula minor, Lavande, ViVs ELle refièmble beaucoup à la précédente; les différences fonr; qu'elle efl plus petite , que les feuilles font plus vertes &t leur odeur moins forte , les fleurs plus grandes : elle fleurit > tn été. On les trouve quelquefois toutes deux à fleurs blanches. Elles viennent dans le Languedoc j on les cultive ici dans les Jardins. Vertus et Usages des deux Lavandes. Elles font céphaliques, nervines, hyftériques : la dofe des fleurs en poudre ou des graines pilées , efl depuis un fcrupule lulqu'a un gros. On prend aufiï les fleurs en infufion , comma le Thé. Extr 'cieurerhent les fleurs & feuilles fonr mafticatoires. Elles entrent dans la décodtion céphalique , le Sirop antiépî-. .«ptique , de Staeehas , la Poudre céphalique , odorante. PLANCHE 332. Laureola mas^ Latiréole, ViV* r\N fe fert de fes feuilles & fruits ou baies. fa racine eft épaifle, longue, ligneufe , fibreufe. Les tiges s'élèvent à trois pieds ; elles fort: couvertes d'uni? N 1,

The text on this page is estimated to be only 19.60% accurate

io4 INDIGENES. écorce cendrée ; les feuilles fonc verd noir , vertes toute l?a& née, liftes, luifantes. Les fleurs font monopétales en tuyau découpé en quatre verd jaunâtre j il leur fuecede un fruit ou baie raillée en Olive* mais bien plus petite, noire, fucculente, renfermant un périt noyau dur, dans lequel eft une amande blanche : elle fiwn (LU printempsToute la plante eft âcre , brûlante , cauftique. .Elle vient dans les bois, fur les montagnes , en Languedoc, p — ■ ' ' — PLANCHE 3 3 3* Laureola fœmina, Bois gentil, VivLA racine eft ligneufe , fîbreufe. Les tiges font ligneufesj elle a deux écorees ; l'extérieure -eft mince , cendrée j l'intérieure eft verte en dehors , blanchâtre en dedans j les feuilles font verd moins foncé que la précédente 8c tombent tous les ans. Les fleurs font de même en tuyau , mais plus court , purpurines-, elles viennent avant les feuilles : elle fleurit en hiver. Les baies qui leur fuccedent, font d'un rouge de Cei'ife & rondes. La plante eft âcre •& brûlante comme la précédente. Elle vient dans les bois froids des Alpes , des Pyrénées, dans la Bourgogne. Vertus des deux L auréoIe s. Elles ont les mêmes vertus ; elles font purgatives , vomitives, violentes & dangereufes, c'eft pourquoi on s'en fert rarement. Extérieurement en feton à l'oreille , la racine du Bois-gentil eft ophtalmique. PLANCHE 3 34Laurus } Laurier franc. N fe fert de fes feuilles , fruits ou baies. C'eft un arbrifteau. La racine eft épaiffe , oblique en terre, inégale; o

The text on this page is estimated to be only 17.51% accurate

TOME TROISIEME. 105 Le tronc eft couvert d'une écorce-mince , le bois eft. peu compact) les feuilles reftent toute Tannée vertes elles, font verd foncé , trèsrodorantes , d'un gout acre , aromatique un peu amer. Les fleurs font monopérales découpées en quatre ou cinq, blanc jaunâtre ; il leur fuccede un fruit ou baie noire , ovale , «roffe comme une petite Cerife , qui contient une coque dure , laquelle renferme une graine, d'un roux noir , odorante , acre, un peu amere : il fleurit en été. Il vient dans les forêts des pays chauds, fur les montagnes, enEfpagne, en Italie, en Provence. Vertus et Usa g e s,. Les feuilles font digeftives , rcfolutives , ftomachiques--, car-1minatives ; la dofe en poudre eft jufqu'à un gros, en infulion comme le Thé. Les baies font ftomachiques , fpléniques, hépatiques, diurétiques , hyftériques : l'huile des baies eft adoucilfanre , fortifiante , extérieurement. Les feuilles entrent dans l'Emplâtre de Bétoîne. L'huile de Laurier entre dans l'Emplâtre manu* Dei3 de Paracelfe , de Grenouilles, Stiptique de Charas. PLANCHE 33 %' Lentille, Ann. ON fe fert des graines. La racine eft blanche, menue, peu fîbréè... La tige s'élève de neuf à dix pouces , foible j la côte , fur laquelle les feuilles font rangées , fe termine par une main ou vrille , qui s'accroche aux corps voifins ; ces vrilles alors foutiennent la plante. Les. fleurs font petites, légumineufes, blanchâtres, mêlées de lignes bleues; il leur fuccede une gouife courte,, remplie de deux ou trois graines allez, grolfes ». plates , dures , hfles , jaunâtres ou rougeâtres. On appelle celles-ci, Lentilles à la Reine. Il y en a une efpece dont le fruit eft plus gros, qu'on appelle grande Lentille, fembkble en tout à la précédente , excepté que N }

The text on this page is estimated to be only 16.52% accurate

xo6 INDIGENES. Ja plante eft plus grande , que la fleur eft plus blanche, & fril\ deux ou trois fois plus gros. " On les cultive dans les champs : elles fleurirent en été. Vertus. On s'en fert plutôt en aliment, qu'en remède, PLANCHE 33^LentlculcL palujlris , Lentille d'eau , Ann, ON fe fert de la plante, C'eft une plante tout à fait aquatique , qui nage fur [a fur fa ce de l'eau. Elle ne conufte qu'en quatre ou cinq feuilles, qui enjambent l'une fur l'autre comme collées enfemble, de l'envers defquelle$ part un filet long , très-fin , terminé par un petit tubercule allongé, qui pend dans l'eau. Les fleurs font à étamines j (on les voit beaucoup groflies dans J'eftampe) elles s'élèvent entre deux feuilles \ la petite capiule qui leurfuccede, enferme quelques menues graines: die fleurît en été. Elle vient dans les eaux dormantes , dont elle couvre quelquefois toute la furface. Vertu s. Extérieurement elle eft incilîve, réfolutive , rafraîchifTante., çalmanre. PLANCHE 337* Lepidium 3 PalTerage , Viv, ON fe fert de fa racine & feuilles, La racine eft groffe du doigt, blanchâtre, rampante, d'un gout piquant qui ne dure guères. La tige s'élève de trois pieds , liiTe , moelleufe , couverte d'une; pouffiere verd de mer, qui tient peu \ les feuilles font Jilfes, verd foncé. Les fleurs fonr à quatre pétales blancs, très-petites; il leur fucçede un très-petit fruit , pointu, applati ^ partagé en deux

The text on this page is estimated to be only 17.89% accurate

TOME TROISIEME. io7 lo^es , remplies de menues graines rouffes : elle fleurit en été. "Toute la plante a un gout âcre , aromatique. Elle vient aux lieux incultes. . ■ ■ ■ * PLANCHE 338Lepidium iberis , Paiïerage fauvage, VlV. ON fe ferr de fes racines. La racine eft ligneufe , blanche , peu fibrée. La tige s'élève d'un pied & demi , dure , creufe. Les fleurs , fruits & graines refletnblenr à la précédente i elle fleurit en été. Toute la plante a une forte edeur de Greffon. Elle vient aux lieux incultes & le long des chemins. Vertus et Usages des deux P a s s e r a g e s. Elles ont les mêmes vertus -, elles font antifcorbutiques , incifives, défobftruantes , ftoraachiques. Extérieurement elles font adouci [Tantes. PLANCHE 339' Levijlicum i Livêche, Viv. ON fe fert de toute la plante , fur-tout de la racine $C graines. La racine eft épauTe , noirâtre en dehors, blanche en dedans. Les tiges viennent à la hauteur d'un homme , cannelées % cfeufes y les feuilles font luifantes , verd foncé , dune odeur forte. Les fleurs font en parafol jaunes j il leur fuccede deux graines accollces afTez groifes , cannelées , brunes : elle fleurit en été. Toute la plante a une odeur forte aromatique , la graine l'a encore plus forte. On la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. Elle eft carminative, diurétique, utérine, vulnéraire, alexitaite ; ladofe de la racine en poudre eft jufqu'à un demi-gros ou un gros. La graine fe donne, depuis un fcrupule jufqu'à un demi-gros. 0 N4

The text on this page is estimated to be only 14.80% accurate

INDIGENES. Extérieurement elle eft vulnéraire. Elle entre dans le Sirop d'Armoife de Fernel, dans l'F», plâtre Diabotanum. ^ PLANCHE 340, Lichen arboreus , Pulmonaire de chêne. Ette plante eft toute plate & comme collée fur 1 ecorce da Vérone des vieux Chênes Hêrres, Sapins, &c. On la trouve SUffi for les rochers, al ombre; elle eft blanchâtre endelW ■verte par deflus ; elle a quelque relïèmblance avec l'HépatioM commune Pl. 300, par l'entrelaftcmenc de fes feuilles 1 lont aufii découpées, mais plus irrégulièrement. ^ Les rieurs 8c traits ne font pas apparents. Vertus. Elle eft deffícative, aftringente , béchîque : la dafe en poudre ft jufqua un gros; la décodtion ou l'infnfion jufqu'à fix onces. PLANCHE 341 Ligufikum, Sefcli, Viv, ON fe fert de fa graine. La racine eft groûe du doigt, s'enfonce avant en terre, blanche, chevelue à fon origine, odorante. Les tiges s élèvent à la hauteur d'un homme. Les rieurs font en parafol blanches • il leur fuccede deux graines accollées allez greffes, oblongues, cannelées profondément, dun gout acre, amer, aromatique -.elle fleurit en été. Elle vient dans nos pays chauds : ou la cultive dans nos Jarflins de Botanique. Vertus et Usages. Elle eft incifive, ftomachale, diurétique, hyftérique, carfninarive ; la dofe de la Poudre eft jufqu'à un demi-gros, iafuiee dans le vin. Elle entre dans l'Ele&uaire de baies de Laurier.

The text on this page is estimated to be only 18.30% accurate

TOME TROISIEME. PLANCHE 342Ligujlrum , Troène. ON fe fert de fes feuilles , fleurs Se fruits. Ceft un grand arbrilfeau. La racine fe répand obliquement en terre , de côtés &: d'autres. L'écorce eft cendrée , le bois dur & blanchâtre \ les feuilles font d'un beau verd. Les fleurs font monopétales en entonnoir découpé eu quatre , blanches , d'une odeur agréable ; il leur fuccede un fruit ou baie molle prefque ronde , grofTe comme un grain de Genièvre , noirâtre , fucculente , amere , d'un gout délagréable , qui contient quatre grainçs convexes d'un côté, applaties de l'autre, renfermant une amande blanchâtre : il fleurit en été. Il vient dans les haies de bois. Vertus. Jl eft extérieurement vulnéraire , arrangent. PLANCHE 343Liliums Lis blanc, Viv. ON fe fert de fes fleurs 8c oignons. La racine eft bulbeufe , de la forme d'un oignon , Pl. 207 , au moyen de p ailleurs écailles charnues , unies enfemble , au-detfous defquelles partent quelques fibres , qui font la vraie racine, La tige s'élève de trois pieds &c demi; les feuilles font verd clair, luifantes. Les fleurs font à fîx pétales blancs , odorantes ; il leur fuccede un fruit oblong , à trois angles & à trois loges remplies de graines rouflèârres : elle fleurit en été. Le fuc qui remplit la plante, eft gluant. Elle vient en Syrie ; on la cultive dans les Parterres. Vertus et Usages. Extérieurement les fleurs font digeftiyes, maturatives, ano*

The text on this page is estimated to be only 17.85% accurate

ï}9 f ^ INDIGENES, dines ; l'oignon efl: fuppuratif , maturatif , émolîienr. ^L'huile des fleurs entre. dans l'Emplâtre de Mucilao-e m Grenouilles avec le Mercure. PLANCHE 344Lilium convalhum, Muguet, Viv. ON fe fert de fes fleurs. La racine rampe peu profondément, blanche, fibréej menue. Les feuilles font verd gai , luifantes. Le pédicule des fleurs s'élève à huit pouces , anguleux ; les fleurs font monopétales en cloche, découpées en cinq ou fix blanches , d'une odeur agréable ; il leur fuccede un fruit rond ' mol , rouge , dans la pulpe duquel font des graines très-dures & a mères : elle fleurit au printemps. Elle vient à l'ombre, dans les jeunes bois. Vertus et Usages. Elle efl: céphalique , nervine , antiépileptique : la dofe en poudre efl: jufqu'à un gros , & la conferve jufqn'à de mi- on ce. Les fleurs encrent dans la Poudre antiépileptique, fternutatoire &c céphalique. •Z3 PLANCHE 34J. Linaria , Linairc , Viv, ON fe fert de toute la plante. La racine efl: rampante , traçante , blanche , dure. Les tiges s'élèvent d'un pied , lifles , verd de mer. Les fleurs font monopétales en gueule , jaunes ; il leur fuccede une coque oblongue, arrondie, partagée en deux loges i remplies de graines noires arrondies : elle fleurit en été. Toute la plante efl: un peu acre, amere. Elle vient aux lieux incultes Se dans les champs. Vertus. : ExtérieuremenLjelle eft réfohuive . émolliente . adouciflante.

The text on this page is estimated to be only 17.86% accurate

TOME TROISIEME. m PLANCHE 34^. Lingua cervina , Scolopendre , VlY. S~\ N fe fert de toute la plante. \J Les racines font en grand nombre, capillaires, noirâtres. Elle n'a point de tiges ; les feuilles & leurs queues font longues depuis neuf pouces jufqu'à un pied & plus. Elle n'a point de fleurs apparentes ; les fruits font attachés 1 l'envers des feuilles , par rangées comme aux Capillaires , Pl. 115 & fuivantes. Ils font roux , & laiiïent aller en s'ouvrant , une fine pouffiere qui eft les graines. Elle vient dans les rochers , dans les puits Bc fontaines , à l'ombre. Vertus. Elle eft apéritive, défobftruante, réfolutive, vulnéraire : la dofe en poudre eft un gros ou deux. PLANCHE 347« Linumy Liri, Ann. ON fe fert de la graineLa racine eft très-menue , peu fibrée. La rige s'élève à un pied de demi , creufe , liffe ; les feuilles font lilfes. Les fleurs font à cinq pétales bleus ; il leur fuccede un fruit rond , de la groffeur d'un gros pois , compofé de plufieurs capfules remplies de graines ovalaires applaties, de couleur fauve, luifan tes , vifqueufes : elle fleurit en été. On la cultive dans les champs. Vertus et Usages. Elle eft adouciffante , émolliente , carminative , 'diurétique en tifanes & apozemes ; fan huile prife intérieurement, eft iaxative. tempérante, pectorale : la dofe eft de deux, trois Se quatre onces.

The text on this page is estimated to be only 17.72% accurate

zii* INDIGENES. Nota. Qu'on ne fait jamais bouillir la graine de Lin , de peur que par; fon mucilage vifqucux, elle ne charge trop l'cftomac. Extérieurement fa farine eft réfolutive, érnoiliente, maturatîve. La graine entre dans le Sirop de Marrhube , le Looc de Santé, l'Onguent d'AIthrea, mondiricatif, le grand Diachilunj l'Emplâtre de Mucilage. PLANCHE 34^* Linum cathartïcum , petit Lin purgatif, Ann. ON fe fert de toute la plante. La racine eft dure, menue, peufibrée, blanche. Les tiges s'élèvent de huit à neuf pouces j les feuilles font îiflès. Les fleurs font à cinq pétales blancs ; il leur fuccede un petit fruit, compofé de petites capfules cannelées, qui contiennent chacune une graine femblable à celle de la précédente : elle fleurie: en été. Toute la plante a un gout amer & répugnant. Elle vient dans les pâtures & lieux incultes. Vertus. Elle eft purgative, fébrifuge : la dofe des feuilles récentes, piiées , eft d'un gros ou deux en bol ; la poudre de la plante delféchée , eft un gros. p^MgJllJilMgMM™»™"""^" " ■■■II»-"»»»1 """ "* 1 1 1 ™'T PLANCHE 349' Lithofpermum creclum . Herbe aux perles , Gremil , Viv. ON fe fert de fa graine. La racine eft grofTe du doigt, dure, fibreufe. Les tiges s'élèvent de deux pieds & plus, droites, rudes; les feuilles font rudes , d'un verd noirâtre. Les fleurs font monopétales en entonnoir, découpées en cinq, d'un blanc faley il lçur fucçede quatre graines dures, gris de perles , luifantes , contenues dans le calice ; elle fleurit en ete.

The text on this page is estimated to be only 19.64% accurate

TOME TROISIEME. ±tj La graine a un gout vifqueux 3 farineux & un peu aftringent. Elle vient aux lieux incultes. PLANCHE 3 5°' Lithofpennum repens , Gremil rampant, Yiv. ON fe fert de la graine. La racine eft épailfe , longue , noire. Les riges font noirâtres; plufieurs couchées fur terre, pouffent quelques fibres par intervalle ; les feuilles font verd foncé, velues, rudes ainfi que les tiges. Les fleurs font monopétales en entonnoir , découpées en cinq , bleues; les graines font dures , blanches, grofiès comme celles de l'Orobe , Pl. 43 z : elle fleurit en été. Elle vient dans les bois. Vertus des deux Gremil s. Elles font très-diurétiques , déterfives , anodines : la dofe en poudre eft un gros; elles entrent dans la Bénédicte laxative, l'Eieiâuaire contre le calcul, les Pilules pour la goutte, la Décoction apéritive , le Sirop antinéphrétique de la Pharmacopée Royale. PLANCHE 35I. Lithofpermum lacryma Job, Larme de Job, Ann. ON fe fert de fa graine. La racine eft garnie de fibres longues jufqu a deux pieds. La tige s eleve à deux pieds; elle eft formée par les feuilles, qui s'élèvent au-deflhs lune de l'autre de nœud en nœud. _ Il fort de l'origine de chaque feuille aux nœuds fupérieurs, un embrion duquel partent des épis à étamines, qui font ftériles ; l'embrion devient un fruit gros comme un pois , compolé d'une coque dure , blanche , bleuâtre , qui contient une amande farineufe : elle fleurit en été. Elle ?ient dans les Pays Orientaux ; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

The text on this page is estimated to be only 17.30% accurate

H INDIGENES. Vertus. Elle paife pouf avoir les vertus des deux précédentes • rrtaiâ on s'en fert très-rarement en Médecine. PLANCHE Lotus odorciy Lotiei: odorant, Ann ONfe fert de fes feuilles, fleurs Se graines. La racine eft dure , menue, peufibreufe, blanchâtre La tige s'élève d'un pied & demi, droite, cannelée, hiFe, creufe; les feuilles font verd pâle, liïfes. t Les fleurs font légumineufes , bien clair , d'une odeur aromatique agréable ; il leur fuccede une capfule , qui renferme deux ou trois graines arrondies , jaunes , odorantes : die fleurit l'été, Quelques-uns la nomment faux Baume du Pérou. Elle vient dans les Pays Orientaux ; on la cultive dans les Jardins. Vertus* Elle eft digeftive, déterfive, confondante , anodine, alexitaire : la dofe des fommités fleuries & de la graine pilée eft uri gros. Extérieurement elle eft vulnéraire , adoudffante. PLANCHE 353. LujuLcLy Alleluya, Viv. ON fe fert des feuilles. La racine eft menue , écailleufe , d'un blanc fougeâtre j répandanr de côté & d'autre plufîeurs filets longs, blanchâtres; Elle n'a point de tiges ; les queues des feuilles s'élèvent de quatre à cinq pouces; les feuilles font verd pâles, d'un gout acide. Les fleurs font monopétales en cloche , blanchâtres \ il Jeuf fuccede un fruit oblong, à cinq angles, divifé en cinq loges? qui contiennent des gtaines luifantes , roulfeâtres 3 die fleurit au printemps. Elle vient dans les bois & dans les haies,

The text on this page is estimated to be only 16.73% accurate

TOME TROISIEME, 1X$ Vertus. Elle a le mcme gout & les mêmes vertus que l'Ofeille ' PI. ïï4' PLANCHE 3J4Lupinus , Lupin , Ann. ON fe ferr de fa graine. La racine eft dure, garnie de plufieurs fibres très-menues. La tigeseleve jufqu'à trois pieds & demi, droite, creufe, moelleufe , un peu velue ; les feuilles font verd foncé , velues en deflbus & duvetées. Les fleurs font légumineuses, blanches; il leur fuccede une gouffe jaunâtre, un peu velue en dehors, qui contient cinq à h graines aflez grandes , rondes , applaties , blanchâtres en dehors, jaunâtres en dedans, très-ameres : eUefieurk en été. On la cultive en plein champ , dans nos Pays chauds. Vertus et Usages, La farine de Lupins eft une des quatre farines réfoluùves. Ils entrent dans les Trochifques de Myrrhe, dans l'Onguent pour les vers de Renaudot. PLANCHE 3 TJ. Lupulus , Houblon, Viv. ON fe fert de fes feuilles , racines & jeunes poufles. Les racines font menues ; elles s'entrelaflent les unes dans les autres. Les tiges font longues , foibles , rudes , anguleufes , s'entortmant autour des corps quelles rencontrent, & s'élevant ainfi quelquefois à une grande hauteur; les feuilles font rudes. II y a des pieds qui ne portent que des fleurs à éranunes 6c fteriles , & d'autres qui ne portent que les fruits. Les fleurs font couleur d'herbe pâle; les fruits font comme petites pommes de Pin à écailles, peu ferrées, d'un verd fan*

The text on this page is estimated to be only 18.35% accurate

litf INDIGENES; ne , lesquelles cachent de petites graines roufies , applaties , d'cma odeur agréable d'ail , d'un gout amer : elle fleurît en été. Elle vient dans les haies des prairies j on la cultive pour U bière. Vertus et Usages. Les fleurs , fruits &c jeunes poufles , font apéritifs , déterfîfSj ftomachiques , laxatifs, diurétiques, antifconnttiques. Les rad. nés font apéritives & fudorinques. Les fommités de Houblon entrent dans le Sirop de Chicorée compofé , Bizantin finiple de Mefvé. M. PLANCHE 3J^* Majorana , Marjolaine , Viv, N fe fert de fes feuilles & fommités fleuries. La racine eft menue , ligneufe. Les tiges s'élèvent de neuf pouces ou environ , quarrées, ... peu velues j les feuilles font couvertes de duvet, d'une odent forte, aromatique, agréable , d'un gout aromatique , amer, un peu âcre. Les fleurs fortent de têtes écailleufes ; elles font tres-petites, monopétales en gueule , blanchâtres ; il leur fuccede quatre graines arrondies au fond du calice : elle fleurit en été. Elle vient dans nos Pays chauds ; on la cultive dans les Jardins. Nota. Qu'il y en a une autre efpece , qui ne diffère de la précédents qu'en ce que les feuilles font plus pecites & plus odorantes. Vertus et Usages. Elle eft céphalîque , béchique , ftomachale , carminative , diurétique, hyftérique. Sa Poudre eft un bon fternuratoire. Elle entre dans la Poudre céphalique , fternuratoire , la Décoction céphalique, le Sirop d'Armoife, l'Eau pour l'apoplexie de Charas. PLANCHE o un

The text on this page is estimated to be only 16.43% accurate

TOME TROISIEME. ïïf PLANCHE 3 57 * Malva majar, grande Mauve , B. AnN. ON fe fert de fes feuilles, fleurs, graines Se racines. La racine eft. profonde en terre, blanche, peu fibrée ^ d'un gouc doux & vifqueux. * Les tiges s'élèvent jufqua trois pieds, velues, moblleufest les feuilles font verd foncé , un peu duvetées. Les rieurs font monopétales en cloche , découpées en cinq ; purpurines , marquées de raies pourpre fonce ; il leur fucceda un fruit rond , compofé de pluliems graines de la forme d'un rein , difpofées en rond : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes. PLANCHE 3 j8. Malva minor 3 petite Mauve, B. Ànn. ELle eftentout plus petite que la précédente; les tiges plus penchées vers la terre, les feuilles d'un verd plus fonce Se plus rondes , les fleurs beaucoup plus petites , pourpre pâle , à raies purpurines : elle fleurit en été, Se vient aufïi aux lieux incultes. Vertus et Usages des deux Mauves. On fe fert indifféremment des deux. v Elle eft une des quatre plantes émollientes 3 humedbante , htztive, diurétique, pectorale. Extérieurement les feuilles font adoucitTantes , émollientes: Elle entre dans le Sirop de Guimauve. Les graines entrent dans le Sirop d'Hylfope, de Jujubes, les Trochifques de Gordon, le Looc de Santé.

The text on this page is estimated to be only 19.74% accurate

m 8 INDIGENES. PLANCHE MaLva Rofea 3 Rofc Trémiere, Viv. /""\N fe fert de fes fleurs. La racine eft longue , blanche, vifqueufe. La tige séieve de lix pieds, velue; les feuilles font velues, verd foncé en deffus , blanchâtres en deffous. Les rieurs font monopécales en cloche, découpées en cinq; il s'en trouve de toutes couleurs j le fruit reffemble en grand à celui de la Mauve : elle fleurit en été. On la cultive dans les Parterres. Vertu s. Elle eft vulnéraire , déterfive. I PLANCHE 36°' Malus, Pommier. L fe trouve bien des efpeces de Pommiers cultivés , qui fe _reffemblent tous à quelques petites circonftances près , qui ne font aucune différence eflentielle. Celui de la planche a été deffiné fur le Pommier de Renette , comme le plus ufuel en Médecine. On fe fert du fruit. C eft un arbre de hauteur médiocre. Les racines ne font pas nornbreufes ; elles s'étendent vers la fupevficie de la terre. . Lecorce eft raboteufe , cendrée en dehors , jaune en dedans; le bois eft blanchârre, médiocrement dur; les feuilles font plus velues en deffous qu'en deffus. Les fleurs font à cinq pécales blancs ou légèrement purpurins , odorantes ; il leur fuccede un fruit nommé Pomme, charnu , partagé à fon centre en cinq loges , remplies chacune d'une ou deux graines ou pépins noirs en dehors , renfermant «ne amande blanche : il fleurît au printemps. On le cultive dans les Vergers ôc Jardins fruitiers.

The text on this page is estimated to be only 16.58% accurate

T O M È T R O î S I E M Ë. H2 Vertus et Usages. tes Pommes (principalement la Pomme de Renette) font cordiales, laxatives , rafraîchiflantes, béchiques, apéritives. Leur fuc entre dans la Confection Alkennés , le Sirop d$ pommes laxarif du Roi Sapor , de Pommes compofé. O PLANCHE 3^1Malum granatum , Grenadier, N fe fert de fes rieurs & de toutes les parties du fruit. C'eft un grand arbrhfeau. La racine s'enfonce droit en terre. La tige & les branches font anguleufes , armées d épines rol^' des, couvertes d'une écorce rougeâtre ; les feuilles font luifantes , leurs queues rougeâtres , d'une odeur forte d'urine. Les fleuts font à cinq pétales de couleur écarlate , fortanfi d'un gros calice de même couleur , épais , dur : ce calice s'enfle & devient un fruîr gros comme une orange , de couleuC d'un rouge châtain, jaune en dedans; fon inrérieur eft partagé en quantité de loges , dont chacune conrient une graine fem* blable au pépin de raifin. Toutes les loges font remplies d'un fuc rouge , plus ou moins foncé ; chaque pépin renferme une) amande amere un peu aftringente : il fleurit en été* Balaujlia, Balauftes. On appelle ainii les rieurs d'une efpece de Grenadier fak comme le précédent, mais dont la fleur eft double ; Je calice qui la contient n'eft pas fi long, mais large ôc appiati, d'un pourpre jaune rempli de quantité de pétales. On cultive les Grenadiers dans les Jardins. Vertus et Usages. Les grains ou pépins de Grenades fontftomachîques , cordiaîs," céphaliques; l'écorce du fruit eft aftringente, fébrifuge : la dois en poudre eft depuis demi-gros jufqu'à un gros j la décoction jufqu a demi-once. Les Balauftes font incrafTanres , defficatives, un peu moins aftringentes que l'écorce du précédent : la dofe en poudre eft u». gros ou demi- once*

The text on this page is estimated to be only 18.95% accurate

ïio f INDIGENES. L ecorce de Grenade entre dans l'Onguent fHptîque, Les B * laujles encrent dans le Sirop de Myrtilles, la Poudre dyfenté" fîque, l'Eledhiaire Micleta, les Trochifques deKarabé, i'Qa" guent ftiptique. PLANCHE 362. Malus perfica^ Pêcher de vigne. ON fefert de fes fleurs , fruits , amandes Se gomme. C'eft un arbre médiocrement haut. Là racine eft dure, fibreufe & s'enfonce droit en terre. L ecorce eft d'un brun rougeâcre ; le bois eft roux & affez ferme ; le cœur tire fur le pourpre ; les feuilles ont un gout amer, un peu aromatique Se peu agréable. Les fleurs viennent au printemps avant les feuilles; elles font a cinq pétales rouge clair , peu odorantes - il leur fuccede un fruit rond , gros comme une petite pomme , jaune Se purpurin, velouté en delfus, plein d'une chair douce & vineufe, fucculente, contenant un noyau raboteux, très-épais & dur, liffe en dedans, qui renferme une amande blanche, couverte d'une pellicule jaunâtre, un peu amere. 11 découle , ou naturellement, ou par incifion , une gomme pareille à celle des Amandiers, des Cerifiers , Sec On le cultive dans les vignes; on en élevé dans les Jardins fruitiers _ beaucoup d'efpeces, qui ne font que des variétés, qu'ainfi il feroit fuperflu de décrire ici. Vertus. Les fleurs font purgatives, hydragogues, vermifuges; leur fuc fe donne depuis demi-once jufqu'à une once. Les feuilles font Iaxatives , vermifuges. Les amandes font diurétiques , vermifuges , apéritives, La gomme eft adouciffante.

The text on this page is estimated to be only 19.29% accurate

TOME T R O T S I E M E. 221 O PLANCHE 363. Mandragora mas3 Mandragore mâle, Viv.. N fe fert de fes feuilles & de l'écorce des racines. La racine eft longue , épailfe , partagée quelquefois en deux branches ou plus s d'un cendré, roux en dehors , pâle en dedans.. Elle n'a point de tiges; les feuilles font verd foncé., d'un gout facle. Les fleurs font monopétales en cloche, découpées en cinq, légèrement velues , d'un violet très-clair , fentant mauvais ; U leur fuccede un fruit de la grofteur d'une grolfe prune, rond, jaunâtre, charnu , d'une forte & mauvaife odeur, dont la pulpe contienr des graines apphties de la figure d'un rein. Mandragora fœminay Mandragore femelle, Viv. Elle reflembleàla précédente; la différence la plus confidérable, eft que les fruits font allongés, plus petits & plus pâles; d'ailleurs la racine eft plus noirâtre en dehors , les feuilles plus petites. Elles viennent en Italie, en Efpagne, dans les bois & fur le bord des rivières, à l'ombre j on les cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. Extérieurement les feuilles font difcuflives , atténuantes, réfoliitives. Elles entrent dans l'Onguent Populeum. L'écorce des racines entre dans le liequies de Mxlas , YAurea alexandrina, le Triphera magna.' PLANCHE 3 64. Marrhubum album, Marrhubc blanc, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft ligneufe , fibrée. Les tiges s'élèvent d'un pied & plus ; les feuilles font blanchâtres. 0}

The text on this page is estimated to be only 16.79% accurate

an INDIGENES. Les fleurs font monopétales en gueule, petites, blanches; i| leur fuccede quatre graines oblongues au fond du calice ; e//e fleurit en été. Toute la plante a une odeur forte , aromatique. Elle vient aux lieux incultes. Vertus et Usages. Elle eft. apérîtive , difcufiïve , défobftruante, peâorale ; dofe du fuc eft de deux à trois onces. Les feuilles & fommités fleuries entrent dans le Sirop de Marrhube de Mefvé , les Pilules d'Agaric, la Thériaque, l'Hyera dtacolocynthidos , la Poudre de Marrhube. PLANCHE 36 Marrhubiutn nigrum, Marrhube noir , Viv. ON fe fert de route la plante. La racine efl ligneufe , iibrée. Les tiges s'élèvent d'un pied & demi à deux pieds, quarrées, creufes, velues; les feuilles font verd foncé, velues, ameres, Les rieurs font monopétales engueule, pourpre pâle, rayées de pourpre plus foncé j il leur fuccede quatte petites graines oblongues , noirâtres au fond du calice : elle fleurit en été, La plante a une odeur défagréabîe. Elle vient aux lieux incultes. Vertus. Extérieurement elle eft réfolutive , déterfive, anodine, calmante. PLANCHE 366. Marum, Marum, Viv. ON fe fert de fes feuilles & fommités fleuries. La racine eft fibreufe. _ La tige & les rameaux s'élèvent à la hauteur de près d'un pied; ils font ligneux, velus; les feuilles font verd gai en delfus, blanches en délions , d'une odeur forte, aromatique , agréable , d'un goût âcre , amer»

The text on this page is estimated to be only 18.14% accurate

TOME TROISIEME. uj Les fleurs font monopétales en gueule, purpurines; il leur fuccede quatre graines arrondies au fond du calice : elle fleurie Elle vient dans les Ifles d'Hyeres ; on la cultive dans les Jardins de Botanique. o PLANCHE 367. Marum maftic, Marum maftic , Viv. N fe fert des mêmes parties de la précédente. Les racines font contenues, ligneules. Les tiges s'élèvent de neuf pouces; les feuilles font blanchâtres, dune odeur approchant de celle du maftic ou gaudron , d'un gout acre. \. 1 Les fleurs fortent de pentes têtes cotonneuies; elles iont. monopétales en gueule, blanchâtres y il leur fuccede quatre graines au fond du calice. Toute la plante a une odeur agréable. Elle vient en Efpagne Se autres Pays chauds ; on k cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus des deux Marum. Elles font les mêmes dans les deux efpeces. Le Marum eft céphalique ; mais il eft rarement en ufage : la dofe des feuilles en poudte eft un demi-gros. Extérieurement c'eft une errhine. PLANCHE 3^Matricaria, Matricaire, Ann. ON fe fert de fes fleurs & fommités fleuries. La racine eft blanche , fibrée» ^ Les tiges s élèvent de deux pieds & demi, cannelées, liifes, moëlleufes j les feuilles font verdgai, d'une odeur forte, d'un goiu amer. . . Les fleurs font, radiées , le difque eft jaune , la couronne blanche ; il leur fuccede de petites graines cannelées , oblongues , fans aigrettes au fond du calice : elle fleurit en été, a O 4

The text on this page is estimated to be only 13.33% accurate

iz4 INDIGENES. Toute la plante a une odeur pénétrante, défagréabîe On la cultive dans les Parterres. Vertus et Usages. Elle eft hyftérique, ftomachaîe, carrninative, vermifuge -Les feuilles entrent dans le Sirop d'Armoife aririnV cheârique, l'Emplâtre de Grenouilles ' P ' Ca PLANCHE 369, iWayj, Bled de Turquie, Akn. ON fe fert de fa graine. Les racines font nombreufes , dures , fibreufes , menues blanches. ' { La tige s'élève de cinq à fix pieds , pleine de moelle blanche ucculente, d un gout doux Se fucré. ' Les épis du fomme-t de la tige ont des fleurs a étamines ft& nies , on blanches , ou jaunes , ou pourpres ; les fruits fe for Jment aux nœuds de la tige; ifs font précédés d'un amas de engs hiecs, chacun attaché a Tembrion dune graine, qui de vient groïfe comme un pois. Ces graines font attachées elles-mê. mes par rangées, à un filet ou centre commun \ elles font blanches ou jaunes ou purpurines remplies d'une pulpe farùieufe blanche , d un gout doux Se agréable : elle fleurit en été.. On la cultive dans toutes les parties du monde. Vertus.. On peut fubftituer fa farine à celle d'Oive. Extérieurement elle eft émollienre & fuppurative. PLANCHE 370. Melilotus 3 Mélilot, B. Ann, ON fe fert de la planre fleurie, La racine eft plongée avant en terre , garnie de fibres menues & courtes. La tige s'élève jufqu'à quatre pieds dans les lieux incultes, fouvent elle ne va qu'à deux pieds & demi , Me , un peu cannelée, creufej les feuilles font liffes , verd foncé,

The text on this page is estimated to be only 20.65% accurate

TOME TROISIEME. 22f Les fleurs font légumineufes , jaunes ; il leur fuccede des moufles très-courtes , noires, qui renferment une ou deux onînes arrondies, jaunâtres, dun gout legumineux : elle fleurit en été. Elle n'a prefque point d'odeur étant verte; mais feche elle en a une très-pénétrante, tirant fur celle du miel. Elle vient aux bords des haies & dans les bleds & autres grains. Vertus et Usages. Extérieurement elle eft émollienre , anodine , réfolutiye , patufativÊ. Elle entre dans l'Emplâtre de Mélilot , de Mefvé. PLANCHE 371. Melija, Méliffe, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft profonde en terre, ronde, dure, fibreufe. Les tiges s'élèvent d'un pied & demi , quarrées , prefque liffes; les feuilles font luifantes, hérilfées de poil folet, d'une odeur de Citron , d'un gout un peu âcre. Les fleurs font en gueule blanches ou incarnates • il leur fuccede quatre graines au fond du calice : elle fleurit en été. On la cultive dans les Jardins. Vertus et Usages. Elle eft cordiale, céphalique, ftomachale , hyftérique, alexitaire : la dofe des feuilles en infufion eft d'une demi-poignée fraîches , & d'une pincée feches. Elle entre dans le Sirop d'Armoife , la Poudre de l'Eleâuaire ktflcansj le Catholicum fimple , l'Eau vulnéraire, fans pareille, générale, du lait alexitaire.

The text on this page is estimated to be only 18.33% accurate

INDIGENES. PLANCHE 372. Meliffa trâgï, MéJifle fauvagc , Ann. ON fe fert de route la plante. La racine eft fibreufe, un peu acre , amere. La rige a un pied & plus de haut, quarrée , velue, moélleufe; les feuilles font hériifées de petits poils, verd noirâtre, peiî luifanres, d'un gout un peu acre. Les rieurs font monopétales en gueule , d'un pourpre clair jafpées de pourpre plus foncé à la lèvre inférieure ; il leur fuc! cède quatre graines au fond du calice : elle fleurit au printemps. Toute la piante a une odeur défagréable. Elle vient dans les bois. Vertus. Elle eft diurétique , vulnéraire. PLANCHE 373. Melo s Melon, Ann. ON fe fert de fa graine. La racine eft fibreufe , branchue. Les riges font farmenteufes , rampantes , garnies de mains 011 vrilles, avec lefquelles elles s'accrochent, rudes ainfi que les feuilles. Les fleurs font monopétales en cloche, découpées en cinq, jaunes ; les unes ftériles , d'autres portées fur un embrion qui devient un fruit oblong , cannelé , couvert d'une ccorce épaiife verre , recouverte d'un réfeau ou broderie relevée , contenant une chair jaune ou rougeâtre, humide, d'un gout agréable, dans le centre de laquelle il y a plufieurs loges remplies de nombres de graines blanches plates, qui renferment une amande douce, agréable au gout ; elle fleurit en été. On la cultive dans les Potagers. V E MHS, C'eft une des quatre femences froides; elle eft rafraîchuTante.

The text on this page is estimated to be only 19.45% accurate

TOME troisième: PLANCHE 3 74. Melongena , Mayenne, Ann. ON fe fert de fes feuilles. La racine eft fibreufe, peu profonde en terre. La tige a environ un pied de haut, rougeârre, légèrement duvetée j les feuilles font vertes, duvetées, quelquefois épineufes en défions. Les fleurs font monopétales blanchâtres ou purpurines , découpées en cinq} il leur fuccede un fruit gros, rond Se long, lifle, de couleur purpurine , rempli d'une chair fucculente , blanchâtre, qui contient plufieurs graines blanchâtres de la forme d'un rein : elle fleurit en été. On cultive la plante dans les Jardins j on en mange le fruit dans nos Pays chauds. Vertus. Extérieurement elle eft anodine , réfolutive. PLANCHE Menyanthes , Treffle d'eau, Viv. ON fe fert de fes feuilles. La racine eft longue , blanche , fibrée par intervalles. Elle n'a point de' tiges ; les feuilles font liftes. Le pédicule des fleurs s'éieve d'un pied & demi, verd ; les fleurs font monopétales en entonnoir, découpées en cinq, blanches , garnies de poils blancs j il leur fuccede, un fruit oblong, arrondi, qui renferme des graines ovales, d'un brun jaunâtre , d'un gout amer : elle fleura au printemps. La plante a un gout défagr cable. Elle vient dans les Marais. Vertus. Elle eft antifcorbutique, incifive, pectorale;

The text on this page is estimated to be only 17.18% accurate

INDIGENES. PLANCHE 376. Mentha hortenjis , Menthe de jardin , Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft: traçante , fibrce. Les tiges s élèvent d'un pied & demi , quarrées , un peu velues, rougeâtres; les feuilles ont une odeur force, aromatique Les fleurs font monopétales en gueule, purpurines-, il Jeur fuccede quatre graines au fond du calice : elle fleurit en été. La plante a une odeur de Bafilic^ Pl. 418, Se le gout un peu acre. On la cultive dans les Jardins. PLANCHE 377. Mentha crifpa , Menthe crêpée, Viv. LA racine eft rampante, traçante. Les tiges s'élèvent de trois pieds , quarrées, velues; les feuilles font verd noitâtre. Les fleurs font bleu-pâle ; elles & les graines font femblables à la première. On la cultive dans les Jardins. •\M , I , I. I ■ PLANCHE 37^. Mentha romana 3 Menthe romaine, Viv. LA plante eft en tout femblable aux précédentes y les différences font que les rieurs forment des épis longs, qu'elles font blanchâtres & que les feuilles reflemblenc à la Menthe de. jardin , non à la crêpée. On la cultive dans les Jardins.

The text on this page is estimated to be only 18.21% accurate

TOME TROISIÈME. PLANCHE 379Mentha aquatica } Menthe d'eau , Viv. ELle reffemble beaucoup , par toutes Tes parties , à la Menthe de jardin ; les différences de celle-ci , font qu'elle a une forte odeur de Pouliot ci-de(fous , qu'elle eft fauvage , c'eft-à-dire , qu'elle vient d'elle-même le long des ruifleaux & aux endroits marécageux. PLANCHE 380. Menthaflrum , Menthe fauvage, Viv. ELle reffemble affez aux précédentes-les différences font que fon odeur eît moins agréable que celle de la Menthe de jardin , que fes feuilles font couvertes d'un coton blanc. Ses fleurs font en épis , d'un blanc rougeâtre , les graines noires. Elle vient aux lieux humides. Vertus et Usages des cinq Menthes. Elles font ftomachales, fortifiantes, diurétiques, hyftériques, carminatives , apéririves , vermifuges , en infufion , décoction , &c. Extérieurement elles font vulnéraires , réfolutives. Elles entrent dans le Sirop de Méliffe fauvage , antifcorbutiquede Charas, la Poudre Diagalanga , la Poudre de Xilo-aloes. PLANCHE 381. Mentha pulegium , Pouliot, Viv. ON fe fert de toute la plante en fleur. Les tiges font en partie rampantes Se en partie droites,"

The text on this page is estimated to be only 16.60% accurate

3 INDIGENE S. rouge pâle, rarement blanches; il leur fuccede quatre graines atl fond du calice : elle fleurit en été, La plante a une odeur très-pénétrante &c un goiit très-âcre & amer. Elle vient aux lieux humides , incultes* V E R T U Si Elle eft apéritive, ftomachique, hyftérique, béchique, en in,, fufion. Extérieurement elle eft vulnéraire , adoucilTante. s PLANCHE 382. Mercurialis , Mercuriale, Ann. ON fe fert de la plante* Elle fe divîfe comme le Chanvre, Pl. 154, en deux fexes, c'eft-à-dire, en'pieds qui portent les fleurs, & en pieds qui donnent les fruits ; le pied à fleurs eft le mâle , par lequel on va commencer. La racine eft tendre & fîbreufe. La tige s'élève d'environ un pied , attguleufe, liffè \ les feuilles font verd bran , luifanres , d'nn gout nitreux & répugnant. Les fleurs font à étamines & ftériles. La Mercuriale femelle eft en tout femblable à la précédentes la feule différence eft qu'elle ne porte que des fruits qui naiffent dans les aiflelks des feuilles, en forme de deux petites boules jointes côte à côte , rudes , velues , qui contiennent chacune tme petite graine ronde : elle fleurit m été. Ellelvient par- tout. 1 Vertus et Usages. Cerf une des cinq fiantes émollientes; elle eft apéritive , laxative. ; Elle enète dans le Sirop de longue vie, le Lénitif, le Catholicum.

The text on this page is estimated to be only 18.30% accurate

TOMÉ TROISIEME. 1}t 0 PLANCHE 383. Mefpylus, Nefflier. ' N fe fert de fes fruits , feuilles & branches tendres. La racine eft profonde en terre, branchue, fibrée. C'eft un arbre de grandeur médiocre. Le tronc eft fou vent tortu Se le bois'aflez dur ; les feuilles font vertes & un peu velues en deflfus, cotonneufes en deuous Les fleurs font à cinq pétales, blanches ou incarnat: il leur fuccede un truit gros comme une pomme d'api , prefque rond roux quand il eft mûr, velu, charnu, d'un gout âpre : mais quand la chair, qui eroir blanche, devient molle & roulle elle acquiert un gout vineux fort agréable. Elle contient cinq noyaux très-durs, inégaux , rougeâtres , qui entérinent chacun une graine oblongue : il fleurit au printemps. Vertus et Usages. Les fruits qu'on nomme Neffles font aftringenrs , les branchés tendres en décodèion ont la même vertu, ain/i que les feuilles en gargarifine. Les fruits entrent dans le Sirop de Mytre compofé, les feuilles dans l'Onguent de la Com telle. 0 PLANCHE 3 84. Mefpylus oxiacantha, Epine blanche. N fe fert des fruits. C'eft un arbriiïèau de médiocre grandeur, épineux. La racine eft longue & profonde en terre. Le tronc eft médiocre, dur, armé d'épines très-piquantes; lecorce eft brun cendré ; les feuilles ont un gout vifqueux. Les fleurs qui viennent au printemps , un peu avant les feuilles > fo«*£ cinq pétales blancs, très-odorantes; il leur fuccede un fruit ou baie grofle comme un pois, rouge, remplie d'une pulpe vifqueufe , douceâtre , qui renferme une ou deux graines rondes, dures , blanches. Ee fruit fe nomme Senelle.

The text on this page is estimated to be only 17.66% accurate

x INDIGENES. 11 vient en tout climat, dans les haies, le long des chetnî' PLANCHE Mefpylus pyracantha 9 Euiiïbn ardents ON fe fert de fes fruits. C'eft un arbrilfeau épineux. Il ne s'élève pas fi haut que le précédent. Les feuilles ne font pas découpées ; les rieurs font pareilles mais jaunes , rougeâtres -y les fruits pareils , mais moins allongés, aigrelets, renfermant quatre ou cinq graines, jaune pâle, anguleules : il fleurit en été. Il ne quitre point: fes fruits pendant tout l'hiver. Il vient en Italie , en Provence ; on le cultive dans les Jardina de Botanique. Vertus des deux Epines. Leurs baies font aftringentes. PLANCHE 386.Miliums Millet, Ann. ON. fe fert de fa graine. Les racines font blanchâtres, fibreufes. Les tiges s'élèvent de deux à trois pieds. Les rieurs font à étamines jaunes j il leur fuccede des graineî ovales, jaunes ou blanches, dures, luifantes dans le calice da la fleur : il fleurit m été. On le cultive dans les champs. PLANCHE 387. Milium forgo , grand Millet, Ann. ' ON fe fert de fa graine. La racine eft compofée de grofles fibres , qui s'enfoncent en terre de côté 5c d'autre. Les

The text on this page is estimated to be only 17.59% accurate

TOME TROISIEME: iH Les' tiges s'élèvent jufqu a dix pieds & plus , remplies de hioëlle blanche , douceâtre. Les rieurs font à étamines jaunes 5 elles fortent d'un calice à deux, feuilles ; il leurfuccede des graines du double plus «roflea que celles de la précédente, ovales, de" couleur roux noir;e//e fleurit en été. . Elle vient dans les Pays chauds où on la cultive. Vertus des deux Millets. Le fécond peut être fubftitué au premier. La graine eft diurétique, diaphonique j on l'emploie eh décoction. Extérieurement la farine de Milîet eft anodine , réfolutive. PLANCHE 388» Milk-folium 3 Mille-feuille, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft traçante , noirâtre , fibreufe-» Les tiges s'élèvent d'un pied à un pied Se demi, cannelées; velues, moclleufes j les feuilles font chine odeur alTez agréable, d'un gout un peu acre. Les fleurs font radiées blanches ou purpurines, odorantes; il leur fuccede des graines menues : elle, fieuritenété. La plante eft aromatique , un peu arhere. Elle vient par-tout. Vertus et Usages. Elle eft vulnéraire , réfolutive, aftringente, déterftve ; intérieurement on l'emploie en infufïon , en déco&ion , en poudre , à la dofe de deux gros. Extérieurement pilée elle a les mêmes vertus. Elle entre dans l'Eau vulnéraire, le Baume Polycrefte de Bail-; èron , le Mondifkatif d'Ache , le Martiatum.

The text on this page is estimated to be only 19.51% accurate

234 INDIGENES. PLANCHE 389* Momordica , Pomme de merveille, Ann. ON fe fert du fruit. La racine eft petite > fibreofe. Les tiges font farmenteufes , longues de deux à trois pieds traînantes ou grimpantes , par le moyen de leurs mains , aux corps qu'elles rencontrent j les feuilles font liiïes , verd gai , d'un gour un peu âcre Se amer. Les fleurs font monopérales découpées en cinq, jaune pâle; il leur fuccede un fruit oblong , gros comme une prune , rouge clair, vuide de chair en dedans , rempli de quantité de graines, rouge brun, grandes comme celles de la Citrouille, Pl. 128; €,lle fleurit en été. On la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus. Extérieurement elle eft; vulnéraire , anodine. , PLANCHE 390» Morus nigra 3 Mûrier noir. ON fe fert de fon fruit , racine & écorce. C'efi un arbre de moyenne taille. La racine eft peu profonde, nombreufe , rampante. Le tronc eft peu droit , couvert d'une grotte écorce rude , le bois eft dur , jaune vers !e cœur * les feuilles font velues , rudes, d'un gout vifqueux, douceâtre. Les fleurs font des chatons verdâtres , lanugineux , ponant plidieurs fleurs à quatre feuilles \ ils font ftériles ; les fruits viennent à part *, ils font compofés de grains aifemblés , formant tous enfemble un fruit allongé , gros ; ils deviennent noirs en mûriffant , remplis d'un fuc doux & vifqueux, enfermant des graines prefque rondes : il fleurit en été. On le cultive dans les Vergers.

The text on this page is estimated to be only 15.42% accurate

TOME T R O I SI EU t. t^ PLANCHE 391. Mo rus alba Mûrier blanc. ON fe fert de fon écorce & racine, un arbre de moyenne Caille , plus hatlt que le pré* cèdent. Les racines s'étendent plus que celles du Mûrier noir. Les chatons des rieurs font à peu près de même ; les fruits pTu$ petits & blancs ou purpurins , & d'un gout fade 6c répugnant j il fleurit en été. On le cultive pour la nourriture des vers à foie* Vertus des deux Mûriers* Les fruits du Mûrier noir, avant leur maturité, font ext£» rieurement déterfifs , âftringents; quand ils font mûrs, ils deviennent intérieurement laxatifs , humectants , rafraîchiflànts , béchiquesj on en compofe un Rob, nommé Diamorum. L'écorce & la racme du blanc &c du noir font vermifuges. o PLANCHE 392.. Mofchatellina , Herbe dumufe, \riv, ON fe fert de fa racine. La racine a un pouce de long , écailleufe i fuccdlente" i lîbrée. La tige s'élève de flx pouces; les feuilles font verd de mer. Les rieurs font monopétales découpées en cinq , de couleuf verd clair- il leur fuccede un fruit mol, fucculent, qui contient quatre graines reifetnblaht à la graine de Lin : elle fleurit au printemps. Toute la planre a une odeur de mufe; le fruit mûr à l'odeur & le gout tirant fur la Fraife, Elle vient à l'ombre , parmi les broffailles , en terrain maigre. Vertus. . Extérieurement elle eft vulnéraire, réfoluuve; mais on s'en fett rarement, P 1

The text on this page is estimated to be only 17.07% accurate

î N D I G E ÎNT Ë S . PLANCHE 393. Mu feus terreflris yulgatior , Moufle commune , Viv. ELle relfemble en tout à lUfnée, Pl. 659; elle efl verte quelquefois jaunâtre; elle fe trouve en quantité dans Us terres maigres & incultes , furies montagnes , clans les bois. Mufcus repens clavatus , Patte de loup, Viv. Elle rampe fur terre ou elle s'enracine d'efpace en efpace jettant çà &c là des rameaux dont les feuilles font toujours vertes. De ces rameaux s élèvent des épis longs comme le doigt écailieux , & fous chaque écaille efl: une capfule qui Sai^e échapper dans fa maturité, une pouiïïere jaunâtre prefque imperceptible, quiprend feu,, jettée à la lumière d'une chandelle. Mufcus membranaceus , Noftoch. Cette Moufle préfente l'apparence d'une efpece de geîce flottante , graife, recouverte par une membrane verd pâle , appliquée contre terre, inlîpide au gout. On la voit hors de terre après la pluie , le long des chemins , dans les champs , vers les prés ; on ne la rencontre qu'entre les deux équinoxes» Elle fe feche le jour & reparoît la nuit. Vertus des trois Mousses. Les deux premières font aftringcntes extérieurement. La troifieme eft vulnéraire 3 adouciflante. PLANCHE 394. Myagrum , Cameline, Ann, /~\ N fe fert de fa graine. La racine efl: alfez dure , fibreufe. La tige s'élève à un pied & demi & plus , moëlleufe , un peu velue; les feuilles font verd pâle, d'un gout légumineux. Les rieurs font à quatre pétales en croix , jaunâttes ; il leur fuccede un fruit obiong, à deux loges, contenant de petites

The text on this page is estimated to be only 16.93% accurate

TOME TROISIEME. u graines longuettes, qui ont le gout du Greffon /pi. 40, ..e% fleurit en été. Elle vient dans les champs cultivés. Vertus. Extérieurement elle eft adouciffame, émollienre; fonhuilea les mêmes vertus ; on l'emploie aulH intérieurement planche 3 9 y. Myrrhis , Cerfeuil mufcjué, Viv. ON Ce ferc de fa racine. _ La racine eft loflgue , molle blanche , grotte , d'un gout aromatique , doux , agréable. Les tiges s élèvent à quatre ou cinq pieds, velues , creufes.; les feuilles ont ordinairement quelques taches blanches ; elles font verd clair , un peu velues , d'une odeur de Cerfeuil , mêlée de celle d'anis. Les fleurs font en parafol , blanches -, il leur fuccede deux graines accollées , longues, cannelées, noirâtres, d'un gout doux d'an is : elle fleurit en été. Elle vieac dans les prés; on la cultive dans les Jardins de Botanique, Vertus. Elle a les mêmes vertus que le Cerfeuil ordinaire, Pl. vx$; elle eft incifive , béchique, hyiiiérique , en décoétion. PLANCHE 39 6Myrtkus minor, petit Myrrhe. ON fe fert de fes fruits ou baies , fleurs & feuilles. C'eft un arbriffeau. La racine eft ligneufe , peu profonde. Les riges & rameaux s'élèvent de cinq àfix pieds-; les feuiiks font verd gai , hiifanres , odorantes ; il ne les quitte point pendant toute l'année. Les fleurs font à cinq pétales, blanches, odorantes; il leur fuccede une baie ovalaire, noire, partagée en trois loges, remplies de grains en. forme de rein , durs } blancs ; il fleurit ai été.

The text on this page is estimated to be only 15.25% accurate

jtjS ^ INDIGENES, Tout Parbrlfleau a un goût aftringent. On le cultive dans les Jardins. Myrthus major y grand Myrthe. Cet arbrifteau croîr quelquefois, à la hatireur d'un arbre; fati écorce eft rouge; fes feuilles font toujours verres comme au pré. çédenr; les fleurs & fruits lui reftèmblent. 11 vient en Italie & en Provence, dans les haies. Vertus et Usages dbs deux Aî y r t h e s. Les baies & feuilles fonr aftringenr.es , rafraîchi (Tantes intérieuyement Se extérieurement : la dofe du fuc des baies eft depuis demi-once j ufqu'à une once. La décoction des fleurs eft clé terfive , aftringente , fortifiante. Les baies entrent dans le Sirop de Myrthe compofé , roboranr , les Trochifques de Gordon , l'Onguent ftiptique de Fernel. Le Sirop Jïmpk entre dans les Pilules aftringentes de la Pharm, de Paris. PLANCHE 397. Myrthus brabantica^ Piment royal. ON fe ferr, de toute la plante, principalement des Commués. C'eft un fous arbrifTeatt. La racine eft dure & flexible. Les tiges s'élèvent de quatre pieds au moins* l'écorce eft. noirâtre, liffe • les feuilles font liftes, blanchâtres, d'une odeur aromatique aflez forte. Les fleurs font à chatons , courts , ftériles , çcailleux , luifants , d'un roux clair. Les fruits naiffent fur d'antres pieds ; ils forment de petites tètes, compofées de graines menues d'une odeur forte, couvertes par de petites écailles : il fleurit au printemps. Tout le fous arbriffeau eft odorant & d'un gout très-amer. Il vient aux lieux marécageux. Ver tus. Il eft réfolutif, deflîcarif, fortifiant; mais fur-tout vermifii' gea intérieurement & extérieurement. C'eft là fon grand ufage.

The text on this page is estimated to be only 18.25% accurate

TOME TROISIEME. N. PLANCHE 39^. Napellus , Aconit bleu, Viv. ON fe fert des feuilles. La racine eft grofle comme un petit navet, noire en dehors , blanchâtre en dedans. La rige s'élève de trois pieds & plus, lifiTe, moclleufe j les feuilles font verd obfcur, lifTes. Les rieurs font à cinq pétales îrrégulicrs en cafque, bleues; il leur fuccede un fruit difpofé en manière de tête, à plu fie ur s çapfules quarrées , membraneufes , longues , lilTes , qui contiennent plufieurs graines menues, noires, anguleufes, ridées: elle fleurit en été. Elle vient aux lieux montagneux , dans la forêt noire , fur les Alpes , en Siléfie. On la cultive dans les Parterres , pour la beauté de fa fleur. Vertus. Elle eft très-dangereufe & même poifon , prife intérieurement, cependant fon extrait à la dofe de deux grains eft fudorifique. Extérieurement le fuc des feuilles eft déterfif. PLANCHE 399. Napus , Navet, B. Ann. ON fe fert de fa racine & graine. La racine eft oblongue , droite en terre , ronde , diminuant de grofleur & menue vers le bas , charnue , blanche ou jaune , ou noirâtre en dehors , blanche en dedans , d'un gout doux & piquanr , agréable. La tige s'élève de deux à trois pieds ; les feuilles font un peu rudes. Les fleurs font à quatre pétales , jaunes ; il leur fuccede une goiuTe , longue d'environ un pouce, ronde, partagée en deux P 4

The text on this page is estimated to be only 16.04% accurate

'14« . INDIGENES. loges , remplies de graines prefque rondes , rougeâtres 3 d'un ?o âcre , un peu amer : elle fleurit en été, ^ On la cultive dans les champs. Vertus. La racine eft béchîque , déteriive , adouciffante en décoction Extérieurement elle eft digeftive , i éfolutive , calmante. * La graine en infufion eft incifîve, apéritive, diurétique. Il y a un Navet fauvage, qui reflemble beaucoup au Navet précédent; les différences font que fa racine eft plus petite qu'elle a un gout âcre & que fes feuilles font plus découpées. ' Elle a les mêmes vertus que la précédente \ on la préfète même en Médecine. Sa graine entre dans la Thériaque , fous lç nom de Semcn iunïados. PLANCHE 400. Narciffo-Leucoium , Perceneige, Viv, ON fe fert de fa bulbe ou oignon. La racine eft compofée de plufieurs fibres blanchâtres1 furmontées d'une bulbe ou oignon , compofé de plufieurs enve-. loppes blanches, recouvertes par une enveloppe extérieure brune. Les feuilles font très-vertes , liufantes. Le pédicule dç la fleur s eleve d'un demi-pied ou plus , anguleux , creux ; la fleur eft à fix pétales blancs , l'extrémité de chaque pétale eft taché de verd ; elle a une odeur agréable ; il lui fuccede un fruit oblong , relevé de trois coins , féparé en trois loges , remplies de graines arrondies s dures , d'un blanc jau-ïiârre: elle fleurit m hiver. Elle vient dans les prés humides , dans les bois. Vertus. Son oignon, eft un vomitif doux.

The text on this page is estimated to be only 18.29% accurate

TOME TROISIEME. PLANCHE 40I. Najïarùum hortenfe Creffon alenois , Ann. ON fe fert de fes feuilles & graines. La racine eft dure , blanchâtre, fîbrée , un peu acre. La rige s'élève d'un pied Se plus, lifte, couverte d'une pouffiere bleuâtre j les feuilles ont un gout âcre. Les rieurs font à quatre pétales , d'un blanc pourpré ; il leur fuccede un petit fruit applati , à deux loges, une graine dans chacune, rougeâtre, d'un gout poivré : elle fleurit en été. La plante s'entretient verte tout l'hiver. On la cultive dans les Potagers. PLANCHE 402, Najiurùum verrucarium , Crellon fauvage, Ann. ON fe fert de toute la plante, La racine eft allez groffe , oblongue. Les tiges font couchées à raze-terre, leur longueur va vers huit pouces ; les feuilles ont une odeur & un gout approchant du Crelïbn. Les fleurs font à cjuatre pétales, blanches ; il leur fuccede un fruit rellemblant à une verrue ; cette verrue renferme des graines arrondies , noires, de la figure & du gout de la graine de celui ci-delfus : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux humides, le long des chemins. PLANCHE 403. Najlurtium aquaticum , Greffon d'eau, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft blanche , filamenteufe , rampante , & pouffe Je diftance en diftance des fibres qui s'enfoncent en terre. Les tiges, qui font d'abord courbées , s'élèvent enfuireàdeux pieds, creufes, cannelées, litres; les feuilles font toujours vertes, d'un verdbrun, fucculemes , odorantes, d'un gout poivre agréable.

The text on this page is estimated to be only 18.64% accurate

M* INDIGENES. Les fleurs font à quatre pétales, blanches; il feur une gouffe longue , un peu courbe , divifée en deux loges r pues de graines prefque rondes , rcugeâtres, d'un eout âcre l~ fleurit en été. ats Elle vient dans l'eau des fontaines, de autres eaux vive* « courantes, 85 Vertus et Usages des trois Cressons. Le Greffon alenois eft incifif , antifeorbutique , apéritif. Le Creflon fauvage a les mêmes vertus , mais plus douces Le Creflon d'eau eft antifeorbutique par excellence, d'ailka il a les vertus du Creflon alenois. ' ' Les graines du Crefon alenois entrent dans l'EIeduaire de Mi cléra, les Trochifques de Câpres, l'Emplâtre Diabotanum Le feuilles entrent dans l'Eau antifeorbutique de la Pharmacopée de Pans. Le Creffon fauvage entre dans le remède pour la pierre de Mademoifelle Scéphens. Les feuilles du Creffbn d'eau entrent dans la Décoction antifeorbutique, l'Eau générale antifcorVique , le Sirop antifeorbutique de la Pharmacopée de Paris. L'Eau diftiUét entre dans l'Eau pour les gencives de la même Phartn», copée. PLANCHE 404. Nafîumum indicum majus, grande Capucine, Ann. ON fe fert de fes feuilles & fleurs. La racine eft blanche , rampante , fibreufe. Les tiges font , ou rampantes , ou grimpantes , en s'entortillant autour des corps quelles rencontrent; les feuilles font verd clair en deffus Se liffes , plus pâles en deflbus & un peu velues. Les fleurs font à cinq pétales , d'un beau jaune , barbues à leur naiflance où elles fe terminent par un éperon creux , très-odorantes-, il leur fuccede un fruit à trois capfules, ridées, qui renferment chacune une graine prefque ronde. Naflurtium indicum minus > petite Capucine , Ann. Elle reffemble à la précédente ; mais elle eft plus petite en toutes fes parties. Les trois pétales qui font le bas de [z fleur, font marquées d'une tache couleur de feu.

The text on this page is estimated to be only 18.32% accurate

TOME TROISIEME. î45 Elles viennent toutes deux des Indes; elles fleurirent en été y X on les cultive dans les Jardins. Vertus des deux Capucines. Elles font antifeorbutiques , 5c ont, quoique plus faiblement ; les mêmes vertus du Greffon alenois ci-deffus, Pl. 401. PLANCHE 40 y. Nepeta , Herbe au chat , B. Ann. ON fe fert de la plante. La racine fe divife en plufieurs branches. La tige s'élève à trois pieds & plus , quarrée , velue , yerd blanchâtres les feuilles font lanugineufes, blanchâtres, d'une odeur forte de Menthe, d'un gout aromatique. Les fleurs font monopétales en gueule, blanc pourpre-, il leur fuccede quatre graines ovales au fond du calice : elle fleurit (ri été. Toute la plante eft- aromatique, arrière. Elle vient aux lieux incultes , humides. Vertus et Usages. Elle eft apéritive, hyftérique, eninfufion, dans l'eau ou dans le vin. , r Les feuilles entrent dans l'Eau générale, les Trochifques hyitéciqnes de la Pharm. de Paris. Toute la plante entre dans le Sirop d'Armoife. les fommkés entrent dans la Poudre Chalibee. PLANCHE 4°^' Ner'wn , Laurier rofe. ON fe fert de fes feuilles, C'eft un fous-arbriffeau. La racine eft longue , dure, liffe, d'un gout fale. Les tiges font verd pâle, droites, fucculentesj les feuilles font verd brun en deffus, blanchâtres en deffous. Les fleurs :bnt monopétales en entonnoir , découpées en cinq, rouge clair ou blanches $ il leur fuccede une longue Clique , qui renferme plufieurs graines aigrettées : il fleurit en été.

The text on this page is estimated to be only 17.62% accurate

244 INDIGENE & Vertus et Usages. Intérieurement c'eft un poifon. Extérieurement les feuilles font digeftives , réfoliuives il ■ taire s. 5 IeïtElles entrent dans la Poudre fternutatoire de la PUt^ , Paris. lm"

The text on this page is estimated to be only 20.50% accurate

T O M E TROISIÈME. ^•coupées en cinq ; il leur fuccede des capfules comme aux précédentes, remplies de petits grains, jaune tanné, d'un gout ■kre : elle fleurit en été. Elle vient en Amérique. Vertus et Usages des trois Tabacs. Elles ont routes trois à peu près les mêmes vertus j ce fdfft

The text on this page is estimated to be only 16.43% accurate

INDIGENES. E PLANCHE 412. Nigella cretieay Nielle du Levant, Ann. Lie reffemble aux deux autres ; les différences s'apperçoivent aifément dans l'eftampe. La graine de celle-ci a une fort8 odeur de Cumin : elle fleurit en été. Vertus et Usages des trois Nieliesi Elles font incifîves, apéritives, pectorales, hystériques. Nota. Que cjuand ces graines font récentes , elles ont une humidité pernicieufe , qu'il faL» &ire évaporer en les fechaut & torïéfiaiir. , avant crue ds Jes employer. La graine entre dans le Sirop d'Armoife, I'Eleéhiaire ds baies de laurier, les Troc'iifques de Câpres , l'Huile de Scorpion., PLANCHE 413. Nigellaftrum , Nielle des bleds, Ann. ON fe fert de fes feuilles, La racine eft petite , blanche. La tige s'élève à trois ou quatre pieds, velue, creufe; les feuilles font velues , blanchâtres. Les rieurs font à cinq pétales , purpurines , rayés de pourpre foncé ; il leur fuceede un fruit ou capfule, remplie de plusieurs grolfes graines, rudes, anguleufes , noires, d'un gout amer: elle fleurit en été. Elle vient parmi les bleds. Vertus. Les feuilles font aftringentes ; elle eft de peu d'ufags. PLANCHE 4r4* Noli-me-tangere , Balzamine jaune, Ann# ON fe fert de toute la plante. La racine eft fibreufe & à fleur de terre. La tige s'élève d'un pied de demi,, luifance, creufe, noueuie*

The text on this page is estimated to be only 18.07% accurate

TOME TROISIEME, M7 empreinte, d'un fuc infipîde ; les feuilles font d'un beauverd, féculentes. ^ Les fleurs font a quatre pétales irréguliers , jaunes , terminées à leur origine , par une queue creufe en crochet ; il leur fuccede iin fruit en façon de filique, d'un blanc verdâtre , rayé de lignes vertes, contenant des graines oblongues, d'un cendré blanc, que le fruit, en s'ouvrant, chatte au loin : elle fleura en été. Elle vient dans les bois , aux lieux humides. Vertus. Elle eft diurétique , apéritive ; on la prend en décoction. Extérieurement elle eft vulnéraire, déterfive, réfolutive. PLANCHE 41 f • Nummulana y Herbe aux écus, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft traçante , menue, fibreufe. Les tiges fe couchent à terre, longues d'un pied, plus ou moins, anguleufes; les feuilles fonr verd jaunâtre, d'un gout fort aftringent. Les rieurs font monopétales , découpées en cinq , jaunes ; il leur fuccede des fruits ronds , qui renferment de très-petites graines : elle fleurit en été. Elle vient prefque par-tout , aux lieux humides & aquatiques. Vertus et Usages. Elle eft vulnéraire , aftringente , confolidante : la dofe en pondre eft un fcrupule. Extérieurement elle a les mêmes vertus. Le fuc entre dans l'Emplâtre Oppodeltoch. PLANCHE 41^' Nymphœa alba , Nénuphar blanc , Viv. ON fe fert de fes rieurs & racines. La racine eft un peu plus grotte que le pouce , fibrée ; longue , charnue , pleine d'un fuc vifqueux , brune en dehors , blanche en dedans.

The text on this page is estimated to be only 20.43% accurate

4$ INDIGENES. Elle n'a point de tiges ; les feuilles nagent fur la fin-Face tfe l'eau , verd clair en deflus , plus foncé en delTous , d'un g0ut d'herbe fade. Les pédicules des fleurs s'élèvent jufqu'àla fuperfîde de l'eau . les fleurs font àplufieurs pétales, blanches comme celles du Lail leur fuccede un fruit rond , gros comme une petite pomme reffemblant à une tête de Pavot, partagé en plufieurs kmes' pleines de grains oblongs, luifants, noirâtres. PLANCHE 417. Nymphœa lutea} Nénuphar jaune, Viv. ON fe fert de la racine; La racine eft beaucoup plus groffe que celle de la préce* dente , & verte en dehors. La plante reflemble à la précédente ; les différences font qse les feuilles font plus allongées, que la fleur eft jaune & plus retferrée en elle-même, que le fruit a la forme d'une Figue, contenant des graines plus blanches, Toutes les deux fleurirent en été. Elles viennent dans les eaux, ou dormantes, ou courantes* Vertus et Usages des deux Nénuphars; Elles ont toutes deux les mêmes vertus, cependant 011 préfère les fleurs du Nénuphar blanc , & les racines du jaune. Les fleurs & racines font rafraîchiflantes , calmantes , narcotiques , en tifane. Les fleurs du blanc entrent dans le Sirop de Tortue , la Poudre Diamargaritum frigidum. Le Sirop entre dans les Pilules hypnotiques. L'Huile entre dans le Baume hypnotique. VEau diftillée entre dans le Looc commun de la Pharm. de Paris. Les ' racines du jaune entrent dans la Poudre & dans les Trochifque"4 de la Pharm. de Paris. 0% -m PLANCHE

The text on this page is estimated to be only 15.38% accurate

TOME TROISIÈME; PLANCHE 418. Ocimum majus , Bafilic commun , AnnV ON fe fert des feuilles , fleurs & graines. La racine eft dure , noirê , fibrée. La tige s'élève d'un démi-pied & plus , 'velue : les feuilles font lifles, dune odeur force aromatique, agréable: elles n'ont point de goût. Les fleurs font monopoles en gueule, d'un blanc purpurin 3 tres-odoranres> il leur fuccede quatre graines au fond du calice^ Ocimum minus, petit Bafilic , Ann. La racine eft fibreufe, fort menue. La tige & fes rameaux ont cinq ou fix pouces de hauts les feuilles ont une odeur tres-forte & trè Agréable, tirant fur le Girorle ou lut lé Citron. Les fleurs & graines comme le précédent : Us fleurijTent en été, On cultive le premier en pleine terre, dans les jardins . & le fécond dans des pots. Vert0set Usages des deux Basilics. On peut fe fervir indifféremment des deux: mais le premier e(t le plus en ufage. Le Bafilic eft céphalique, cotdial, pedtoràl; on prend le* feuilles & fleurs feches , en infufion, comme lé Thé. Sa Poudre eft ftern aratoire. Les feuilles entrent dans l'Eau générale , Hyftérique , de Menthe compofée, l'Efprit carminatif de SUVius. La graine entre dans la Poudre Diarrhodon, réjouiflante , le Sirop d'Armoife, l herbe entière entre dans l'Onguent Martiatumi q

The text on this page is estimated to be only 16.58% accurate

INDIGENES. PLANCHE 4J9Oculus bovis 3 Œil de bœuf, Ann. ON fe fert de la plante. La racine eft dure Se ligneufe. La plante s'élève jufqu'à deux pieds, duvetée; les feuilles ont une odeur de Camomille , Pl. 11 5 . Les fleurs font radiées jaunes; il leur fuccede des graines menues , anguleufes : elle fleurit en été. Elle vient en Italie , en Allemagne ; on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. Elle eft déterfvve , vulnéraire } émollience , réfolutive ; on la fubftitue à la grande Marguerite , Pl. 1 67* Elle entre dans l'Eau vulnéraire. PLANCHE 42°* Mnantkc major aquatica 3 Perfil de Marais, Viv. ON fe fett de la racine. . La racine reffemble à des Navets, noirs en dehors, blancs en dedans, garnie de longs filaments, qui s'étendent de

The text on this page is estimated to be only 19.06% accurate

TOMÉ TROISIEME. i$t P L A N C H E 42-1. Olea , Olivier* ON fe fert de fon fruk. C'eft un arbre de taille médiocre^ Les racines font en partie droites, en partie rampantes à fleut de terre , fermes , dures. Lecorce eft iuTe, cendrée, le bois jaunâtre, un peu amerj les feuilles font verd jaunâtre en deflus , blanchâtres eh deflous» Les rieurs font monopétales , refendues en quatre , blanchâtres; il leur fuccede un fruit nommé Olive , oval , charnu, verd d'abord , & jaune noirâtre étant mûr, plus ou moins gros , ou comme un grain de verjus, ou comme un œuf de pigeon, amer, acre, défagréable, renfermant un noyau dur, qui contient une amande : il fleurit en été. Quand les Olives font préparées, elles deviennent agréables i manger. Il vient en Efpagne ■, eh Italie & dans nos pays chauds. Vertus et Usages. Les Olives font ftomachiques , un peu laxatives^ L'huile d'Olive eft adoucilfanre , émolliente ; elle eft ia bafô des Baumes, Onguents & Emplâtres. L'huile entre dans le Baume tranquille, de Leucatel, Verd de Mets, l'Onguent Mondificatif d'Ache , le Bafilicum , l'Onguent de la Mere , des Apôtres , le Marriatum , &c- L'Emplâtre Diachilum fimple, Divin >, Diapalme, de Nuremberg , la toile à Gautier, &c, OHvellay Garoupc,Viv. On fe fert de la planre. La racine eft dure , ligneufe. Les tiçes s'élèvent de deux pieds & plus. Les fleurs font monopétales , refendues en trois , jaunâtres ; il leur fuccede des fruits peu charnus , rouges , à trois noyaux très-durs , qui renferment chacun une ou deux graines oblongues. La plante refte toujours verte : elle fleurit en été. Toutes fes parties ont un gout âcre Se brûlant. Q 1

The text on this page is estimated to be only 18.89% accurate

ÎSi INDIGENES. -Elle vient en Efpagne &c dans nos pays chauds , aux lieux jn. cultes & défères. Vertus. C'eft un purgatif hydragogue, à la dofe d'un ou deux groson s'en fert rarement. PLANCHE 422. Onobryckis , Sainfoin, Viv. ON fe fert des feuilles. La racine, eft dure , longue , fibrée , noire en dehors blanche en dedans. Les tiges s élèvent à un pied 8c demi & pins ; les feuilles fofit blanches Se velues en deffous, d'un gout amer, d'une odeur légère de bitume. Les fleurs font légumineufes , blanchâtres , rayées de pourpre*, il leur fuccede de petites gouffes épineufes , qui renferment une graine taillée en rein : elle fleurit en été. On la feme dans les champs , où elle forme une prairie artificielle. Vertus. La déco&ion eft fudorifique ; on s'en fert rarement» PLANCHE 423Onopordon 3 Chardon aux ânes , B. Ann» N fe fert de fa racine. La racine eft grofle & branchue , d'un gout aromatique. o La tige s'élève â quatre ou cinq pieds, cannelée, creufe, cotonneufe j les feuilles font cotonneufes deflus, & deflous bordées d'épines. Les fleurs font foutenues fur des tètes épineufes -, elles font a fleurons purpurins:, il leur fuccede des graines anguleufes, aigrettées , d'un gout âcre , un peu amer : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes , au bord des chemins.

The text on this page is estimated to be only 18.51% accurate

TOME TROISIEME. iSÎ PLANCHE 4Z4* Onopordon capîte tomentofo } Pet d'âne , B, Ann. LA racine eft grofle & branchue , d'un gout aromatique, La tige eft haute de quatre pieds, cotonneufe , cannelée fans épines ; les feuilles font verd noirâtre en deflus , duvetées delfous, garnies d'épines de cous côtés. Les rieurs fortent d'une tête ronde, épineufe, entrelacée &\m duvet blanc Se délié ; elles font à fleurons pourpres*, il leur: fuccede des graines cendrées, oblongues , luifanres, enveloppées dans une matfe de filets cotonneux ; la tête ronde s'ouvre & fe corrille en dehors comme un bourrelet. Vertus des deux Chardons. Le premier pafTe pour apéritif, diurétique, carminatif, rêfolutif. Le fécond eft de peu d'ufage en Médecine. PLANCHE 425'Ophoglojfum , Langue de ferpenc, Viv. N fe fert de la plante. La racine eft un amas de fibres menues, s'enfonçant en La tige s'élève de iix pouces , droite , accompagnée vers le bas d'une feule feuille, charnue, lifte , d'un gout douceâtre s. un peu vifqueux ; le haut de la tige eft terminé par un fruit long & pointu , divifé en grand nombre de petites cellules quarrees qui, en s ouvrant , laiflem aller une poulliere fine. Elle vient dans les prés humides. Vertus et Usages.. Elle eft vulnéraire , aftringente , infufée dans l'huile. Les feuilles entrent dans le Baume vulnéraire , Oppodelroeh , de la Phanrj. de Paris. Ophris , Double feuille, Viv. On fe fert de fa racine êi feuilles. Qî 0 terre. i

The text on this page is estimated to be only 18.12% accurate

M4 . INDIGENES. t La racine eft grife, fibreufe , s'érendant de côté & d'autre d'un gout âcre , vifqueax , un peu amer. J La tige eft droite & s'élève jufqua un pied & plus-, elle n' que deux feuilles qui i'embrafTent vers le bas } toute la plant* a un gouc vifqueux. Les fleurs panent de la tige, par rangées jufqu'au haut' elles font à fix pétales irréguliers , de couleur verdâtre ; il |eiJ fuccede un fruit à trois côtes, quilaiflent du vuide entre elles comme trois fenêtres ; elles contiennent quantité de graines menues comme de la fciure de bois ; elle fleurie au printemps Elle vient dans les bois ôc aux lieux humides. Vertus. Extérieurement elle eft vulnéraire , déterfive , confondante. PLANCHE 426, Opulus , Aubier, ON fe fert de fes fruits. C'eft un arbrifleau. La racine eft grotfe , terme , blanche. La tige monte à huit ou dix pieds , l'écorce eft liflTe , cendrée. Les rieurs font monopétales, découpées en cinq, difpofées en parafol , très-blanches; celles du tour font les plus grandes; elles font ftériles, les petites font fertiles ; il leur fuccede une baie ovale , plus grolîe que celle du Sureau , Pl. 511, rouge , d'un gouc très-défagréabîe , renfermant une graine en forme de cœur, ïouge, dure. Il vient aux lieux humides & marécageux. Vertus. Les baies font un vomitif doux . à la dofe de deux gros. 11 eft peu en ufage.

The text on this page is estimated to be only 19.22% accurate

TOME TROISIEME. 25J PLANCHE 4Z7Orchis morios mas 3 Satyrion, Yiy. ON Te ferc de fa racine. La racine eft compofée de deux tubercules prefque ronds ; charnus, gros comme des noix; l'un des deux eft dur, plein d'une pulpe folide ; l'autre eft ridé & contient une chair molle & fongueufe ; ils font terminés en delïbus par de grottes fibres. La tige eft droite, haute d'environ un pied, cannelée; les feuilles ont en delïus quelques taches d'un rouge brun. Les rieurs font à fix pétales , irréguliers , inégaux , d'un pourpre blanchâtre vers le centre , parfemées de quelques points d'un pourpre foncé; il leur fuccede un fruit à trois côtes, qui contiennent de très-petites graines , rellemblant à de la fciure de bais : elle fleurît au printemps, Orchis militaris major , grand Satyrion. La racine eft comme la précédente ; mais les tubercules font plus gros & plus allongés. La tige s'élève d'un pied Se demi; les feuilles plus amples, fans aucune tache. f Les fleurs plus considérables, blanchâtres, parfemées de taches purpurines , odorantes; les fruits & graines comme la précédente : elle fleu ra au printemps. Ces deux plantes viennent dans les bois. Vertus et Usages des deux Satyrions, Viv. Elles font adouciflantes , pectorales , fortifiantes : la dofe en poudre eft de vingt-quatre grains. Le Satyrion entre dans l'tleduaire de Satyrio. PLANCHE 42^* Orcofelinum majus , Grand Perfil de montagne , Viv. ON fe fert de fa racine & graine. Les racines partent en nombre d'une tcte chevelue , grolfes du petit doigt, s'étendant beaucoup, noirâtres en dehors, r O 4.

The text on this page is estimated to be only 16.27% accurate

M$ INDIGENES. blanches en dedans , mucilagineufes , d'un sont de refîne am feuilles .. que la racine. Les rieurs font en parafol , blanchâtres ; il leur fiiccede deux graines accollées , ovales, applaties , rayées fur le dos : elle fleurit m été, J Elle vient aux lieux fablonneux & élevés. PLANCHE 4^9Orcofelinum minus , Petit Perfil de montao-ne Viv T A racine eft grofTe , chevelue à fon origine, charnue , blanJ_jche dehors 6ç dedans , empreinte d'un fuc laiteux , d'un gout acre , un peu amer & défagréable. La tige s'élève de deux pieds, cannelée , rougeâtre ; les feuille* font verd foncé , d'une odeur aromatique, d'un gout plus foible que la racine. Les fleurs font en parafol, blanches; il leur fuccede deux graines accoilces prefque rondes, applaties, rougeâtres, plus acres §ç aromatiques que les feuilles : elle fleurit en été. Elle vient aux mêmes lieux que la précédente. Vertus des peux Persils de montagne. Elles font apéritives, diurétiques, hyfténques, adoucihantefc o PLANCHE 430. Origanum majus , Origan, Viv. |N fe fert de la plantç. > Les racines font menues , fibreufes , obliques en terre.. La tige s ëleve de deux pieds, quarrée , velue; les feuilles font velues, odorantes, d'un gout âcre, aromatique. Les fleurs font monopétales en gueule, incarnates; il leur fuccede des graines prefque rondes, menues, renfermées dans le calice : elle fleurit en été. Elle vient dans les lieux élevés , fecs & montagneux , prefque par- tout.

The text on this page is estimated to be only 22.59% accurate

TOME TROISIEME. 257 Origanum minus , petit Origan, Viv, La racine eft roufleâtre, fibreufe. La tige s'élève de cinq à fix pouces, roufleâtre j les feuilles ont l'odeur de la précédente. Les rieurs lui font femblables ; elles font mêlées de bleu & de purpurin. Les graines font très-menues, arrondies, odorantes, d'un goot acre. Elle vient dans les bois. Vertus et Usages des deux Origans. Leurs vertus font les mêmes j elles font diurétiques , diaphorétiques, hyftériques, béchiques , en infufion : la poudre des feuilles & rieurs eft extérieurement céphalique. Extérieurement elles font réfolurives , adouciflantes. Les feuilles entrent dans l'Eau générale , le Sirop d'Armoife. Les fommïtés fleuries dans l'Eau vulnéraire , la Poudre de ChaJybé , l'Huile de petits chiens. Les fleurs dans le Sirop de Sraechas. Toute la plante dans l'Eleâuaire de baies de Laurier de la Pharm. de Paris. PLANCHE 43 I. Ornithopoiium 3 Pied d'oifeau, Ann. ON fe fert de la plante. La racine eft petite, blanche, fibreufe, chevelue, accompagnée de petits tubercules. Les tiges traînent à terre pour la plupart j elles s'allongent jufqu'à un pied & demi. Les fleurs font petites , légumineufes, jaunes , mêlées de pourpre & blanc -y il leur fuccede plufieurs filiques longues , applaties , courbées , terminées en pointe , imitant le pied d'un oifeau , remplies d'une graine à chaque étranglement , prefque ronde, imitant la graine de Rave : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes, arides. Vertus. Elle eft apérîtive , diurétique : la dofe en poudre eft un gros dans un verre de vin blanc. Extérieurement elle eft aftringente.

The text on this page is estimated to be only 18.46% accurate

5 INDIGENES. PLANCHE 432. Orobus 3 Orobe , Ann. ON fe fert de fa graine. La racine eft menue , blanchâtre. Les riges s élèvent d'un pied , anguleufes , liffes.. Les fleurs font légumineufes , purpurines , quelquefois blanches avec des lignes violettes; il leur fuccede des gonfles, longues d'un pouce, menues, pendantes, ondées de chaque côté blanchâtres , qui renferment des graines femblabies à de petits pois, rouges brunes, d'un gout légumineux , fans amertume: elle fleurit en été. Elle vient en Efpagne , en Italie ; on la cultive dans les champs. Vertus et Usages. Elle eft une des quatre farines réfolutives3 déterfive, apéritïve. Sa farine entre dans la Poudre Diapraflîo , TElecîuaire de Juftin , les Trochifques de Scille. PLANCHE 433Oryfa, Ris, Ann. ON fe fert de fa graine. La racine relîeinble à celle du froment. Les riges ou tuyaux s'élèvent à trois ou quatre pieds, cannelés. Les fleurs font à éramines , purpurines ; il leur fuccede des graines ovales , blanches , tranfparenres , dures , enfermées dans descapfules, cannelées, velues, terminées par une barbe '.elle fleurit en été. Elle vient dans les Indes Orientales, où on la cultive aux lieux humides & marécageux. Vertus. Elle eft adoucifTanre , cordiale, fortifiante, rafraîchiflante , pectorale, afttingence. 1

The text on this page is estimated to be only 20.22% accurate

TOME TROISIEME. 259 PLANCHE 434Oxicoccus j Canneberge, Viv. ON fe fert de fes fruits , feuilles & fleurs. La racine eft rampante , rougeâtre , garnie de fibres très-déliés. Les tiges s'étendent à raze-terre , longues de fepr à huit pouces , d'un rouge brun ; les feuilles font vertes en deflus , verd cendré en deflbus. Les fleurs font monopétales , découpées en quatre , purpurines ; il leur fuccede des baies fphériques , applaties , greffes comme une Grofeille, d'un jaune verdâtre , femées de points rouges , d'un gour aigre, partagées en quatre petites cavités, qui contiennent des graines très-menues : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes , aquatiques , maigres. Vertus. Elle eft rafraîcbiflante, déterfivej aftringente. P. PLANCHE 43 S' Pœonia mas } Pivoine mâle, Viv. ON fe fert de fes racines & graines , quelquefois des feuilles. La racine reiïemble à un Navet , grofle du pouce , fe divifant quelquefois en plufieurs branches, rougeâtre en dehors, blanche en dedans. Les tiges s'élèvent à deux ou trois pieds , tirant fur le rougeâtre ; les feuilles font luifantes, verd foncé, duvetées en delfous. Les fleurs font à plufieurs pétales purpurin clair ou foncé ; il leur fuccede plufieurs cornets velus , qui contiennent des graines grolfes , rondes, noires : elle fleurit au printemps. On la cultive dans les Jardins.

The text on this page is estimated to be only 17.96% accurate

it* INDIGENES.. Pceonia fœmina y Pivoine femelle , Viv.. La racine eft compofée de tubercules ou Navets garnis d

The text on this page is estimated to be only 20.29% accurate

TOMÉ t k O I "S I É M È. zSl PLANCHE 437Panicums Panis, Ann. ON fe fert de fa graine. La racine eft forte , fibreufe. Elle pouffe plufieurs tuyaux à la hauteur de trois pieds. Les rieurs font à étamines ; il leur fuccede des graines , ramaffées en tête longue, fetnblables à celles du Millet, Pl. 386; •mais plus petites , luifantes : il fleurit en été. On le cultive dans les champs, en Allemagne, en Italie, en France. Vertus. Elle eft apéritive, adouciuante; on peut la fubftituer au Millet. _ Extérieurement elle eft réfolutîve. PLANCHE 43 8. Papaver cornutum , Pavot cornu, Ann. ON fe fert de fes feuilles. La racine eft groffe du doigt , longue , noirâtre , empreinte d'un fuc jaune , de mauvaife odeur , d'un gout amer. La tige s eleve de deux à trois pieds , lifle ; les feuilles font verd de mer , velues. Les fleurs font à quatre pérales , jaunes ; il leur fuccede des filiques très-longues, rudes, partagées par une cloifon en deux panneaux , qui contiennent des graines rondes & fort noires ; elle fleurit en été. Elle vient aux bords de la mer Se aux lieux fablonneux. V I B. T U S. Elle eft diurétique.

The text on this page is estimated to be only 20.45% accurate

itft ÎNDIGENËS. o PLANCHE 439Papaver-rhtas , Coquelicoq, Ann. N fe fert de fa fleur. La racine eft grofle du petit doigt , blanche , fibrée , d'un gout amer. La tige s'élève à un pied Se demi , hériflee de poils ; les feuilles font verd brun , velues. Les fleurs font à quatre pétales , rouge foncé , gluantes , ayant une tache noire à la bafe de chaque pétale ; il leur fuccede de petites têtes ou coques, grofles comme une noifette, longuettes, de la forme de celles du Pavot noir ci-delfous , divifées en pluHeurs cellules, qui contiennent des graines menues > noirâtres! elle fleurit en été. Elle vient principalement parmi les bleds. Vertus et Usages. Elle eft adouciflante , diaphonique , aftringente : la dofe en infufion eft une pincée. Les fleurs entrent dans la décoction pectorale de la Pharm. de Paris. PLANCHE 44°' Papaver nigrum , Pavot noir, Ann. ON fe fert de fon fruit ou tête. La racine eft: grofle du doigt , empreinte d'un lair afflëïi La tige s'élève à trois pieds, lifleou médiocrement velue; les feuilles font verd de mer. Les fleurs font à quatre pétales, ou rouges, ou panaches; il leur fuccede des têtes ou coques arrondies , grolfes comme une petite prune , couronnées d'un chapiteau , qui contiennent en plufieurs cloifons , quantité de graines rondes , noires. Toute la plante eft empreinte d'an lait amer. On la cultive dans les Jardins.

The text on this page is estimated to be only 18.26% accurate

TOME TROISIEME, xS Vertu s. La tête a les mêmes vertus que celle du Pavot blanc Ï>1 loff ■ maïs plus fbibles; il en eft de même de l'huile qu'on tire des graines. PLANCHE 441. Parietaria 3 Pariétaire, Viv. ON fe fert de la plante. La racine eft fi breufe, rouffeâtre. Les tiges font rampantes pour la plupart , s'érendant de côté & d'autre , longues d'environ deux pieds , rougeâtres ; les feuilles font velues , rudes , luifantes , verd brun. Les fleurs font à étamines, fortant d'un calice refendu en quatre parties, d'un verd jaunâtre j il leur fuccede des capfules rudes , qui contiennent une graine oblongue , luifante , fembkble au pépin de raifïn : elle fleurit en été. Elle vient aux vieux murs, entre les pierres, quelquefois le long des haies. Vertus et Usages. Elle eft apéritive, diurétique, adouciflante, réfolutive t on emploie fa décoétion & fon fuc. Extérieurement elle eft émolliente. Ses fommités entrent dans le Sirop de Guimauve de Fernel. PLANCHE 442. Paftinaca > Panais , B. Ann. ON fe fert de fes racines & graines. La racine eft longue , plus grolfe que le pouce, charnue; jaunâtre, d'une odeur & d'un gout agréable, au milieu eft un nerf. La tige s eleve jufqu a quatre pieds & plus, cannelée , creufe, droite -y les feuilles font velues, verd brun , d'un gout agréable, un peu aromatique. Les fleurs font en parafol , jaunes ; il leur fuccede deux graines accollées, ovales , grandes , un peu cannelées : elle fleurit en été.

The text on this page is estimated to be only 21.68% accurate

i&4 INDIGENES. On la cultive dans les Potagers. Pâftinaca fylvejïris , Panais fauvage, B. Ànn; Cette plante diffère de la précédente , eh ce quelle eft moindre en tout & les feuilles plus petites ; elle vient aux lieux incultes; on peut la fubftituer à la précédente. Vertus*, Elle eft diurétique, hyftérique, vulnéraire, fébrifuge. PLANCHE 443PelliboJJa, Corneille, Viv> ON fe fert de la plante. La racine eft rampante à fleur de terre , rougeâtre. Les tiges s'élèvent jufqu'à trois pieds, droites, cannelées i velues; les feuilles font verd brun en dellus, pâles & lanugineufes en de (Tous. Les fleurs font monopétales , découpées en cinq , jaunes , d'un gout aigre , fans odeur ; il leur fuccede des fruits ronds , qui renferment des graines menues , d'un gout aftnngent. Elle vient aux lieux humides , près des ruuîeaux. Vertus. Elle eft vulnéraire , aftringente , en déco&ion ou en poudre, Extérieurement elle a les mêmes vertus. PLANCHE 444' Perfoïtata, Percefeuille, Ank. ON fe fert de la plante La racine eft grofle du petit doigt , un peu fibreufe , blanche , d'un gout doux , imitant celui de la Raiponfe, Pl. 4*>5>La tige s'élève d'un pied à un pied & demi , ronde , creufe, cannelée , d'une odeur un peu aromatique ; les feuilles font litCes , verd de mer , d'un gout acre. Les fleurs font en parafol , jaunes ; il leur fuccede deux graines accollées , oblongues , cannelées , noirârres : elle fleurit en ete. Elle vient dans les champs , parmi les bleds. Vertus.

The text on this page is estimated to be only 18.00% accurate

TOME TROISIEME. ^ Vertus. Elle eft vulnéraire, aftringente, féchée& en poudre. Exrérieurement elle a les mêmes vertus. L ANCHE Periploca, Scammonée de Montpellier, ViV» ON fe ferc de fon fuc laiteux. La racine eft prefque grotte du doigt , longue , bJanch** très-flbreufe , ferpentant au loin en terre , pleine d'un fuc laiteuse» Les tiges font farmenreufes, grimpantes j les feuilles ibhe lilTes, verd pâle. Les fleurs font monopétales blanches , découpées en cinq ; il leur fuccede des fruits à deux gaines , qui renferment àci graifies aigrettées , entourés d'une matière lanugineufe ; elle fie» rit en été. Toute la plante eft remplie d'un fuc laiteux. Elle vient dans nos pays chauds , le long de la mer & en Efpagftèi V E r t u s. Son fuc laiteux, épaiflî parla cuiflbn, devient noirâtre Si reflemble à la vraie Scammonée, Pl. 104, par fà couleur Si Ù vertu purgative. , PLANCHE 44^. Perjicaria mitis , Perfieaire, Ann. ON fe fert de fes Feuilles. La racine eftligneufe, fibrée, oblique en terré. La tige s'élève d'un pied, creufe, rougeâtre ; les feuilles Cotft marquées dans leur milieu d'une tache noirâtre. Les fleurs font monopétales , partagées en cinq» de coule;!-: purpurine ou blanchâtre j il leur fuccede des graines ovales , ap* platies, noirâtres. La plante a un gout un peu acide : elle fleurit en été* Elle vient aux lieux humides , aquatiques. R

The text on this page is estimated to be only 18.31% accurate

INDIGENES. PLANCHE 447. Perjîcaria urens 3 Curage, Ann. ON fe fert des feuilles. La racine eft pente, blanche, fibreufe. La tige seleve d'un pied ôc demi, Me, verd jaune j lesfeui[. les font verd pâle. Les fleurs font monopétales , fendues en cinq , purpurines j il leur fuccede des graines hiilantes , ovalaires , noirâtres ; elle fleurit en été. Toute la plante a un gout acre & mordicant. Elle vient aux lieux aquatiques , marécageux. Vertus et Usages des deuxPersicàires, La première eft afttingenre, décerfive, vulnéraire, en décoébion ou en infufion. Extérieurement elle eft vulnéraire. Les feuilles entrent dans l'Onguent Mondifîcatif d'Ache, la fommités fleuries dans le Baume tranquille, le Sel fixe dans [a Pierre medicamenteufe de la Pharmacopée de Paris, La féconde 3 nommée Curage , eft dérerfive , vulnéraire , aperitive : la dofe en poudre eft un gros , en décoction une poignée. Extérieurement elle eft adoucilfante , réfolutive, déterfive. PLANCHE 44^* Pervtnca minor 9 petite Pervanche, Viv. ON fe ferc de fes feuilles. La racine eft fibreufe. Les tiges font rampantes, longues, prenant racine de diftance en diftance. Les feuilles font lilTes , vertes , luifantes en delTus , plus pâles en deflbus, d'un gout aftringent, un peu amer. Les fleurs font monopétales, refendues en cinq, bleues; H leur fuccede, mais rrès-rarement, un fruir compofé de deux filiques, qui renferment des graines oblongues, fillonées d'un côté : elle fleurit en été.

The text on this page is estimated to be only 19.64% accurate

TOME TROISIEME. 1(f~ La plante eft toujours verte. Elle vient dans les bois & broffailles , aux lieux humides. Pervinca major, grande Pervanche, Vij. Elle reffemble en tout à k précédente ; mais elle eft beaucoup plus grande en toutes fes parties : voyez l'eftampe. Elle vient aux mêmes endroits & a les mêmes vertus. Vertus et Usages des deux Pïrvanchis. Elle eft vulnéraire , aftringente , fébrifuge : la dofe en infufiori eft rrois poignées de feuilles, fur dtux pintes d'eau. Extérieuremenr elle a les mêmes vertus. Les feuilles entrent dans l'Eau vulnéraire, le Mondificatif. d'Ache , le Baume Oppodelroch. PLANCHE 449Petafites 3 Pétafite, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft greffe, longue , brune en dehors , bîanchs en dedans , d'un gout acre, aromatique, un peu amer, d'une odeur agréable. La tige à fleurs s'élève de fept à huit pouces de haut; les fleurs paroiffent au premier printemps , avant les feuilles , qui ne forcent que lorfque cette tige eft fanée : elle eft greffe du doige, creufe, lanugineufe , garnie de petites feuilles. Les fleurs font à fleurons purpurins ; il leur fuccede des graines aigrertées. Les grandes feuilles font verd brun en deffus. Elle vient aux endroits frais &c humides. Vertus et Usages, Elle eft apéritive , hyftérique, réfohnive, vulnéraire, pectorale : la dofe eft en décoction , une once fur une pinte d'eau ou en infulion. Extérieurement elle eft réfolutive , déterfive. Elle entre dans i'Eau pronlactique , l'Orviétan; la racine £* fsuilks dans l'Emplâtre Diabotanum.

The text on this page is estimated to be only 18.97% accurate

INDIGENES. PLANCHE 4TO. Petrofelinum , Periîl, B. Ann. * ON fe fert de fa racine, feuilles fie graines. La racine eft grolfe du doigt & plus , longue , blanchâtre,1 profonde en terre, fibrée, d'un gout -agréable. La tige s-eleve de trois à quatre pieds , cannelée , creufe) les feuilles ont un gout piquant. Les fleurs font à parafol , jaune pâle ; il leur fuccede deux graines accollées, menues, cannelées, grifes., d'un gout un peu acre : elle fleurit en été*. On la cultive dans les Potagers. Vertus et Usages. La racine eft apéritive , fudorifique. La graine eft une des quatre femences chaudes mineures. Extérieurement les feuilles font vulnéraires,, réfolutives. La racine entre dans l'Eau générale, le Sirop de Guimauve,' ■des cinq racines apéritives , d'Armoife, le Philonium Romain, la Bénédide laxative , l'Hiera Diacolocynthidos. 'PLANCHE 4JI. Petrafelinum macedonicum } Perlîl de Macédoine , B. Ann. ON fe fert de fa graine. La racine eft longue, girofle, blanche, d'un gout acre. La tige s'élève d'un pied Se demi ; les feuilles font verd clair, d'un gor.r moins piquant que la précédente. Les fleurs font en parafol , blanchâtres ; il leur fuccede deux graines accollées , menues , oblongues , velues , d'une odeur aromatique , d'un gout acre : elle fleurit en été. Elle vien& en Macédoine, dans les rochers; on la cultivé dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. Elle eft difcufllve, carminative, hyftérique; Elle ancre dans la Thériaqus.

The text on this page is estimated to be only 18.77% accurate

TOME TROISIEME, PLANCHE 452. Peucedanum 3 Queue de pourceau, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft grofle a, longue , chevelue , noire en dehors, blanchâtre en dedans, empreinte d'un fuc jaune, d'une odeur de poix répugnante. La tige s'élève de trois pieds , cannelée creufe. Les fleurs font en parafol , jaunes ; il leur fuccede deux graines accolîées, longues ,. rayées , d'un gout acre , un peu amer : elk Jieurit en été. Elle vient aux lieux humides , ombrageux & vers la mer. Vertus. Elle eft apéritive, béchique, hyftérique ; la dofe eft un grosse la poudre , fur une once de miel blanc. Extérieurement elle eft déterfive. Elle eft de peu d'ufage à caufe de fa mauvaife odeur, ^ mmm 1 1 1 «ut «ni 1 iwiw ■» PLANCHE Phafeolus , Haricot, Ann. ON fe fert de fa graine, quelquefois des tiges & gouffès. La racine eft grêle , fibreufe. La îige grimpe en entourant les corps voifins; les feuilles font liftes. Les fleurs font légumineufes, blanches ou purpurines \ il leur fuccede des gouffes longues, jaunâtres, contenant des graines nommées Haricots, très-polies, taillées en rein, ou blanches ou jaunes , rouges, noires , &c. elle fleurit en été. On la cultive dans les champs. Vertus. Elle eft apéritive , émolliente , diurétique , hyftérique. Extérieurement la farine en eft émolliente , réfolutive. La cendre des tiges & gouftes eft apéritive.

The text on this page is estimated to be only 18.94% accurate

r N D I G E N E S. il— . ' E35SEX S LL-g 1 . . , J1UJ PLANCHE 454Phïllyrea^ Filaria. ON fe fert de fes feuilles. C'eft un arbrifleau. La racine eft grofle, enfoncée dans la terre. Les tiges s élèvent à huit ou dix pieds; l'écorce eft cendrée," un peu ridée ; les feuilles font verd foncé , toujours vertes , d'un go ne aftringent. Les fleurs font monopétales, découpées en quatre, d'un blanc verdâtre ; il leur fuccede des baies rondes , noires , d'un gouc douceâtre , un peu amer , qui contiennent un petit noyau rond de dur : il fleurît en été. Il vienraux environs de Montpellier, aux endroits incultes, dans les bois. On le cultive dans les bofquets. Vertus. Il eft aftringent Se rafraîchi [fan t -y mais on s'en fert rarement. PLANCHE 45 J. Phytolacca , Morelle des Indes 3 Viv. ON fe fert de la plante. La racine eft grotte comme la jambe, quelquefois beaucoup plus, longue d'un pied, blanche. La tige s'élève de cinq ou fix pieds , rougeâtre j les feuilles font hfles , verd pale. Les fleurs font à cinq pétales , rouge pâle j il leur fuccede une baie prefque ronde, fuccutente, ronge brun, renfermant quelques graines noires : elle fleurît en été. On la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. Extérieurement elle eft très-anodine; on s'en fert rarement. Elle encre dans le Baume tranquille.

The text on this page is estimated to be only 18.92% accurate

TOME TROISIEME. PLANCHE 45"<>Pibfkh, Pilofelle, Viv. ON fe fsrt de la plante. La racine eft longue du doigt , menue , fibrée. Les tiges font rampantes, farmenteufes , qui ne s'élèvent jamais & prennent racine de tiiftance en diftance ; les feuilles font garnies de poils , vertes en deflus , blanchâtres & lanugmeufes en detfbus , d'un gout aftringent. Les pédicules des rieurs font velus & s élèvent de fîx pouces ; les fleurs font à demi-fleurons jaunes ; il leur fuccede des femences menues, noires, aigrettées : ellejkurit en éte\ Elle vient aux lieux incultes & arides. Vertus et Usages. Elle eft aftringente , vulnéraire , déterfive , fébrifuge : la dofe de la déco£tion ou du fuc dépuré , eft depuis quatre jufqu a fix onces. (Les feuilles entrent dans le Baume vulnéraire de la Pharm. de Paris, o PLANCHE 457* Vimpindla, Pimprenelle , Viv. N fe fert de fes feuilles. La racine efl; longue , branchue , rougeâcre , entremêlée de quelques pecics grains rouges, d'un gout aftringent, un peu amer. Les riges s'élèvent d'un pied à un pied & demi , rougeatres , anguleufes. , . Les fleurs fortent de têtes rondes ; elles font monopoles , refendues en quatre , à étamines ; celles-ci font ftériles , d autres font fertiles , n'ayant qu'un piftile qui devient un fruit a quatre angles, de couleur cendrée, qui contient une ou deux grames obbngues , menues , brun roufleàtre : elle fleurit en ete. . Elle vient dans les prés &C autres lieux incultes ; on la cuxtive dans les Potagers. ^

The text on this page is estimated to be only 18.01% accurate

7 INDIGENES. Vertus et Usages. Elle eft. diurétique, apéritive , déterfive, vulnéraire, aftrio; genre, en décodion. Extérieurement les feuilles ou leur poudre font déterfives. Les feuilles entrent dans le Sirop de Guimauve, d'Althœa ' Je Mondifkatif d'Ache, l'Emplâtre de Bétoine. =1 PLANCHE 4j8, f yinguicula , GraiTette, Viv, ON fe fert de la plante. La racine eft compofée de quelques fibres blanches alTe* groifes. Les feuilles font verd jaunâtre , luifanres, un peu épaifies. Les^pédicules des fleurs deviennent hauts comme la main ; les fleurs font monopétales , découpées en deux lèvres, refendues en planeurs parties, terminées à leur bafe par un éperon creux; il leur fuccede une coque, qui renferme plufieurs graines menues, prefque rondes : elle fleurit au printemps. Elle vient aux lieux humides Se marécageux. Vertus. Extérieurement elle eft vulnéraire, confondante, adouciflànte. o PLANCHE 459* Piper indicum , Poivre de Guinée, Ann. |N fe fert de fes fruits ou capfules. La racine eft courte , fibreufe, La tige s'élève d'un pied & demi , anguleufe , velue j les feuilles font liftes, verd brun. Les fleurs font monopétales, refendues en cinq, blanchâtres; il leur fuccede une capfule longue , grofte du pouce , d'un beau pourpre foncé , luifiinte , partagée en dedans en deux ou trois loges, qui contiennent quantité de graines d'un jaune pâle, plates , formées en rein : elle fleurit en été. Toute la plante eft acre & brûlante, principalement le fruit. Elle vient en Guinée a au Bréul ; on la cultive dans les Jardins de Botanique,

The text on this page is estimated to be only 22.44% accurate

. TOME TROISIEME. a7| Ver t us. Les fruits verds, confies au fucre, font ftomachata' elle eft très-peu en ufage. PLANCHE 460. Pifum album , Pois blanc , Ann. j ON fe fert du fruîr. La racine eft grêle, fibreufe. Les tiges font creufes, verd de mer, flexibles, ne pouvant fe foutenir qu'à l'aide des côtes auxquelles les feuilles font attachées, lefquelles fe terminent par des mains, qui faifuTent tous, les corps qu'elles rencontrent. Les fleurs font légumineufes , blanches ; il leur fuccede des gouttes longues, charnues, qui fe féparent en deux; elles contiennent des graines blanchâtres, prefque rondes : elle fleurit, en été. Qn la cultive dans les champs & dans les Potagers. Vertus. Le fruit, ou graine, nommé Pois, eft émollienc, un peiâ laxatif. PLANCHE 461. Plantago major, grand Plantain, Viv. ON fe ferr de toute k plante. La racine eft courte , grotte du doigt , fibrée fur les côtés.' Elle n'a point de tiges ; les feuilles fe couchent ou s'élèvent peu de deffus terre, lifles , luifantes. Les pédicules des épis de fleurs s'élèvent d'un pied , un peu velus ; les fleurs font monopétales , découpées en quatre , blanchâtres ou purpurines ; il leur fuccede un fruit pointu , oblong, qui renferme plufieurs graines menues, ovales, rougeâtres ; elfo fleurit en été. Elle vient prefque par- tout, aux lieux incultes*

The text on this page is estimated to be only 21.17% accurate

Ijl INDIGENES. Plantago média } Plantain blanc , Viv. Celle-ci eft plus petite que la première , s'élevant cependant aufli haut, les épis plus courts, les feuilles toujours à plate terre, couvertes deflus Ôc delîous d'un duvet blanchâtre j les fleurs & fruits, comme au précédent. Elle vient aux mêmes lieux. Plantago minor , Plantain long, Viv. L'eftampe fufEt pour faire voir les différences de celle-ci à la précédente. Les feuilles font verd foncé , d'ailleurs tout eft égal. Elle vient dans les prés & lieux herbus. Vertus et Usages des trois Plantains. Les trois Plantains ci-deffus ont les mêmes vertus. Ils font vulnéraires, aftringents, réfolucifs, fébrifuges :1a dofe eft depuis fix jufqua douze racines, 6c demi-poignée de feuilles en infuhon. On préfère pour la fièvre , le Plantain long. Le fuc dépuré fe donne depuis deux jufqua quatre onces. La racine & les feuilles entrent dans la décoétion aftringente, le Sirop d'Althsea , de Confoude , ta Poudre contre la rage, le Baume vulnéraire. Les graines entrent dans la Poudre Diarrhodon, aftringente, contre l'avortement, l'Onguent de la Comteife. PLANCHE 4&2' Polium luteum3 Polium jaune, Viv. ON fe fert de fes fommités fleuries. La racine eft ligneufe , fibrée. Les tiges font dures , cotonneufes , répandues fur terre ; les feuilles font cotonneufes, blanchâtres. Les fleurs font monopétales en gueule , jaunes , d'une odeur forte aromatique , d'un gout amer; il leur fuccede une cap fuie, contenant des graines menues, rondes : elle fleurie en etc. Elle vient dans nos Pays chauds , fur les montagnes pierreules. Polium album 3 Polium blanc, Viv. Elle reifemble beaucoup à la précédente j les différences font

The text on this page is estimated to be only 18.70% accurate

TOME TROISIEME. l7$ qu'elle eft- moins cotonneufe & que fes fleurs font blanches ! elle vient aux mêmes lieux. \ " * Vertus et Usages des deux Polium. Les vertus font les mêmes ; on préfère le jaune. Elles font apéritives, diurétiques, hyftériques , alexipharrnaques , en infulion. Les feuilles du Polium jaune entrent dans l'Eau générale, Prophylactique. Les fommités fleuries entrent dans la Thériaque , le Mithridat , l'Hyera Diacolocynthidos, i PLANCHE 463. Polygala, Herbe à lait, Ann. ON fe fert de toute la plante. La racine eft menue, dure, blanchâtre ou purpurine» d'un goût amer, un peu aromatique. Les tiges fe répandent à terre, longues d'un demi-pied, d'un verd rougeâtre. Les fleurs font monopétales en tuyau, découpé en deux lèvres, bleues ou purpurines , quelquefois blanches ; il leur fuccede un fruit applati s divifé en deux loges, remplies de graines oblonges : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes , dans l'herbe. Vertus. Elle eft béchique, incifive. PLANCHE 464. Polygonatum y Sceau de Salomon, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft longue , horifontale, à fleur de terre, grofte comme le doigt , genouiliée de diftance en diftance par de gros tubercules blancs , fibrée , d'un gouc douceâtre. Les tiges s'élevenc d'un pied & demi & plus, Jilîès, d'une odeur dé/agiéable ; les feuilles font verd brun , luifantes en deffus, verd de mer en deUous, d'un goût fade. Les fleurs font monopétales en cloche, découpées en lîx,'

The text on this page is estimated to be only 19.03% accurate

k7S INDIGENES. blanches -, les bouts des découpures verdâtres^ il leur fuccede des baies, groiïès comme un grain de raifin médiocre, rondes, noi* rârres , conrenanc crois graines ovales , dures , blanches : elle fleurit au printemps. Elle vient dans les bois. Vertus. Elle eft vulnéraire , aftringente : la dofe en infufion e£t une tonce , dans un demi-feptier de vin blanc. Extérieurement elle a les mêmes vertusPLANCHE 46-5. Volyganum , Renouée, TraînafTe, Viv. ON fe fert de la plante. La racine eft longue, affez groftè, dure» tortue, rampante , fibrée , d'un gout aftringent. Les tiges fe couchent à terre où elles s'allongent d'un pied & plus ; les feuilles font liiïes , verd de mer. Les fleurs font monopétales, découpées en cinq, petites, blanches ; il leur fuccede une graine , enfermée dans une capfule; elle eft triangulaire, couleur de Châtaigne ; elk flwrït en été. La plante a le gout un peu acide 3 gluaat. Elle vient par- tout. Vertus et Usages. Elle a les mêmes vertus que la précédente , intérieurement & extérieurement : la dofe du fuc pour l'intérieur, eft de deux ou trois onces. Les feuilles entrent dans le Sirop de Confoude > la Décoction aftringente de la Pharm. de Paris.

The text on this page is estimated to be only 19.12% accurate

TOME TROISIEME. PLANCHE 466. Poly podium vulgarey Polypode, Viv; ON fe fert de fa racine. La racine a un pied & demi de long, approchant de la' grofleut du petit doigt , rampant à fleur de terre , ayant nombre de fibres capillaires 8c plulieurs petites verrues , roufleâtre en dehors, verdâtre en dedans, d'un gout douceâtre, un peu aromatique d'abord, & enfuite un peu acre , aftringent. Elle n'a point de fleurs apparentes ; les feuilles ont huit à dix pouces de haut, & font garnies à leurs envers de petites élévations rougeâtres , qui font des coques qui renferment une pouffiere fine , qui eft les graines. Elle vient dans les bois , entre les pierres , fur les troncs de* yieux arbres & fur les vieilles murailles. Elle eft verte toute l'année. Vertus ii Usages. Elle eft hépatique , apéritive , béchique : la dofe en déco6tîort eft depuis demi-once jufqu'à une once. Elle entre dans le Catbolicum, leLénirif, la Confection Hamech , l'Onguent de Arthanita , la Poudre contre la rage.

The text on this page is estimated to be only 3.50% accurate

/ V

The text on this page is estimated to be only 17.58% accurate

INDIGENES. Tome IV. PLANCHE 4^7. Populus nïgra , Peuplier hoir» ONfefert des bourgeons qui contiennent les feuilles* C'eft un grand arbre. La racine eft profonde en terre; îe rroric eft droit ; le hoii jaunâtre , ferme. Lorfque les boutons s'enflent au printemps* avant que les feuilles commencent à en fortir, ils font alors gros comme des Câpres, d'un verd jaunâtre, pleins d'un fus gluant, d'une odeur alfez agréable : les feuilles font IhTes, luifanteSi L'arbre mâle porte des chatons à êtamines , ftériles • l'arbrâ femelle porte des chatons & fruits, qui font des capfules ovales , Verres , qui contiennent des graines ovales , aigrettées 1 ilfiehrit au printemps 3 avant les feuilles. Il vient aux lieux humides, aquatiques. Populus ctlbd^ Peuplier bhnc* La racine fe répand vers la furface de la terre; l'écorcé eft line, blanchâtre; le bois eft blanc; les feuilles font lifles en delfùs, lanugineufes en deflbus. Les chatons & fruits font fernblables au précédent ; il flénlie en même- temps & vient aux mêmes lieux. Vertus et Usages des deux Peupliers* Les vertus font les mêmes ; le blanc eft de peu d'ufage. Ils font aftringents , adouchTants , intérieurement & extérieurement. Le noir eft la bafe de l'Onguent Popnleum , lequel entre dans le Baume Hypnotique } l'Onguent contre la gale , McmoirhoidaL

The text on this page is estimated to be only 17.78% accurate

iSo INDIGENES. PLANCHE 46.8. Porrum , Poireau , B. Ann. /"\N fe fert du bas de la plante, près la racine. _J La racine eft compofée de pîufieurs fibres, d'où part le bas de la plante, formé par plafieurs enveloppes l'une fur l'autre, en manière de tête, groile d'un ou deux pouces, lifte, blanche, d'un gout plus doux que celle de l'oignon , Pl. 207, La tige s'élève à quatre ou cinq pieds ; les feuilles font alternes. Les fleurs font à fix pétales , blanches , tirant fur le pourpre pâle ; il leur fuccede des fruits triangulaires , noirs , à trois loges, remplies de graines oblongues : elle fleurit en été'. La plante a l'odeur de l'oignon , mais plus douce. On la cultive dans les Potagers, Vertus. Elle eft diurétique , byftérique , béchique. Les graines font apéririves , à la dofe d'un gros dans le vin blanc. Extérieurement elle eft très-adouciflante. PLANCHE 4^9' Portulacca, Pourpier, Ann. if~\N fe fert de fa tige , fleurs & graines. La racine eft garnie de quelques fibres. Les tiges fe couchent fur terre, longues d'un pied, rongeatrès, liftes, luifantes, fucculeritesj les feuilles font liftes, d'un verd plus ou moins jaunâtre , d'un gout vifqueux , un peu acide. Les fleurs font à cinq pétales, jaunes j il leur fuccede des capfutes oblongues , faites en urnes, vertes, qui contiennent pîufieurs graines menues , noires : elle fleurie en été. On la cultive dans les Potagers. Pormlacca fylveflris , Pourpier fauvage , Ann. Elle reftemble à la précédente dans toutes fes parties ; feulement elle eft plus petite & fes feuilles plus vertes ; elle vient aux lieux incultes.

The text on this page is estimated to be only 11.57% accurate

TOME QUATRIEME Vertus et Usages des deux p0TÏIL,x; - ; *Sl Leurs vernis font égales. mifuge :la dofa du fuc * «^feïïS^^ gros, J * uc * e*tnu.c uû Les graines entrent dans FEleétuaire de Pfvllio U P ■ le Diaprun, la Confection d'HyacinriJ ■ a'Poudr fe' don, contre les vers. ume ^«hoPLANCHE 470. Primula-vcris , Primevère, Viv. S~\ N fe ferr des feuilles & fleuts. V/ La racine eft afTez grofTe, rou^eatre fihiv»„fc J> odeur arornatioue agréable , Wgout C^u S Ltnr^ Les feuilles font remplies d'un duvet trL court ; W pédicules ces fleurs s élèvent de hx i fept pouces, on peuvent , Lesfle,ll|rs foncmonopéralesetifoueonpe, refendues en cina jaunes; d leur fuccede des coques ovales, qui renferment pt mas graines menues , noires. P Toute la plante a un gourâcre, amer : elle fleurît au vrinteirvt Elle vient dans les prés & dans les bois. mf^f* Vertus et Usages. Elle eO; céphalique anodine : la dofe des fleuts en infuiïon elt une bonne pincée dans l'eau bouillante. Extérieurement les rieurs font calmantes. Elle entre dans l'Eau générale. o PLANCHE 471. Prunus fadva} Prunier. N fe fert de fon fruit, C'eft un arbre de médiocre grandeur. ^LVÛC\ne dlbranchue> longue, traçante, noirâtre; le bois et allez dur, rougeatre; l'écorce eft gris brun; les feuilles font unes, d un gour un peu amer, aftringenr. Les fleurs viennent au printemps, avant les feuilles ; elles font S z

The text on this page is estimated to be only 16.27% accurate

%U INDIGENES. à cinq pétales, blanches; il leur fuccede un fruit charnu, ou jaune, ou bleu , plus où moins gros , fuccuient, nommé Prune j doux & très-agréable au gout ; il renferme un noyau oval, dur, qui contient une amande. Vertus et Usages. Les Prunes font humectantes , émollientes , Iaxatives ; celles qu'on nomme le petit damas noir, font préférées en Médecine. C'eft communément avec cette efpece qu'on fait les pruneaux. La gomme quife trouve fur le Prunier & fur fes fruits, a les mêmes qualités de la gomme arabique , Pl. cj 5 . Les Prunes entrent dans les deux Electuaires Diaprun ,1a Confection Hamech, le Lénitif de la Pharm. de Paris. PLANCHE 472' Pfado-acaàa , faux Acacia. ON fe fert de fes fleurs. C'eft un grand arbre épineux. La racine eft longue, groffe, traçante» jaunâtre, d'un gout douceâtre. ,. , Les fleurs font légumineufes, blanches, d une odeur douce & agréable, imitant celle de la fleur d'orange ; il leur fuccede des aoufles longuettes, applaties , partagées en deux côtes ou font&renfermées des graines de la figure d'un rein : il fleurit au printemps. , Il vient au Canada, dans la Virginie; on le cultive dans nos pays. Vertus. Il eft antihyftérique , fur-tout les fleurs/ PLANCHE 473Pfyllium ereclum, Herbe aux puces, Ann. /"~\N fe fert de la graine. %^_J La racine eft blanche, fibrée. La rige s'élève d'environ un pied, ferme, velue amii que iec feuilles.

The text on this page is estimated to be only 18.73% accurate

TOME QUATRIEME. 2Sj Les fleurs font monopérales en tuyau refendu en quatre verd pâle -, il leur fuccede une coque à deux loges , renfermant deux graines reflembtantes à une puce : elle fleurit \n été Elle vient aux lieux incultes , dans les champs. PLANCHE 474Pfyllium fupinum , petite Herbe aux puces, Viv.. LA racine efl: longue , dure , garnie de fibres. Les riges font rampantes d'abord , puis fe relèvent à k hauteur de fix à huit pouces j les feuilles font verd. blanchâtre, velues ; les rieurs & fruits font femblables à la précédente : elle, fleurit au même temps.. Elle vient dans nos pays chauds & le long de la mer. Vertus et Usages des deux Hep. besaux r u c e s. Leurs vertus four les mêmes. On tire des graines un mucilage adouciflant & rafraîchiflant , intérieurement & extérieurement. La graine entre dans l'EIeétuaire de Pfyllio , le Reçûtes. Son mucilage entre dans les Trochifques de Camphre , de Karabé:, de Gordon. PLANCHE 475P ulmonarïa y Pulmonaire, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft blanche, fibrée, d'un gout vifqueux.. Les tiges s'élèvent d'environ un pied , anguleufes , veines , d'une couleur tirant fur le purpurin -y les feuilles, font garnies de duvet delTus & delfous , & marbrées de taches, blanchâtres. Les fleurs fonr monopétales en tuyau évafé , découpé en cinq., ou purpurines, ou violettes; il leur fuccede quatre graines, prefque rondes au fond du calice , reflernblantes à celles de la Buglofe : elle fleurit au printemps. Nota. Il fe trouve une autre Pulmonaire , qui ne diffère de la précédente que par fes feuilles, qui font plus étroites Se quelquefois fans taclie. Elles viennent toutes deux aux mêmes endroits, dans les bois, aux lieux montagneux. S3

The text on this page is estimated to be only 16.03% accurate

INDIGENES. PLANCHE 476. P ulmonaria Gallorum 3 Pulmonaire des François Vi v ï £ «ciné eft grotte, longue, rougeatre, fibrée, remplie JE — . d un iuc lai eux , amer. La tige s élevé jufqua un pied & demi, velue -, les feuilles lonr verdatres , marbrées ; de caches noires, velues en defliis blanchâtres & velues detfous, d'un gouc amer. Les fleurs font à demi-fleurons , jaunes; il leur fuccede pluhems graines oblongues, menues, noirâtres , aigrettées : elle jieuraen ete. 0 Elle vient aux lieux incultes, fur les vieux murs. Vertus et Usages des Pulmonaires. Elles onr les mêmes vertus. Elles font adouciifanres , vulnéraires , confondantes, béchi«jues : la dole du Sirop où on emploie les racines & les feuilles, elt une once ou deux. LesTeuilles entrent dans le Sirop de Tortue. Toute la plante entre dans le Sirop de Roflblis compofé. PLANCHE 477Pulfadlla, Coquelourdc, Viv. ON fe fert de fes feuill.s , fleurs & racine. La racine eft longue, grofle comme le doigt, Ample ou diviiee en plufîeurs têtes chevelues, noires, d'uA gouc un peu amer & acre. Les feuilles font velues, tres-âcres & brûlantes. Le pédicule de la fleur s'élève peu d'abord ; la fleur eft à fîx pétales, purpurine, velue en dehors, d'une odeur aflez agréable ; Je pédicule monte en fui te jufqu'a un pied ; au défions du milieu de la hauteur eft une feuille qui l'embralfe } il eft creux , couvert d un coton épais ; il fupporte un fruit compofé de plufîeurs graines, terminées par une longue barbe velue : elle fleurit au printemps. Elle vient aux lieux arides , montagneux.

The text on this page is estimated to be only 16.21% accurate

TOME QUATRIEME. i$s Vertus et Usages. Extérieurement elle eft ineifive , vulnéraire , fterniuatoire j la racine eft moins âcre que les feuilles. Les fleurs entrent dans l'Eau hyftérique de la Pharm. de Paris. PLANCHE 478. Pyrola } Pyrole, Viv, /~\y^ fe fert de fes feuilles. K^Jr La racine eft déliée, traçante, fibrenfe, blanche. La tige e(t haute d'environ un pied , anguleufe ; les feuilles font verd brun , liCTes , toujours vertes. Les fleurs font à cinq pétales, blanches, odorantes; il leur fuccede un fruit à cinq pans arrondis, divifés en cinq loges, remplies de graines menues comme de la fciure de bois : elle fleurit en été. La plante a un gout amer , très-aftringenr. Elle vient à l'ombre , dans les bois montagneux. Vertus et Usages. Elle eft vulnéraire , aftringente : la dofe en infufion eft une pmcee , oc en poudre un gros. Elle entre dans les Vulnéraires Suijfes. Le fucentie dans l'Onguent Oppodeltoch. PLANCHE 479. Pyrus , Poirier. ON fe fert du fruit , nommé Poire. C'eft Un arbre allez grand. La racine eft grotte ; elle s'enfonce avant en terre. Le tronc eft droit, plus élevé que celui du Pommier &Técorce plus raboteufe; le bois ferme, ronfleâtre ; les feuilles font îiifes , luifmtes en défias , blanchâtres en deiîous. Les rieurs font à cinq pétales, femblables à celles du Pommier , Pl. 360 ; il leur fuccede un fruit oblong , plus menu vers la queue, divifé dans le centre de fa pulpe en cinq loges, S4

The text on this page is estimated to be only 17.46% accurate

s8 INDIGENES. remplies de quelques graines nommées pépins , noirs, en de-» h.prs, blancs en dedans : il fleurit au printemps. On le cultive dans les Vergers j il s'en trouve quantité de variétés. jfVbrd, Qu'on trouve dans les forêts, un Poirier fauvagey il eft plu$ • petit en toutes fcs parties que le procèdent; le bois plus dur, les feuilles Janu^ineufes en dciious ; 'es rameaux (ont garnis depinçs dures ; les fleurs jçflemblent au précédent ; les fruits bien plus petits , durs , d'un gout âpre. Vjïrtus et Usages, Les Poires douces en général, font humectantes , rafraîchif, fautes. Le lue des Poires fauvages entre dans le Sirop de Myrte de 3a Pharm. de Paris. : PLANCHE 480, Quercus , Chêne. ON fe fert de fon bois , des feuilles & fruits. La racine elt très-gro(fè & profonde en terre. Le tronc eft gros, droit; l'écorce eft épaifle, rude, rougeâtrô çn dedans \ les feuilles font fans poil , d'un verd obfcur. Les fleurs mâles ou ftériles , font des chatons longs, diftribués par petits pelotons d cramines ; les fruits viennent à part, fur le même arbre ; on les nomme ies glands.; ils font compofés d'une cupule grife , raboteufe en delfus , hlle en dedans , de laquelle s'élève le fruit , gros comme une Olive, verd jaunâtre, qui renferme une amande blanche, compofée de deux lobes, d'un gout âpre : il fleurit au printemps* Cet arbre eft le plus commun des forêts* Vertus. ïl çft aftringent, dans toutes fes parties..

The text on this page is estimated to be only 23.57% accurate

TOME QUATRIEME. PLANCHE 4^1Quinque-folium , Quintefcuille , Viv. ON fe fert de la féconde écorce de fa racine. La racine eft longue , approchant de la gro fleur du petit doigt, fibreufe, noirâtre en dehors, rouge en dedans, d'un gout aftringenr. Les tiges font rampantes , longues d'environ un pied & demi, velues, rougeâtres , prenant racine de diftance en diftance j les feuilles font verd obfcur , velues. Les fleurs font à cinq pétales , jaunes j il leur fuccede un fruit, cpmpofé de plufieurs graines menues, difpofées en rond, enveloppées par le calice de la fleur : elle fleurit en été. Elle croît prefque par-tout , dans les prés , dans les bois. Vertus et Usages. Elle eft balfamique, vulnéraire, aftringente : la dofe de fon extrait efl un gros. Extérieurement les vertus font les mêmes. La racine entre dans l'Eau générale, la Thériaque. Les feuilles entrent dans le Baume vulnéraire. R. PLANCHE 4^2' Ranunculus bulbofus 3 Bacinct des prés, Viv, ON fe fert de fa racine. La racine reflemble à un très-petit oignon, fibre en deflbus. La tige s'élève de plus d'un pied , velue. Les fleurs font à cinq pétales, d'un beau jaune; les^feuilles du calice fe replient en bas ; il fuccede aux fleurs une tête ronde , formée par l'aflemblage de nombre de graines pointues : elle fleurit en été. Elle vient dans les prés & pâturages.

The text on this page is estimated to be only 21.11% accurate

i8S INDIGENES. Vertus et Usages, Elle eft extrêmement âcre & cauftique. Elle entre dans l'Emplâtre Diabotanum. PLANCHE 483. Ranunculus nemorofus 3 Bacinet blanc, Viv. ON fe fert de fes feuilles Se rieurs. La racine eft longue , rampante , fibrée , brune en dehors, d'un gout âcre, légèrement aftringent. La tige eft déliée , rougeâtre , haute de neuf pouces ; les feuilles font velues. Les fleurs font à fix pétales, ou blanches, ou purpurines; il leur fuccede un fruit pareil à la précédente : elle fleurit au printemps. Elle vient dans les bois. Vertus. Elle eft déterfive extérieurement , mais âcre 8c cauftique ; ce qui tait qu'il eft dangereux de l'employer. PLANCHE 484. Ranunculus repens 3 Bacinet rampant, Viv. ON fe fert de fes feuilles & fleurs. La racine eft rampante , compofée de plufieurs fibres blanchâtres. Les riges font velues, creufes, couchées fur terre, prenant racine de diftance en diftance; il s'élève des tiges qui portent les fleurs à la même hauteur de la première -y les feuilles font velues deflus & défions , verd noirâtre , avec quelques taches blanches en deflus. Les fleurs & fruits reflemblent à la première ci-deflus. Elle vient dans les prés & autres lieux incultes. Vertus. Extérieurement elle eft vulnéraire, déterfive, adoucilîante.

The text on this page is estimated to be only 17.88% accurate

TOME QUATRIEME. 289 PLANCHE 48J. Ranunculus paluflrïs , Grenouillette d'eau , Ann. ON fe fert de la plante. La racine eft groffe s creufe , fibrée , d'un gout fort Se brûlant. La tige s'élève à deux pieds & plus , grofle , cannelée , creufe ; les feuilles font verdâtres, luifantes. Les fleurs font petites , reffemblantes d'ailleurs à la première; les fruits font raflemblés en tête oblongue , formée par des grai* nés menues , liffes : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux aquatiques & marécageux. Vertus. Elle eft un poifon des plus forts , prife intérieurement. Extérieurement elle eft réfolutive. PLANCHE 486. Rapa. , la vraie Rave, Turnip, en Anglois , B. Ann. ON fe fert de la racine & graine. La racine eft ronde, grafle quelquefois comme la tète, charnue, de couleurs différentes en dehors , ou verte, ou blanche , ou jaune , ou rouge , fibrée en deffous comme l'oignon, blanche en dedans, d'un gout, ou doux, ou acre. La tige s'élève de deux pieds, quelquefois beaucoup plus; les feuilles font rudes , verd brun , d'un gout d'herbe. Les fleurs font à quatre pétales, jaunes; il leur fuccede des gouffes longues & étroites , partagées en deux loges , qui contiennent des graines arrondies , rougeâtres : elle fleurit en été. Nota. Que celle-ci eft nommée le mâle , pour la diftinguer d'une autre efpece pareille, qui n'a de différence que dans fa racine, qui eft allongée Se plus petite, qu'on appelle la femelle. On les cultive dans les champs , fur-tout en Limoufîn , où on la nomme la Rabioule, Les Anglois la nomment Turnip. Vertu s. Elle eft adouciffante, bechique, déterfive, en décoétion.

The text on this page is estimated to be only 19.10% accurate

INDIGENES. La graine efl: alexitaire ; elle encre dans la compofition des Anrid otes. Raphanus minor, Raifort, Rave des Pariiiens , B. Ann. ON fe fert de fa racine ôc graine. La racine eft: groffe du doigt, plus ou moins, charnue de couleur rouge vif en dehors, blanche en dedans, duagout acre & piquant. ° La rige s eleve de deux on rrois pieds ; les feuilles font rudes. Les rieurs font à quatre pétales , purpurines • il leur fuccedè des gomfes, partagées en deux loges , remplies de graines prefque rondes , rouges : elle fleurit en été. On la cultive dans les Potagers. 0 Vertus et Usages. Elle efl: diurétique : ta dofe du fuc eft trois, ou quatre onces avec le miel. La racine entre dans le Sirop de Guimauve. PLANCHE 488. Raphanus rufiicanus 3 Raifort fauvagc^ Vit. ON fe fert de la plante, principalement de fa racine. La racine eft rampante , groffe , longue , blanche, d'ua gout âcre & brûlant. La tige qui fupporte les rieurs , s'élève d'un pied & demi ; quelquefois elle vient à part des grandes feuilles , quelquefois au milieu. Les grandes feuilles font rudes , d"un beau verd. Les fleurs font à quatre pétales , blanches ; il leur fuccede de petits fruits ronds , partagés en deux loges , qui contiennent quelques graines arrondies , liifes , rougeâtres : elle fleurît au. printemps. Elle vient aux lieux humides 8c aquatiques ; on la cultive dans les Potagers

The text on this page is estimated to be only 20.68% accurate

TOME QUATRIEME. î?tVertus et Usages. Elle eft antifcorbutique, apéritîve, vermifuge, incifive , réfolucive i on fe fert de fon lue. La racine entre dans la déco&ion antifcorbutique , l'Eau générale, le Sirop antifeorbutique, de Guimauve compofé. Les feuilles & la racine entrent dans l'Emplâtre Diaboranum* PLANCHE 489. Rapunculus 3 Raiponfe, B. Ann. ON fe fert de la plante. La racine eft grofle du petit doigt , obîongue , blanche. La tige s'éleye jufqu a deux pieds , cannelée , velue ; les feuilles font empreintes d'un fuc laiteux. Les fleurs font monopétales en cloche , bleues , rarement blanches ; il leur fuccede un fruit, divifé en trois loges, qui renferment plulîeurs graines roufleâtres > luifantes : elle fleurit en été. Toute la plante donne du lait. Elle vient dans les champs , dans les prés. PLANCHE 49°Rapunculus fpicatus 3 Raiponfe fauvage, Viv. LA racine eft pareille en tout à la précédente. La tige s'élève à un pied & demi , anguleufe, creufe , laiteufe. Les fleurs font monopétales, découpées en cinq lanières, blanches ou bleues , ou purpurines ; il leur fuccede de petits fruits attendis , pareils aux précédents : elle fleurit au printemps. £lle vient dans les prés bas & parmi les broflailles. Vertus des deux Raiponses. On préfère la première j elles font apéritives, ftomachiques.

The text on this page is estimated to be only 18.39% accurate

INDIGENES. PLANCHE 49 1 * Refeda > Rcfcda , Viv. ON fe fert de la plante. La racine eft longue, dure, blanche, d'un gout acre. Les tiges s'élèvent d'un pied & demi , velues , cannelées ,'creufes ; les feuilles font vend brun , d'un gout d'herbe. Les fleurs font à fix pétales irréguliers , jaunâtres ; il Ieurfuccede des capfnles vertes à trois angles , remplies de femences nidnues , noires : elle fleurie en été. Toute la plante eft fort amere. Elle vient dans les champs, le long des chemins. Vertus. Extérieurement elle eft adouciflante & réfolutive. PLANCHE 49 2Rhamnus cathanicus , Nerprun, Bourg-épine. ON fe fert de fes fruits ou baies. C'eft un arbrifleau épineux. La racine eft longue & mince ; le bois eft jaunâtre ; l'écorce reflemble à celle du Noyer, PL jiz'j les feuilles font verd foncé , d'un gout aftringent. Les fleurs font monopétales en entonnoir découpé en quatre* jaunâtres; il leur fuccede des baies molles , grolfes comme celles du Genévrier, PI. 8 8 , noires, pleines d'un lue verd noir, un peu amer, contenant quelques graines noirâtres :il fleurit au printemps. 11 vient dans les bois & broflailles. Vertus. Les baies font purgatives , hydragogues : la dofe en pondre eft un gros & demi; en décoction quinze ou vingt baies ; 1 extrait depuis demi-once jufqu'à fîx gros ; le Sirop depuis une once jufqu'à deux.

The text on this page is estimated to be only 18.81% accurate

TOME Q U ATRIEME. i9S PLANCHE 493* R/ius folio ulrni, Sumach. ON fe fert de fes feuilles & fruits. C'eft an arbriffeau. La racine eft rampante, longue. Les rieurs font a plufieurs pétales, d'un blanc jaunâtre; il leur fuccede une capfule plate , verdârre , qui contient une graine arrondie, rougeâtre j le fruit a le gout acide, fort allongent; il fleurit en été. Il vienr aux lieux fecs & pierreux , aux environs de Montpellier ; on le cultive dans les Jardins de Botanique. Rhus Virg'iniana y Sumach de Virginie. C'efl: un arbriffeau. La racine elt rampante, fe divifant çà & là en plufieurs branches ; les pouffes ou rameaux tendres de l'année font garnies d'un velouté épais , comme le bois du Cerf quand il eft encore garni de fa peau , Pl. 707. Elles font empreintes d'un lait clair. Les épis des fleurs font pareillement veloutés. Les fleuts font à plufieurs pétales , rougeâtres -, il leur fuccede des fruits très-rouges , qui contiennent une graine applarie , noirâtre , d'un gout aigrelet : il fleurit en été. Il vient en Amérique ; on le cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages des deux Sumach s. Elles font les mêmes. lis font aftringenrs , rafraîchiffants , antifcorbutiques : ladolè des fruits eft une grappe dans une pinte d'eau froide. L'extraie fe donne à la dofe de deux gros ou demi-once.

The text on this page is estimated to be only 19.38% accurate

INDIGENES. PLANCHE 494* Rofa pàllida, Rofe pâle. « ON fe fert de fes fleurs. C'eft un fous-arbrifleau. La racine eft longue , dure. Les tiges & les branches font garnies d'épines , dures & pU quantes , attachées à une écorce d'un verd obfcur j les feuillet font du même verd. Les rieurs font formées quelquefois par cinq pétales, mais plus fouvent par des pétales fans nombre , d'une belle couleur de chair, d'une odeur très-agréable;, il leurfuccede un fruit dé la grofleur & figure d'une petite Olive, rouge, qui contient plufieurs graines anguleufes , blanchâtres , velues : il fleurît au printemps. \ On nomme le fruit GrattccuL On la cultive dans les jardins. Vertus et Usages* L'eau qu'on tire des fleurs eft purgative , céphalique, cordiale; la dofe eft depuis une once jufqu'à fix. Extérieurement elle eft vulnéraire, déterfive , aftringente. Elle entre dans l'Electuaire Diaphœnic, le Diaprun, l'Onguent Rofiit. Le fuc entre dans l'Emplâtre de l'Abbé de Grâce, Le Sirop fimph dans les Pilules d'Agaric, impériales , le Sirop compofé dans les Pilules angeliques. L'Eau dïfiUlee & l'Efpr'â ardent dans l'Eau de mille-fleurs. Rofa alha , Rofe blanche. La racine relfemble à la précédente. ; Les tiges s'élèvent davantage & jufqu'à huit ou dix pieds , garnies d'épines alfez clair femées. Les fleurs font à cinq pétales blancs, fouvent davantage, moins odorantes que la première ; les fruits lui reflemblent -.elle fleurit au printemps. On la cultive dans les Jardins* Vertu s. Elle n'eft point purgative; elle eft ophthalmique , aftringente, extérieurement. PLANCHE

The text on this page is estimated to be only 13.22% accurate

o PLANCHE 495* Rofa mofchata > Rofe mufcate; N fe fert de fes fleurs. La racine reflemble aux précédentes. Les tiges montent aufll haut que celles de la Rofe blanche 2 garnies d épines clair Wes , rougeâtres & forteS: les feuillet font vertes en deflus , blanchâtres en deftous Les fleurs font à cinq pétales blancs, d'une odeur très-agréable, tirant fur le mufc , d'un gout amer , un peu aftringent" le* frmrs comme aux précédentes \ elk fleurit en h % ' ' Un la cultive dans les Jardins, Vertus et Usagés. Elle a â peu près les vèrtus de la Rofe pâle ; maïs elle eft he&L Î^JSt**** ^-o^deux pincées fleurs! entreda"S leS PiIuIes Angéliques , dans l'Eau de mihV Rofa Provincmlis, Rofe de Provins* La racine eft traçante, force, ligneufe. Les tiges font moins hautes que dans les efpeces précédente^ euô eft revêtue dune ecorce plus verte, garnie d'épines; leJ feuilles font de la même couleur que la précédente. Les fleurs font Amples ou doubles comme les autres, d'utiâ belle couleur rouge foncé , veloutée , d'une odeur Foible , maid douce & agréable ; les fruits comme aûx autres. On la cultive daris lés Jârdins, aux environs de la ville ds Provins. Vertus et Usages. Elle eft aftnngehi-e, déterfive, ftomachale; on l'emploîe ett ûirop, Teinture, Conferve, &c. Extérieurement elle eft aftringente, réfolutive, fortifiante Llle entre dans la Thérîaque , le Diafcordium , la Confctf£on d Hyacinthe, la Poudre Diarrhodon, les Trochifques d«

The text on this page is estimated to be only 19.22% accurate

INDIGENES. PL ANCHE 49^ Rofa fylvejîris Cynorrhodos 3 Eglantier. ON fe fert de fa racine , fleurs &c graines. C'eÛ un fous-arbnfleau. La racine eft longue, traçante, dure. Les tiges s'élèvent jufqu'à dix pieds &C plus , armées de grandes épines. Les rieurs font toujours fimples à cinq pétales blancs un peu c ,LI[eur de chair, odorantes; les fruits font gros comme des glands . d'un vouge couleur de corail ; leur ccorce eft charnue , d'un août doux , agréable & acide ; ils contiennent nombre de graines oblongues , blanches, anguleufes , dures, enveloppées dans un poil ferme. Ce fruit a aulîi le nom de Grattecul : il fleurit en été. il fe forme fouvent fur fes tiges une grofleur couverte de ÎDiiffs filets velus, roux, preffés l'un contre l'autre, donnant l'idée d'une éponge, grotte quelquefois comme une pomme d'api y elle eft occalïonnée par la piquure d'un infecte, qui y dcpofe fes œufs, que la feve s'extravafant enveloppe , fe durcie êç forme cette groifeur dans laquelle on trouve, en l'ouvrant, ou ces œufs , ou les moucherons qui en proviennent. On lui a donné le nom d'éponge d'Eglantier ou Bedeguar. 11 vient dans les bois , dans les haies. V e r t us et Usages. Les fleurs font purgatives ; les graines font apéritives , aftringentesj les fruits font adouciflants , aftringents ; l'éponge a les mêmes vernis : les dofes en infufion font depuis deux gros jufqu'à demi-once; la décodtion eft plus déterfive qu'aftnngentei la racine s'emploie contre la rage. La Conferve entre dans les Pilules d'Ancholie.

The text on this page is estimated to be only 17.28% accurate

TOME QUATRIÈME, PLANCHE 497* Rofmarinus , Romarin* ON fe fert de toutes fes parties* C'eft un fous-arbriffeau. La racine eft ligneufe , fibreufe, brune en dehors, bfârichâ en dedans, ^La tige seleve à trois ou quatre pieds ; les feuilles font verd brun en deflus, blanches en deffous , d'une odeur aromatique forte & agréable , d'un gout acre. Les fleurs font en gueule, bleu pâle, dune odeur plus doucô que les feuilles j il leur fuccede quatre graines , prefque rondes au fond du calice : il fleurie au printemps. 11 vient dans nos pays chauds ; on le cultive dans les Jardin?, Vertus et Usages. Il eft céphalique , apéritif, défobftruant, hyftétique, cordial , en infufion dans le vin. Extérieurement il eft nervin , fortifiant. Les fleurs entrent dans le Sirop de Staîchas, d'Ëryfîmurn dom* pofé , l'Onguent Oppodeltoch. Les fommités entrent dans l'Ow viétan. La Conferve dans l'Opiat de Salomon, PLANCHE 498» Rojjbiïs y Roflolis, Viv. ON fe fert de la plante. La racine eft compofee de fibres Capillaires* Les' feuilles font prefque rondes , creufées en cuiiîerofl pat deffus , convexes en deflous , verd pâle , bordées de longs poils . au bout de chacun defquels eft toujours une goutte de liqueur ttanfparente , greffe comme une tête d'épingle. Les pédicules des fleurs s'éltvent de quatre pouces , rougeâtres 5 les fleurs font à cinq pétales , blanchâtres ; il leur fuccede un fruit , gros comme un grain de bled , qui contient plufïeurs petites graines ; elle fleurit en été. Elle vient aux lieux marécageux, aquatiques. Tî

The text on this page is estimated to be only 17.05% accurate

is>« INDIGENES. Toute la pîante eft:. gluante au toucher, Noîa\ Qu'il s'en trouve une autre efpece , qui ne diffère de celle-ci a» far les feuilles , qui font allongées , reilemblantes à une fparule coucav/ Vertu s. Elle eft pectorale ilàdofe en irifulïon eft jufqu à deux gros en poudre un gros. P L ANCHE 499. Rubeola,., Rougeolle, Viv. ON fe fert de la plante. La racine eft longue, branchue, fibrée, profonde en terre , noirâtre. Les tiges font couchées far terre, longues d'environ un ^ mi-pied, anguleufes ; les feuilles font fuilan tes. Les rieurs font monopétales en entonnoir., refendues en qua. tre,, , blanches ou rougeâtres, fentant un peu le Jafmin; il four fuccede des graines deux à deux, oblongues, rudes,, jaunâtres: elle fleurit en été. .Elle vient aux lieux arides,, montagneux. Vertus, Extérieurement elle eft aftringente , mais de peu d'ufage. PLANCHE 5" Rubia tinclorum 3 Garance, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft groffe comme un tuyau déplume, branchue, longue, rampante, fucculente, rouge en dehors Se en dedans, d'un gout doux-amer, aftringent. Les tiges font farmenteufes , quarrées , rudes , longues de trois pieds ; les feuilles font rudes , hériffées de poils. Les fleurs font monopétales en godet, découpé en cinq, d'un jaune verdâtre ; il leur fuccede un fruit , compofé de deux baies jointes enfemble, noires, qui contiennent chacune une graine ronde : elle fleurit en été.

The text on this page is estimated to be only 17.63% accurate

TOME QUATRIEME. 193 On la cultive dans les champs , pour la teinture en rouge. Vertus. Elle eft une des cinq racines apéritives mineures. Elle eft apéritive, hépatique, fplénique , hyftérique, diurétique ; la dofe des racines fraîches eft de demi-once à une. once , $c feches d'un gtos à deux gros. PLANCHE 501. Rubus , Ronce. ON le fert de toutes fes parties. C'eft un arbrifleau. La racine eft menue , ferpentante. Les riges ou branches fonc très -longues , pliantes,., les unes s'élevant, d'autres ferpentant à terre , anguleufes , moëlleufes, s'enracinanc de diftance endiftance, garnies d'épines crochues -, très-piquantes; les feuilles font verd foncé en defTus , blanchâtres en delïbus,, d'un gour aftringent; il s'en trouve qui reftent ■vertes tout l'hiver. Les fleurs font à cinq pétales , rougeâtres ; il leur fuccede desfruits ronds ou ovales, compofés de nombre de petites baies fticculenres, imitant le fruit du Mûrier noir, Pi. 590, Elles deviennent noires , d'un gout doux aflez agréable ; elles contiennent une graine oblongue : H fleurit en été. Il vient par-tout, aux lieux incultes, bois,, buiffons ou plaines. Vertus et Usages. La ronce eft aftringente , déterfive, abforbantej les fruits font rafraîchifTants. Extérieurement les feuilles font vulnéraires , dcterfives. Les fommités encrent dans l'Onguent Populeum j les fruiïS entrent dans le Diamorum limple de compoie.

The text on this page is estimated to be only 18.65% accurate

}09 INDIGENES, PLANCHE J02. Rubus icLeus , Framboifîer. /~\N fefer: de fes fruits, feuilles &c fommités. P!eft un arbriifeau. La racine eft longue, ferpentanre, branchue. Les tiges s'élèvent à cinq pieds & plus, vertes, moelleufeearnies de petites épines ; les feuilles font verd brun en delfus' blanchâtres en deifous , d'un gout auftere. 1 _ Les fleurs font à cinq pétales blancs, penchées en deflW jl leur fuccede des fruits nommés Framboifes , compofés de pe! tues baies fucculentes , reffèmblants au précédent , rouges, qK quefois blancs, d'une odeur agréable , d'un gouc doux & vineux Chaque baie renferme une graine blanche : il fleurit en été. Il vient aux lieu* humides & ombrageux; on le cultive dans les Potagers, Vertus. La Framboifeeft humeéhnre, rafraîçhiflàme , cordiale, ftojnachale, apéritive, ancifeorbutique. Extérieurement les fommités font dérerfives, aftringentes. PLANCHE J03. Rufcus alexandrinus } Laurier alexandrin, Viv. kN fe fert de fes racines & feuilles. La racine eft longue , dure , ribreufe , blanche. 1 ^ Les tiges s'élèvent de deux pieds, verres ; les feuilles font d'un beau verd. Au milieu de la plupart des feuilles fur la principale nervure, il s'élève une petite feuille, à l'origine de laquelle paraît une tres-petite fleur en grelot , d'un jaune verdâtre prefque imperceptible \ il lui fuccede une baie ronde, menue, rouge, qui contient une ou deux graines dures comme de la corne : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux montagneux.

The text on this page is estimated to be only 18.47% accurate

TOME QUATRIEME. 301 Vertus. La racine eft apéridve , diurétique , hyftérique : la dofe en tifape ou eu décoction dans le vin , eft une once par pinte j]a poudre des feuilles & racines eft depuis un gros jufqu'àdeux. Extérieurement les feuilles font vulnéraires , aftringentes. PLANCHE 504. Rufcus 3 Houx-frelon, Viv. ON fe fert de fa racine, feuilles 5c fruits. La racine eft grofïe , raboteufe, rortue , dure , traçante, garnie de grottes fibres blanches, d'un goût âcre, un peu amer. Les tiges s'élèvent de deux pieds , cannelées ; les feuilles font roides, piquantes par le bout, toujours vertes , d'un gouc amer, aftringent. Les fleurs nailTent au milieu des feuilles comme la précédente; mais bien plus grandes, monopétales à fix découpures, jaunâtres ; il leur fuccede des baies rondes , grofTes comme urt pois, un peu molles, rouges, d'un gout douceâtre, qui contiennent une ou deux graines, dures corsme de la corne i dl& fleurit au printemps. Elle vient dans les bois , aux lieux pierreux. Vertus et Usages. La racine eft une des cinq racines apéritives majeures ; elle eft difaiflîve, réfolutive : la dofe dans les décoctions eft d'une demionce à une once. La racine entre dans le Sirop des cinq racines apéritives,,, Les graines dans la Bénédicte laxative. PLANCHE 5°5« Ruta 3 Rue, Viv. ON fe fert de fes feuilles & fommités. # La racine eft dure , fibreufe , jaune. Les tiges s'élèvent jufqu/a cinq pieds, ligneufes, couvertes T4

The text on this page is estimated to be only 18.07% accurate

30î, INDIGENES, d'une écorce blanche; les feuilles font liftes, verd de mer. Les fleurs font à quatre pétâtes , jaune pâle ; il leur fuccede wn fruit à quarre loges , qui contiennent plufieurs femences en forme de rein : elle fleurit en été. Toute la plante a une odeur force & un gout acre & amer Elle refte verte toure l'année. On Ja cultive dans les Jardins. Nota. Qu'il y a une autre çfpecç de Rue , qui eft fauvage ; elle reflcmt>le prefcpe en tout à celle-ci ; les différences font qu'elle eft plus petite & que les découpures des feuilles font allongées & étroites , d'un verd plus pbfcur , d'une odeur plus forte & d'un gout plus acre. On lui préfète la cultivée ci-delïus. Vertus £ t Usages, Elle eft incifive , atténuante, difeuffive, hyftérique, vermifuge 5 alexitaire : la dofe des feuilles & graines en infufion & en décoction , eft une ou deux pincées de feuilles fraîches & un grps en poudre. Extérieurement elle eft déterfive. Les feuilles entrent dans l'Eau Prophylactique, Hyftérique, l'Ele&uaire de baies de Laurier, le Diaphonie , l'Orviétan, la Poudre contre la rage , les Trochifques de .Myrrhe , l'Onguent Martiatum. Les fommkés entrent dans l'Eau Thériacale, le Bauniç tranquille. Les graines dans le Sirop de Stœchas , d'Armoife, la Poudre d'acier , les Pilules fœtides. Le fuc entre dans les Trochifques hyftériques. PLANCHE $o6, Sabîna foliis tamarifei, Sabine à feuilles de tamaris, Viv. " ON fe fert de fes feuilles , écorce Se bois, La racine eft ligneufe. La planre s'élève à crois pieds - elle eft verte toute l'année; les feuilles ont une odeur défagréable , un gout acre & brûlant j «lies imitent celles du Tamaris, Pl. 577. . Les fleurs font de petits çhatons à étaji:ines, verdâtres,ftéri

The text on this page is estimated to be only 19.83% accurate

TOME QUATRIEME. j0) les - les fruits font inconnus dans nos climats : elle, fleurit au. printemps. On la cultive dans les Jardins de Botanique, Sahina foliis cuprejjî , Sabine à feuilles de Cyprès, Viv. On fe fert de fes feuilles. La racine eft comme la précédente. La plante s'élève un peu plus que la précédente; elle eft de même verre toute l'année \ les feuilles imitent celles du Cyprès , pl. 140 , d'une odeur forte Se pénétrante, d'un gout amer, aromatique , réfineux. Les fleurs font à trois pétales, d'un verd jaune j il leur fuccede des baies charnues , d'un blanc gris, arrondies en Olive, contenant trois oflelets oblongs : elle fleurit au printemps. Elle vient aux lieux incuites, fur les montagnes, dans les bois j on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages des deux Sabine s. La première efpece eft la plus employée. Elle eft incifive, pénétrante, apéritive , hyftérique : la dofe en infufion eft jufqu'à demi-once , & en poudre jufqu a un gros. Extérieurement elle eft déterfive , réfolutive. Les feuilles entrent dans l'Eau hyftérique, les Trochifques hyftériques , le Sirop d'Armoife, l'Onguent Marriatum. Les font' mités entrent dans le Sirop d'acier. L'Huile dijlillée dans le Baume & l'elîence hyftérique. Nota. Que fa vertu hyftérique eft très-dangereufe ; car ma| adminifttée, die peut caufer l'avortemenr, luivi d'hémorrhagie Se de la mort. PLANCHE 5°7Salicaria , Saiicaire, \iv. ON fe fert de la plante. La racine eft greffe du doigt, dure, blanche. Les tiges s'élèvent de quatre à cinq pieds, rougeâtres , anguleufes ; les feuilles ont un gout aftringent. Les fleurs font à fix pétales pourpres ; il leur fuccede des capfules oblongues, pointues, partagées en deux loges, qui contiennent nombre de graines menues : elle fleurit en été, . Elle vient aux lieux aquatiques , dans les prés.

The text on this page is estimated to be only 19.99% accurate

J<>4 INDIGENES. Vertus, Elle eft vulnéraire , aftringenre, rafraîchiffante ; cependant elfe eft peu en ufage. PLANCHE Jo8. Salix , Saule. ON fe fert de fon écorce , feuilles & chatons. C'eft un grand arbre. La racine eft longue , dure , blanche. L'ccorce eft unie, blanche ; le bois eft blanc ; les feuilles font velues, blanchâtres, fur-tout en delfous. Le mâle ne porte que des chatons longs, garnis d'étamines deux à deux. La femelle porte des chatons fans étamines, qui deviennent des capfules pointues, à deux loges, remplies de petites graines ovales , aigrettées : il fleurit au printemps. Il vient aux lieux humides, fur le bord des eaux. PLANCHE 5°9' Salix caprea y Marfcau. LA racine eft femblable à celle du précédent. C'eft un arbrilfean. L'écorce en eft blanchâtre , un peu amere ; les feuilles font verd foncé en deffus , un peu velues & blanchâtres en delfous, d'un gout aftringent • le maie & la femelle font des pieds féparés comme au précédent ; les chatons de l'un & de l'autre viennent au printemps 3 avant les feuilles. Ils font plus- gros ôc ramaffés que ceux du Saule ci-delfus & cotonneux. Il vient aux mêmes lieux. Vertus des deux Saules. Elles font les mêmes. Le Saule eft rafraîchilTant , aftringent.

The text on this page is estimated to be only 18.41% accurate

TOME QUATRIEME. 3os PLANCHE 510' Salvia. major 3 grande Sauge , Viv. ON fe fert de fes feuilles & fleurs. La racine eft: dure , fibreufe. Les tiges s'éievent de deux pieds , velues , verd blanchâtre *, les feuilles font blanchâtres, cotonneufes, d'une odeur forte, agréable , d'un gour aromatique , amer , un peu âcre. Les fleurs font monopétales en gueule, bleu pourpre, peu odorantes; il leur fuccede quatre graines arrondies , noirâtres au fond du calice : elle fleurit en été. On la cultive dans les Jardins. Salvia Hifpanica, Sauge d'Efpagne, Viv. La grande Sauge d'Efpagne reflemble à la précédente ; fes fleurs font blanches. PLANCHE yilSalvia minor , petite Sauge, Viv. LA racine reflemble à celle de la grande Sauge. Les tiges font blanchâtres, lanugineuîes , hautes d'un pied & plus; les feuilles font petites, blanches , quelques-unes font accompagnées à leur bafe d'une ou deux petites oreillettes , d'une odeur aromatique , pénétrante , plus forte que la grande Sauge : elle fleurit en été. Les fleurs & fruits lui font femblables en tout. On la cultive dans les Jardins ; on la préfère à toutes les Sauges ci-deiïus. Vertus et Usages des Sauges. Elles font céphaliques -, diurétiques, ftomachales , carminatives , pectorales, vermifuges. Extérieurement elles font vulnéraires, déterfives, fortifiantes. Elles entrent dans l'Orviétan , la Poudre conrre la rage. Les fomm.tés fleuries entrent dans l'Eau Thériacale, le Baume cran* quille, rÔnauent M artiatum , contre la brûlure. Les fleurs en t nt dans l'Eau impériale ? le Sirop de Stœchas , le Baume Oppo■ Itoch.

The text on this page is estimated to be only 19.65% accurate

fo* INDIGENES. PLANCHE JI2. ~ 'Sambucus Sureau. ON fe fert de toutes Ces patries. C'eft un arbrilleau de moyenne hauteur, La racine eft ligneufe , longue , blanchâtre. •' Le tronc eft couvert d'une écorce cendrée , Eiîdej la fécond* écorce eft verte ; le bois eft jaunâtre ; les rameaux font rempli! de moelle blanche; les feuilles ont une odeur force. Les fleurs imitent le parafol ; elles font monopétales , décoiipées en hx , blanches, très-odorantes; il leur fuccede des baies grottes comme celles de Genièvre, Pl. 88 , noires, pleines d'im lue rouge foncé „ qui soutient trois ou quatre graines anguleufes; il fleurit en été. Il vient prefque par-tout, aux lieux humides, dans les haies. Vertus et Usages. Lecorce moyenne & les boutons ou jeunes feuilles, font un doux purgatif Hydragogue, ainfi que les fleurs fraîches. Les fleurs feches font diaphoniques ; fes pépins ou graines font purgatifs; leur dofe eft crois gros ou demi-once en poud&e, & en émulfion environ une once. Les baies font rafraîchi/Tantes , aftringentes. < Extérieurement l'huile des graines eft adouciffanre , refolutive ainfi que les feuilles. Les fleurs font réfolutives , anodines , adouciffantes, La féconde écorce guérit les brûlures. Les fleurs entrent dans la décoction aromatique , l'Eau générale, le Baume tranquille. Les feuilles dans l'Onguent Maniatum. Les baies dans l'Eau hyftérique de la Pharm. de Paris. PLANCHE JI3. S amolus , Mouron cTeau , B. Ann. ON fe fert de la plante, La racine eft blanche, garnie de fibres Capillaires. La tige s'élève d'environ un pied; les feuilles font verd pâle. Les fleurs font monopétales, blanches , découpées en cinq; il leur fuccede des capfules ovales, qui contiennent des graines menues, rouiîeâtres. La plante a un gout amer : elle fleurit en été.

The text on this page is estimated to be only 19.72% accurate

TOME QUATRIEME. 307 Elle vient aux lieux aquatiques & marécageux. Vertus. Elle eft vulnéraire, apéritive, dérerfîve, an'tifcorbmique j mais elle eft de peu d'ufage. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ PLANCHE JI4. Sanicula, Sanicle, Viv. ON fe fert de fes feuilles. La racine eft alTez groffe en haut, fibreufe en bas, noilâcre en dehors, blanche en dedans , d'un gout amer. La tige s'élève d'environ un pied, luTe-, les feuilles font luifan ces , lifles , vertes toute l'année. Les rieurs font à cinq pétales , blanches ou rouges , par bouquets y il fe trouve dans un même bouquet des fleurs ftériles & d'ancres fans éramines, qui deviennent des fruits ronds, composés de deux graines jointes enfemble , hériffées de pointes cro■chues : elle fleurit en été. Elle vient dans les bois. Vertus et Usages. Elle eft aftiïngenre , dérerfive , vulnéraire , confolîdante ; la Me en infufion , comme le Thé, efl une pincée j fon fuc eft deux ou trois onces. Elle encre dans l'Eau vulnéraire. Les feuilles entrent dans le Baume vulnéraire , le Baume Oppodeltoch. Le fuc dans l'Emplâtre Oppodelcoch. PLANCHE $15Sanicula aflranria , Sanicle de Montagne, Yiv. N fe fert de fes fleurs. La racine eft noire , très-fibreufe. La tige s'élève d'un pied & demi, cannelée, d'un gout aromatique; les feuilles font verd noirâtre en delfus , jaunâtres en defTous , rudes. Les fleurs font ramaffées dans une couronne de feuilles, pourpre très-clair ; elles font à cinq pétales ; il leur fuccede un fruit

The text on this page is estimated to be only 19.24% accurate

?o3 INDIGENES. oblong , compofé de deux graines jointes enfemble, cannelées elle fleurît en été. Elle refte verte toute l'année. Elle vient dans les bois, fur les montagnes» Vertus. Les fleurs entrent dans les Vulnéraires de Suiffh* PLANCHE 5*6. Saponaria y Savonicre, Viv. ON fe fert de fes feuilles. La racine eft longue, rougeâtre, rampante, fibrée. La tige s'élève d'un pied & demi 8c plus, lifte, rougeâtre,' moclleufe ; les feuilles font liftes , d'un gour nitreux. Les fleurs font à cinq pétales, fortants d'un long calice, ou pourpre, ou rouge pâle, ou blanches j il leur fuccede un fruit raillé en cône, plein de graines menues, rondes, rougeâtres; elle fleurît en été. Elle vient aux lieux humides , dans les bois ; on la cultive dans les Parterres. Vertus et Usages. Elle eft apéritive , réfolutive , aftringente , intérieurement & extérieurement. Elle entre dans l'Huile d'Euphorbe de la Pharrn. de Paris. PLANCHE 5*7* Satureia 3 Sariette, Ann. ON fe fert de la plante. La racine eft petite & dure. Les tiges s élèvent d'un pied; les feuilles ont une odeur tirant fur celle du Thim , d'un gouc piquant , un peu acre , alfez agréable. Les fleurs font monopérales engueule, d'un blanc pourpre; il leur fuccede quatre graines menues , arrondies , au fond du calice : elle fleurit en été. Elle vient aux environs de Montpellier] on la cultive dans les Potagers.

The text on this page is estimated to be only 19.80% accurate

TOME QUATRIEME. 309 Vertus et Usages. Elle eft apétitive , incifive , fortifiante , pectorale. Extérieurement elle eft vulnéraire , déteriive. Les feuilles entrent dans l'Eau générale. Les Jbmmités dans l'Eau impériale de la Pharm. de Paris. PLANCHE 5l8. Satureia fpicata, Herbe de S. Julien, Viv. ON fe fert de la plante. La racine eft ligneufe. La tige & rameaux s'élèvent d'un demi-pied, ligneufes; les feuilles font odorantes, d'un goutâcre. Les fleurs &c graines font femblables à celles du Thim , Pl. j88 , d'une couleur blanchâtre, tirant fur le pourpre : elle fleurit en été. Elle vient fur la montagne S. Julien enTofcane, en Sicile & ailleurs dans nos Pays chauds. Vertus. Elle eft céphalique, carminative , apéritive, hyftérique, pectorale. PLANCHE Sl9' Saxifraga alba 3 Saxifrage blanche, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft compofée de plufieurs fibres , an bout desquelles font attachés de petits tubercules , gros à peu près comme des graines de Coriandre , d'un blanc mêlé de purpurin , d'un gout tirant fur l'amer. C eft ces petits tubercules qu'on nomme abufivement , femence de Saxifrage. La tige s eleve à environ un pied de haut , velue ■ les feuilles font velues , verd clair. Les fleurs font à cinq pétales , blanches ; il leur fuccede un fruit à deux cornes , oblong & à une feule loge , qui contient plufieurs graines menues , oblongues , rouflèâcres : elle fleura au printemps*

The text on this page is estimated to be only 17.81% accurate

< INDIGENES; Elle vient aux lieux incultes Se dans les bois. Vertus et Usages. Elle eft apéritive & diurétique. Elle entre dans l'Eau générale. Toute la plante entre daris !Sirop de GuimauvePLANCHE 520. Saxifraga verna, petite Saxifrage rouge, Ann. ON fe fert de la plante. _ Les tiges s'élèvent de quatre à cinq pouces, rougeW les remues îont velues, gluantes, verd pâle. Les fleurs font à cinq pétales, blanches; il leur fuccede dss capfuïes a deux cornes arrondies, contenant des graines jaunâtres , très-menues : elle fleurit au printemps. Toute la plante eft gluante. Vertus* Elle eft adoucilTante , réfolutive , déterfive, en Infufion , dans le vin. Saxifraga aurea, Saxifrage dorée, Viv. On fe fert de la plante. La racine eft longue , rampante , garnie de fibres capillaires Les tiges s'élèvent de quatre à cinq pouces, anguleafes ; les feuilles font un peu velues , fucculentes , d'un gout un' peu amer , aftringent. ' Les rieurs font monopétales , découpées en quatre , d'un faune dore ; il leur fuccede des capfules à deux cornes , qui renferment des graines menues , rouge brun : elle fleurit au printemps. Elle vient aux lieux humides, aquatiques, à l'ombre. Ver tus. Ses vertus font pareilles à celle de l'Hépatique commune, Pl. joo. PLANCHE

The text on this page is estimated to be only 16.79% accurate

TOME QUATRIEME PLANCHE 521. Saxifrage, magna > grande Saxifrage, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft grotte comme le doigt, longue chevelue vers le haut, brune en dehors, blanche en dedans /un peu acre. v La tige s'élève à trois pieds & pîus , cannelée , lifte , moëlleufe ; les feuilles îont liftes , verd foncé, dJun goût acre. Les fleurs font en parafol, d'un blanc jaunâtre; il leur fucceda deux graines accollées, cannelées, courtes, dune odeur agréable, d'un gout aromatique, vineux : elle fleurit en été. Elle vient dans les prés bas. Vertus et Usages, La racine eft diurétique , carminative. La dofe de toute la plante en décoction ou Ion fuc, eft de deiix à trois onces. La graine entre dans la Bénédicte laxative. PLANCHE 5*22, Saxifraga , Tragofelinum majus , grand Bôucage ^ Viv. ON fe fert de la racine , quelquefois des fleurs & graines* ^ La racine eft grofte du petit doigt, longue , fibrée , blanche, d'un gout aromatique. La tige s'élève de deux pieds , cannelée , creufe ; lés feuilles font liftes deffbs, d'un verd noirâtre, luifant, d'un gout bien moins fort que la racine. Les fleurs font en parafol , blanches; ii leur fuccede deux graines accollées, cannelées, d'un gout acre : elle fleurit en été. vient aux lieux incultes, fablonneux. 0

The text on this page is estimated to be only 15.45% accurate

INDIGENES. PLANCHE Sa.xifra.ga, Tragofelinum minus , petit Boucage, ViV. LA racine eft blanche, profonde en terre. La cige s'élève à un pied & demi , cotonnenfe , cannelée, creafe ; les feuilles font verd brun delfus , pâle de flous. Les Heurs & graines comme à la précédente : elle fleurît en été. Elle vient aux mêmes lieux. Vertus et Usages des deux Boucages. Elles font diurétiques, fudorifiques , vulnéraires, déterlives, îiyftériques. Les racines entrent dans l'Eau générale , la Poudre d'Arum compofée. Les feuilles dans le Sirop de grande Confoude , de Guimauve. Les fommités dans la Poudre d'acier. PLANCHE 524Scabiofa vulgaris 3 Scabieufe, Viv. ON fe fert de la plante. La racine eft longue , droite en rerre. La ticre s'élève de deux à trois pieds , velue, creufe j les feuilles font lanugineufes , d'un gout un peu âcre. Les fleurs forment une tête à fleurons inégaux ; les plus grands au pourtour, d'un bleu tendre; il leur iuccede des cap fuies ■oblongues , qui contiennent une graine de même : elle fleurie en été. Elle vient dans les bleds, dans les prés. PLANCHE y^TScabiofa vel fuccifa , Mords du diable, Viv. LA racine eft prefque grofle du petit doigt, courte, paroiTfant comme rongée à fa partie inférieure , garnie de longues fibre**

The text on this page is estimated to be only 16.69% accurate

TOME QUATRIEME. >t< Là tige s'élève de deux pieds ; les feuilles font légéremeng Velues , plus vertes en défais qu'en deffbus. Les fleurs relfemblent à celles de la précédente j mais elles fone plus ramaifées & d'un bleu plus foncé , fuivies de pluiicuis daines oblongues : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes, dans les pâtures , dans les bois. Vertus et Usages des deux Scabieuses* Elles font les mêmes. Elle eft alexitaire , apéritive , déterfive , vulnéraire t la dofa du fuc ou de la décoction , eft depuis trois onces jufqua fîx. Extérieurement elle eft vulnéraire, déterfive. Les feuilles entrent dans le Sirop de grande Confonde, l'Eau de lait alexitaire. L'Eau àiftillée entre dans les Tablettes de Guimauve. Le fuc dans l'Onguent contre la gale. PLANCHE 5"2^* Scdndix , Peigne de Vénus, AnK» ON fe fert de la plante* La racine eft blanche , fibreufe, un peu âcre4 Les tiges s'élèvent d'environ un pied , velues , un peu £aâh€* lées* les feuilles ont un gout douceâtre, un peu acre. Les fleurs font en patafol, blanches ; il leur fuccede des fruits tompofés de deux graines accollées , très-longues , fiiionnées ; elle fleurie en été. Elle vient parmi les bleds, V E R T U S4 Elle eft apéritive, vulnéraire, réfoludvej elle eft très-peu eîl ufage. PLANCHE $lj> Scilla rubra , grande Squille, ViV. ON fe fert de fa racine où oiguoiii La racine eft une bulbe ou oignon , gros comme lâ fêfâ d'un, enfant , formé par plufieurs enveloppes rougeâtres , luctuU i

The text on this page is estimated to be only 18.26% accurate

ÎH INDIGENES, lentes , vifqueufes & fous lequel eft la vraie racine , cotPpofêe Aa plulieurs grottes fibres. ^ La rige à Heurs vient avant les feuilles ; elle s'élève de quatre a cinq pieds, droite; les feuilles paronTent ^uand cette tigeçft routa tait fanée; elles font grandes, d\m verd très-foncé.& Les fleurs font à fix pétales ., rouges ; il leur fuccede des VrGits relevés de trois coins , divifés en trois loges , qui renferment plufieurs femences arrondies, noires : elle fleurit en automne < Nota. Il fe trouve une autre Squille, qui ne diffère de celle-ci que pzt u couleur de fes fleurs, qui font blanches. ira La Squille rouge & blanche viennent proche la mer , en Ef. pagne, en Portugal, en Sicile, o PLANCHE ?2.8. Scilla parva, petite Squille, Viv. I N fe fert de fon oignon. L a racine eft compofée de grottes fibres, furmonrées d'un oignon plus petit que celui de la précédente & oblong, noirâtre en dehors, blanc en dedans, formé par des enveloppes pleines d'une humeur vifqueufe , amere. La tige s eleve d'un pied, lifte; les feuilles font verd de mer. Les fleurs font à iix pétales blancs , imitant la fleur du Nareiffej les fruits font triangulaires, divifés en rrois loges, qui contiennent des graines anguleufes , noires : elle fieurifau printemps. Elle vient fur les bords de la mer, vers Montpellier, Vertus et Usages des deux Squille s. La grande & la petite ont les mimes vertus , mais plus foibles dans la petite. Elle eft incifive , atténuante , déterfive , apéiïtive , pecftorale : la dofe en poudre eft de huit à douze grains. Le fuc entre dans le grand Diachiîum. Les Trochifques dans la Thériaque. Le vinaigre dans l'Emplâtre de Ciguë.

The text on this page is estimated to be only 17.60% accurate

TOME QUATRIEME. PLANCHE 5'29Sclarea [ylvejlrïs , Orvale fauvage , Viv. ON fe fert de fes feuilles. La racine eft ligneufe , fibreufe , odorante. La tige eft haute d'environ deux pieds , quarrée , creufe , velue y les feuilles font rudes, d'une odeur forte, d'un gout un peu aromatique. Les fleurs font monopétales en gueule , bleues ; il leur fuccede quatre graines rondes, lifTes , noirâtres, dans le calice : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux herbus , incultes. Vertus. Extérieurement elle eft vulnéraire, aftringente. PLANCHE 5"3°Scordium , Chamaras3 Viv. ON fe fert de fes feuilles 8c fleurs. La racine eft rampante, fibrée. Les tiges font longues comme la main ; elles vont quelquefois jufqu'à un pied; les unes droites, les autres ferpen tant fur terre , en cuife de traînafTes ; les feuilles font velues , blanchittes , d'une odeur d'ail , d'un gout amer. Les fleurs font monopétales en gueule, de couleur rougeâtre , il leur fuccede quatre graines au fond du calice : elle fiew* rit en été. Elle vient aux lieux humides & marécageux. PLANCHE J3 1. Scorodonia , faux Scordium, Viv. ON fe fert de la plante. La racine eft dure , rampante , fibreufe. La tige s'élève à deux ou trois pieds, quarrée, velue, tnoëtleufe; les feuilles font velues, verdbrun, d'un gout amer.
U 3

The text on this page is estimated to be only 18.71% accurate

INDIGENES. Les fleurs font monopétales en gueule, d'un blanc verdâtreil leur fuccede quatre petites graines , noirâtres au fond du ca* lice : elle fleurit en été'. . Toute la plante a une odeur aromatique , tirant fur celle de l'ail. Elle vient aux lieux incultes , montagneux , dans les bois. Vertus et Usages des peux Scordiu m. On peut fubflituer la féconde à la première. ^Elle eft fondante, apéritive, diaphorétique , béchique, vulnéraire, dérerfive ; ta dofe des feuilles &c fleurs en décoction,

The text on this page is estimated to be only 17.12% accurate

317 PLANCHE J3 3Scrophularia fœtida , Scrophulaire des bois, Viv. ON fe fert de fa racine , quelquefois des fleurs & graines» La racine eft longue, greffe, ferpentante, blanche. La tige s'élève à trois pieds Se plus , droite, quarrée, creufe, verd noirâtre ; les feuilles font verd brun. Les fleurs fonc monopétales en petit godet, d'un pourpre obfcuri il leur fuccede un fruit rond , terminé en pointe, partagé en deux loges , qui contiennent nombre de petites graines brunes : elle fleurit en été. Toute la plante a une odeur de Sureau très-défagréable Se un goût amer. Elle vient dans les bois un peu humides. L PLANCHE J34Scrophularia aquatica, Scrophulaire aquatique, Viv» A racine eft a(Tez grolfe , garnie de fibres longues & blaajches. ' La ticre s'élève de quatre pieds & plus, quarree, creule, bile* fucculente; les feuilles font verd de mer, d'une^ odeur & d'un août trcsdéfasrcable: plufieurs font accompagnées à leur bafe, de petites feuilles ou oreilles. Les rieurs relfemblent à celles de la précédente -, mais dune couleur plus foncée. Les fruits lui font pareils : elle fleurit en, été. Elle vient aux lieux aquatiques , le long des eaux. Vertus et Usages des deux Scrophulaire s. Elles font les mêmes. Elle eft réfolutive, émollienre , adoucifTante :Ja dofe de là racine en poudre, efl: un gros 5. l'infufion s'en fait dans du vin. ou dans de l'eau. Extérieurement elle eft déterfîve, confolidante. Elle entre dans l'Eau générale , dans l'Onguent Mondificatif U4

The text on this page is estimated to be only 12.33% accurate

T INDIGENES. «wSSLÉ^ enrrem dans rEau planche 53 y. Secale , Seigle, Ann. fefert du fruit & de la peau du fruit, qu'on nomme Ie La racine eft fibrée. Les tiges s élèvent à fix pieds & plus. bruns en dehors blancs & farineux en dedans : il fleurit en été' On le cultive dans les champs. Vertus. La farine eft une des quatre farines réfohûves: quand on h fubfhtueacelle d'orge, elle eft adouaffan te , réfoiutive , fuppi Le fon eft émollient. PLANCHE 536, Sedum majus , Joubarbe, Viv, ON fe fert de la plante. La racine eft petite, flbreufe. les feu lies font charnues, plemes de fuc /toujours vertes , un peu velues aux bords. il ufr reurS,fonr idix on doaze P«ales, dérouleur purpurine: 1 leur fuccede un fruir ou tête, formée par autant de capfoleî fJkTétF renferm6nt Plufieurs ëraines ^ menues : elle Elle vient fur les rochers & fur les couvertures des chaumie

The text on this page is estimated to be only 20.94% accurate

TOME QUATRIEME. 31* PLANCHE 537Sedum minus album , petite Joubarbe, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft menue , fibrée. Les tiges selevent de cinq à fix pouces, rougeâtres; les feuilles font épaifles , ovalaires , fucculenres , charnues. Les fleurs font à cinq pétales , blanches ; il leur fuccede de pecits fruits ramafles en tête , remplis de graines fort menues : elle fleurit en été. Elle vient fur les murailles & autres lieux arides. Vertus et Usages des deux Joubarbes. On peut fubftituer la petite à la grande , comme aufïi la Trique-Madame ci-après, Pl. 539. Elle eft rafraîchiflante , déterfive , aftringente , refolutive & repereuflive : la dofe du fuc eft quatre onces. Extérieurement elle eft adouciflante, calmante. Les feuilles de la grande entrent dans l'Onguent Mondifkatif d'Ache, l'Onguent Populeum. La racine, feuilles & fuc de la petite entrent dans l'Emplâtre Diabotanum. Les feuilles dans l'Onguent Populeum. PLANCHE Sedum parvum acre, Vermiculaire, Viv. N fe fert de la plante. La racine eft petite , fibreufe. Les tiges s'élèvent de deux ou trois pouces ; les feuilles fe recouvrent l'une l'autre en façon d écailles 5 elles font fucculentes. Les fleurs font à cinq feuilles, jaunes; il leur fuccede des fruits & graines , difpofées comme aux précédentes : elle fleurit en été. Elle a un gout piquant , âcre & brûlant. . Elle vient fur les murailles , fur les toits des chaumières SC autres lieux arides , dans les prés. Vertus. Extérieurement elle eft anrifeorbutique. o

The text on this page is estimated to be only 17.77% accurate

3 20 INDIGENES. 1 PLANCHE 5-39. Sedum luteum^ Trique-Madame, Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eftfibrée. Les tiges s'élèvent à cinq ou iîx pouces 5 les feuilles font verd pâle. Les fleurs font à cinq pétales , jaunes ; les fruits & graines comme aux précédentes ; elle fleurit en été, vient aux 'mêmes lieux : fes vertus font les mêmes que celles des deux premières ci-deflus. PLANCHE 540. Senecio 3 Séneçon, Ann. ON fe fert de toute la plante. La racine eft petite , fibrée, blanchâtre. La tigeseleve d'environ un pied, cannelée, creufej les feuilles font verd obfcur. Les fleurs font à fleurons jaunes; il leur fuccede nombre de graines ovales, aigrettées : elle fleurît en été. Elle croit par-tout. Vertus et Usages. Elle eft émolliente, adouciflante, vermifuge, réfolutive, intérieurement & extérieurement. Les feuilles entrent dans la décoction émolliente, pour les lavements de la Pharm. de Paris. PLANCHE J4I. Serpyllum , Serpolet, Viv. ON fe fert de fes feuilles & fommités. La racine eft menuo, ligneufe, fibrée, brune. Les tiges font longues comme la main , penchées fur terre, Ufl peu velues \ les feuilles ont un gout aromatique acre.

The text on this page is estimated to be only 21.57% accurate

TOME QUATRIEME. ?ir Les fleurs font monopétales en gueule, purpurines*, il leur fuccede quatre petites graines , rondes au fond du calice : elle fleurit en été. Toute la plante a une odeur fort agréable. Elle vient aux lieux incultes, fur les montagnes arides Se autres lieux fecs. Vertus ht Usages. Elle eft céphalique, ftomachale, apéritive, nervîne, pectorale : la dofe eft une poignée en infufion & un gros en poudre. Extérieurement la poudre eft céphalique en guife de tabac. Les feuilles entrent dans l'Eau générale. Les fammités dans l'Huile de petits chiens, PLANCHE H2Serratula , Serrette , Viv. ON fe fert de toute la plante. La racine eft fibrée , d'un gout un peu amer. La tige s'élève de deux ou trois pieds, cannelée, rougeâtre; les feuilles font liftes , verd brun. Les rieurs font à fleurons purpurins , fortants d'une tête écailleufe ; il leur fuccede des graines ovales } aigrettées : elle fleurit en été. Elle vient dans les bois. Vertus. Elle eft vulnéraire, confolidante : la dofe des feuilles eft une demi-poignée en infufion , ou un gros de la racine en poudre. Extérieurement elle eft vulnéraire , déterfive. PLANCHE 543' Sicïliana , Toute-faine, Viv. ON fe fert de fes feuilles Se fleurs. La racine eft grofle , dure, rougeâtre, garnie de longues fibres , d'un gout réfineux. Les tiges s'élèvent de deux ou trois pieds , liftes ; les feuilles font verd brun , garnies de petites véficules tranfparentes corn

The text on this page is estimated to be only 19.31% accurate

iit _ INDIGENES. me au Milperruîs, Pl. 308 , dont elle eft une efpece. Les fleurs font à cinq pétales , jaunes j il leur fuccede des baies, grofles comme un gros pois , noires , qui renferment de petites femences brunes : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux ombrageux. Vertus. On peut la fubftituer au Milpertuis , en ayant les vertus.. PLANCHE 544. Sideritis } Crapaudine , Vïv. ON fe fert de la plante. La racine eft dure , ligneufe. Les tiges font hautes d'un pied , quarrces , jaunâtres ; les feuilles font velues , d'une odeur aflez agréable, d'un goût aftringenr , un peu âcre. Les fleurs font monopétales en gueule, d'un blanc jaBnâtre, marquetées de points rouges ■ il leur fuccede quatre graines ovalaires, noirâtres au fond du calice : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes , fecs, montagneux. Vertus. Extérieurement elle eft vulnéraire , aftrîngente , déterfive. o PLANCHE 545". Siliquajlrum 3 Gaîmer, t N fe fert de fes gouifes & graines. C'eft un arbre aflez haut. La racine eft grofle, dure. L'écorce eft btune : il fleurit au printemps , avant les feuilles. Les fleurs font Légumineufes , purpurines , d'un gout doux un peu aigrelet; il leur fuccede des illiques longues, plates, rouffes, qui contiennent pluiîeurs graines rondes, applaties , dures, rougeâtres. Il vient dans les pays chauds , en tout terrein ; on le cultive dans les jardins , pour la beauté & l'abondance de fes fleurs.

The text on this page is estimated to be only 16.88% accurate

TOME QUATRIEME- 52/ Vertus. Les gonfles font aftringentes j les graines fonr ophtalmiques * niais il eft de peu d'ufage. PLANCHE 546. Sinapi rapi folio t Moutarde, Ann. ON fe fert de fa graine. La racine eit blanche, dure, fibreufe. La tige s'élève à quatre ou cinq pieds , moëileufe , velue. Les rieurs font à quatre pétales, jaunes j il leur fuccede des goulfes pointues , lilles, anguleufes, aflez courtes, remplies de graines prefque rondes , noirâtres , d'un gout acre & piquant : elle fleurit en été. Elle vient fur les terres neuves, le long des fortes; on la cultive dans les champs. PLANCHE J47Sinapi apii folio } Moutarde blanche, Ann. LA racine eft longue comme la main , greffe du doigt, dure, blanche , fibrée. La tige s'élève à un pied & demi ou deux pieds ; les feuilles font garnies de poils roides. Les rieurs font pareilles à la précédente, d'une odeur agréable ; il leur fuccede des goufles velues , terminées par une longue pointe vuide , qui contiennent quatre ou cinq graines prefque rondes , roufleâtres : elle fleurit en été. Elle vient dans les champs. Vertus et Usages des deux Moutardes. Elles font les mêmes. La graine eft ftomachale, antifcorbutique , diaphorétique , apéritive. Extérieurement elle eft fternuratoire, mafticatoire , réfolurive. La graine entre dans l'Eau antifcorbutique , l'Onguent épifï>aftique3 l'Emplâtre épifpaftxque de la Pharm, de Paris,

The text on this page is estimated to be only 19.42% accurate

INDIGENES. PLANCHE I48. Sifarumy Chervi, Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft formée par plufîeurs petits navets , longs comme la main , gros du doigt, réunis en une tête, tendresleur écorce eft pâle, mince, blanche en dedans, d'un goût doux , un peu aromatique. La tige s'élève de deux ou trois pieds, cannelée. Les fleurs font en parafol, blanches, odorantes; il leur fuceede deux graines accollées, oblongues, cannelées, brunes; elle fleurît en été. On la cultive dans les Potagers. Vertus. Elle eft aperitive , vulnéraire ; on s'en fert rarement en Médecine. PLANCHE 549. Sifymbfïum aquaricum 3 Raifort d'eau , Vîv« ON fe fert de fa racine. La racine eft longue, fibrée, d'un gouc acre. La tige s'élève de trois pieds ou plus , cannelée , creufe. Les fleurs font à quatre pétales , jaunes ; il leur fuccede ude petite filique , partagée en deux loges, qui contiennent des graines menues , rondes : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux aquatiques Se dans l'eau. PLANCHE Sifymbrium palujlrc 3 Raifort de Marais, Viv. / Lie reûemble en tout à la précédente j les feuilles en font Jjj feulement découpées plus profondément. Elle vient aux mêmes lieux,

The text on this page is estimated to be only 19.32% accurate

TOME QUATRIEME. PLANCHE JJI. Slfymbrium palujlre repens 3 petit CrefTon. fauvage, Viv. LA racine eft rampante, déliée, blanchâtre, d'un gout acre. Les tiges fe traînent à terre , longues d'un pied & demi , cannelées > les feuilles font verd noirâtre , d'un gout de CrefTon. Les fleurs & graines comme aux précédentes \ elle fleurit en été. Elle vient aux lieux humides & aquatiques. Vertus des trois S i s y m b r i u m. Elles font antifcorburiques , apéritives , diurétiques, déterfives y mais on s'en fert rarement en Médecine. PLANCHE XT2" Sifymbrium , Barbarea , Herbe de Sainte-Barbe, B, Ann, ON fe fert de la plante. La racine eft oblongue, aflez grofle, blanche, d'un gout acre. La tige s'élève d'un pied & demi, cannelée, moëlleufe ; les feuilles font verd foncé , luifantes , d'un gout moins fort que celui de la racine. Les fleurs font à quatre pétales, jaunes; il leur fuccede des filiques longues, qui contiennent plufieurs graines menues, rouflès : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux humides. Vertu s. Elle eft amifcorbutique, vulnéraire, détejfive , eri infuflon, en cilane.

The text on this page is estimated to be only 16.28% accurate

î N D I G E K E S. PLANCHE 5 Slfymhnum fophia chirurgorum , Thalitron, Ann. ON fe fert de fa graine. La racine eft blanche , longue , fibrée. La tige s'élève d'un pied & demi ou deux pieds, & queIqlie_ tois plus , un peu 1 1 Les feuilles font verd blanchâtre, d'un gout douceâtre m peu acre. ' Les rieurs font à quatre pétales, jaune pâle; il leur fuccede des nliques longues Se étroites , remplies de graines menues rondes, rougeatres : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes , fecs, fur les vieilles murailles parmi les pierres. 5 Vertus. Elle eft vulnéraire , déterfive, fébrifuge : la dofe de la oraine eft un gros. ° Extérieurement elle eft déterfive. PLANCHE J54. Si/on, Sifon , B. Ann. ON fe fert de la graine. La racine eft peu enfoncée en terre , blanche , d'un gout de Panais un peu aromatique. La tige s'élève de trois à quatre pieds, moélleufe liflTe. Les fleurs font en parafol , blanches ; il leur fuccede deux grames accollées , menues, arrondies, cannelées, brunes, d'un gout aromatique : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux humides. Vertus. Elle eft une des quatre femencei chaudes mineures , fous le nom d'Amome parce qu'elle a l'odeur du véritable Amome, Pl. 51. Ejle eft cai'ininatiYe. PLANCHE

The text on this page is estimated to be only 19.28% accurate

TOMÉ QUATRIÈME. PLANCHE 555* Smilax âfpera> Liferon piquant, Viv, ON fe fert de fa racine^ La racine eft groffe du petit doigt , longue , ferpentaiitej dure , blanchâtre , fibreufe. Les ciges font farmehteufes, garnies d'épines Se de mains, avec lefquelles elles s'élèvent, s'attachant aux corps voifins; les feuilles font marquées de taches blanches, épineufes fur les borda & en delfous. Les fleurs font à fix pétales , blanches > odorantes j il leur fuccededes fruits ronds, mollets, rouges 4 qui contiennent deux ou trois graines rondes , liftes 4 rouge brun en dehors , blanches en dedans , d'un gout fade & défagréable : élle fleurit en été. Elle vient en Provence , en Languedoc ; on la cultive dans les Jardins de Botanique. La racine eft defficative , fudorifique, atténuante : la dofe de fa poudre eft depuis demi-gros jufqu a deux gros , &c de la décoction jufqu'à demi-once. PLANCHE Jji. Smilax convolvulus major, grand Liferon, ViV* ON fe fert de la planre. La racine eft longue, menue, blanche , fibreufe. Les tiges font farmenteufes , cannelées, grimpant très-haut,' quand elles font foutenues ; les feuilles font liftes , verd gai. Les fleurs font monopétales en cloebe, très-blanches ; il leur fuccede un fruit prefque rond , gros comme une petite cerife , enveloppé par le calice , contenant deux graines anguleufes , couleur de fuie : elle fleurit m étéi Elle eft remplie de lait. Elle vient dans les haies ôc broffailles , aux lieux un peu fiatnides. Vertus, Elle eft purgative : îa dofe eft depuis ïô grains jufqu^ trente, Extérieurement elle eft réfolutive . anodine, V.

The text on this page is estimated to be only 18.63% accurate

INDIGENES, PLANCHE J57S mi! a x convolvulus minor^ petit Lifcron , Viv. ON fe fert de la plante. La racine eft très-longue , menue , rampante , fibrée. Lies tiges font rampantes & grimpantes, mais plus rudes & b: :n moins longues que celles de la précédente. Les fleurs lui refïemblent, mais elles font plus petites, & leur blanc eft mêlé en dehors de couleur de rofe ; les fruits font arrc lis & contiennent des femences afTez grades , anguleufes. Elle vient prefque par-tout. Vertus. Elle eft vulnéraire , déterfive, réfolutive, anodine. PLANCHE <=>l8, Smyrnium > Maceron , B. Ann. GN fe fert de fa racine & graine. La racine eft alfez longue, blanche , empreinte d'un fuc acre & amer , d'une odeur & d'un gout tirants fur la Myrrhe. La tige s'élève de trois pieds , cannelée ; les feuilles font verd brun , d'une odeur aromatique , d'un gout tirant fut celui du Perfil. Les fleurs font en parafol, blanchâtres; il leur fuccede deux graines accollées , groffes, prefque rondes, cannelées, noires, d'un gout amer : elle fleurit en été. Elle vient entre les rochers marécageux, proche de la mer; elle refte ver-te toute l'année; on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages. La graine eft cordiale , caiminative ; on la fubftitue à celle du Perfil de Macédoine, Pl. 45 1. La racine peut être fubftituée à celle d'Ache , Pl. 149La graine entre dans l'Eleclruaire lithrontiptique , dans la Poudre de l'Ele&uaire de Juttin.

The text on this page is estimated to be only 18.05% accurate

TOME QUATRIÈME» O PLANCHE 559Soàa cochleato femme , grande Soude, Ann» N fe fert de la plante. La racine eft ferme , fibreufe. Les tiges ou rameaux font d'un pied & demi, rougeâtrés? les feuilles font charnues, fucculenres. Les fleurs fonr à étamines , fortant d un calice jaunâtre à cinq feuilles ; il leur fuccede un fruit prefque rond . contenant une graine noire, luifance, tournée en fpirale : die fleurit en été. Elle vient aux pays chauds, près la mer; on la cultive'aux environs de Montpellier & dans les Jardins de Botanique. PLANCHE 560. Soda kali fpinofum , Soude épineufe, Ann» LA racine eft fibreufe. Les tiges deviennent longues d'un pied & demi , fucculentes, d'un verd blanchâtre; les feuilles font empreintes d'un fuc falé ; elles fe terminent par une pointe roide. Les fleurs font à étamines ; il leur fuccede au fond du calice épineux , une graine pareille à la précédente. Elle vient aux mêmes lieux. Vertus des deux Soudes. Elles font apéritives, défobftruantes , diurétiques; on skert fert peu en Médecine. Extérieurement elles font déterlîves. PLANCHE jél. Solanum , Morelle , Ann. ON fe fert de fes feuilles, fommités & baies. La racine eft longue , fibreufe , chevelue. La tige s'élève d'un pied & demi , anguleufe , verd noirâtre fes feuilles fonr du même verd , lifTes , pleiaes d'un fuc verdâtte, d'un goût herbeux & fade. V z

The text on this page is estimated to be only 18.86% accurate

3jo INDIGÈNES Les fleurs font monopétales , découpées en cinq pointes , blanches; il leur fuccede des fruits, gros comme des grains de Genévrier, Pl. 88 , liffès, fucculents, ou noirs, ou rouges , ou jaunes , qui renferment plufieurs graines menues , applaties , blanchâtres : elle fleurît en été. Toute la plante a une odeur alToupiflante. Elle vient aux lieux incultes, près des maifons , à l'ombre. Vertus et Usages. On ne doit s'en fervir qu'extérieurement, vu que piïfe intérieurement elle peut être ttès-dangereufe. Extérieurement elle eu: adoucitfânte , anodine. Les feuilles entrent dans le Baume tranquille , POnguent Monditîcatif d'Ache. Les fommités dans l'Onguent Populeum. Le fuc des baies & de la plante dans l'Onguent Diapompholigas. PLANCHE jéz. Solarium tuberofum , Pomme de terre, Ylv. ON fe fert de la racine. La racine eft tubereufe, oblongue, inégale 3 grofle quelquefois comme le poing , charnue , couverte d'une écorce rouge , noirâtre. La tige s'élève de trois pieds & plus, velue, verte , tachetée de rouge, creufe -, cannelée, fucculenre ; les feuilles font verd brun, velues, luifantes en demis. Les fleurs font monopétales , refendues en cinq; il leur fuccede des fruits ronds , fucculents , rouge brun , qui contiennent plufieurs graines arrondies, menues, jaunes : elle fleurit en été. Elle vient en Virginie; on la cultive en Angleterre, fous le nom de Patates Se en France. Vertus. C'eft le feul Solanum qui foit fans mauvais effet, pris intérieurement ; on en mange les tubérofités de la racine j on ne s'en fert point en Médecine.

The text on this page is estimated to be only 20.58% accurate

TOME QUATRIEME. 331 PLANCHE 563. S.oldanella , Chou marin, Viv. ON fe fert de route la plante. La racine eft menue , fibreufe. Les tiges font farmenteufes, rampantes, longues de deux pieds; les feuilles font liftes, luifantes, remplies d'un fuc laiteux. Les fleurs font monopétales en cloche , de couleur purpurine ; il leur fuccede des fruits prefque ronds , qui renferment des graines noires , anguleufes : elle fleurit au printemps. Elle vient fur les fables de la mer. Toute la plante a un goût acre , amer , un peu falé. Vertus et Usages. Elle eft purgative, hydragogue : la dofe en poudre eft depuis demi-gros jufqua un gros; celle du fuc eft de demi-once. L'extrait fe donne depuis demi-gros , jufqu a un gros & demi. Les feuilles feches entrent dans la Poudre Hydragogue de la Pharm. de Paris. PLANCHE 5^4. Sonchus lœvis , Lakeron doux , Ann. ON fe fert de fes feuilles. La racine eft petite , fibreufe , blanche. La tige s eleve d'un pied & demi , creufe , cannelée ; les feuilles font liftes , remplies d'un fuc laiteux. Les fleurs font à demi-fleurons jaunes ; il leur fuccede des fruits en cône, qui renferment de petites graines oblongues, aigrettées , d'un brun rouge. Toute la plante eft laiteufe : elle fleurit en e'te. Elle vient prefque par-tout & en tout terrein. Nota.. Qu'il s'en trouve une efpecç dont les feuilles. refiTemblent à celles d'endive, PL z$6 j mais du refte comme celle-ci.

The text on this page is estimated to be only 19.37% accurate

3îi INDIGENES, PLANCHE jéj. Sonchus afpery Laiteron épineux, Ann. ELle refïemble quafi en tout aux précédentes ; elle n'en diffère que par fes feuilles , qui font entières & d'un gouc auez agréable , quoiqu'un peu ameres. Vertus des Laiteron s. Ils ont les mêmes vertus , qui font d'être rafraîchluants , adouciflaurs. PLANCHE 5^6. Sorbusy Cormier. ON Ce fert de fes fruits. C'eft un arbre allez grand. La racine eft longue, dure, grofle. Le tronc eft droit , couvert d'une écorce pâle , rude ; le bois eft très-dur, rougeârre; les feuilles font velues, verdâtres en défais, blanchâtres defïbus , d'un gout un peu acre , aftringent. Les fleurs font à cinq pétales , blanches ; il leur fuccede un fruit yerd & rouge , de la grofleur d'une prune , charnu , ayant la chair jaunâtre, d'un gout acerbe & rude ; il devient en fui te un fruit mou, de couleur roux brun en dehors & en dedans; alors il a le gout doux & agréable; il renferme à fon centre quelques pépins , reifemblants à ceux de la Poire : il fleurit en été. Ou le cultive dans les Vignes Se dans les Vergers. PLANCHE 5^7Sorbus torminalis } Aliller. ON fe fert de fes fruits. C'eft un arbre de moyenne taille. La racine eft groffe & profonde en terre. Le tronc eft couvert d'une écorce liiTe , blanchâtre; les branches ont une écorce brune , rougeâtre , aftringente , un peu amere ; le bois eft blanc 6V très-dur; les feuilles ont un gout légèrement aftringerjr.

The text on this page is estimated to be only 16.59% accurate

TOME QUATRIEME. m Les fleurs fonc à cinq pétales, blanc pâle- il leur fuccede des_ fruits ronds , fembtables à ceux de l'Epine blanche, Pl. 3 Sa * mais plus gros, jaunâtres, parferais de petirs points blancs! d'un gour d'abord auftere ; ils mollirent enfu ite comme les précédents & deviennent d'une agréable acidité ; ils font partagés en cinq loges, chacune contenant un ou deux pépins, ekâtain'çlair; il fleurit en été, 11 vient dans les bois. Vertus des deux Sorbiers. Leurs. fruits font aftringents, rafraîchnTants. Extérieurement la poudre en eft déterfive , deflîcarive, ^MrWT~^l¥TTTTÏÏlTrW

The text on this page is estimated to be only 17.22% accurate

1*f w t INDIGENES. purpurines ; il leur fuccede quatre graines , noirâtres au fond du calice : elle fleurit en été. Toute la plante rend une odeur aromatique forte. Elle vient aux lieux incultes. Vertus. Elle eft diurétique , hyftériques mais de très-peu d'ufage. PLANCHE jyo. Staphifagria s Herbe aux poux, B. Ann. ON fe fert de fa graine. La racine eft longue , dure. La tige s'élève d'un pied Se demi ou deux pieds , droite , veîue; les feuilles font velues. Les rieurs font à cinq pétales , bleu foncé ; il leur fuccede un fruit , compofé de trois ou quatre gaines cornues , affemblées, verdâtres, qui contiennent plufieurs graines, noirâtres en dehors j jaunâtres en dedans , Triangulaires , de la grolfeur d'un petit pois, rudes , d'un gout amer , brûlant & très-deTagréable ; elle fleurit en été. Elle vient aux lieux fombres, en Provence Se en Languedoc i on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus. On ne s'en fert point intérieurement , à caufe de fa vertu purgative & vomitive , très dangereufe. Extérieurement elle eft vulnéraire j déterfive : fa poudre fait mourir les poux. ES ! I I 111 11 ' "" « PLANCHE T7I. Statice major , grand Staticé, Yiv. ON fe fert de la plante. La racine eft longue, rougeâtre, divifée en plufieurs têtes. Les feuilles font verd de merj les pédicules des fleurs s'élèvent à un pied , creux. Les fleurs font à cinq pétales, purpurines j il leur fuccede

The text on this page is estimated to be only 19.26% accurate

T,0 M E QUATRIEME. ?jç une capfule, qui contient une graine pointue par les deux bouts, renfermée dans le calice : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux montueux. * Vertus. Elle eft vulnéraire , aftringenre j on fe fert de fon fuc. Extérieurement elle a les mêmes vertus. I n — rarr-miniT^Mii u min nimmnMiuuiiiimiiLI Il PLANCHE J72. Stramonium , Pomme épineufe, Ann. ON fe fert des feuilles. La racine eft grofle , fibreufe , blanche. La tige s'élève de trois à quatre pieds & plus , creufe , un peu velue ; les feuilles font verd foncé, d'une odeur très-puante ôc afloupiflanre. Les fleurs font monopétaîes en entonnoir , blanches ou violettes , d'une odeur moins défagréable ; il leur fuccede un fruit gros comme une noix , armé de piquants afTez mois , féparé intérieurement en quatre loges , qui contiennent plufieurs graines noires, faites en rein , d'un gour défagréable : elle fleurit en été. On la cultive dans les Jardins de Botanique ; on la trouve quelquefois à la campagne. Vertus et Usages. Il eft dangereux de s'en fervir intérieurement -y cependant depuis peu quelques-uns en ont employé l'extrait , mais en trespetite dofe, pour les affections du cerveau. Extérieurement elle eft adouciflante , anodine , réfolutive. Les feuilles entrent dans le Baume tranquille. PLANCHE 573' Suber 3 Liège. ON fe fert de I'écorce. C'eft un arbre de hauteur moyenne & quelquefois haut. La racine eft longue , grofle , dure,

The text on this page is estimated to be only 21.32% accurate

33* INDIGENES. L'ecoree eft épaiflè , fpongieufe , légère, d'un gris jaune ; le» feuilles font verres en defliis , blanches en défions. Les fleurs font à éramines , reflemblam à celles du Chêne Pl. 480 , & les fruirs ou glands de même : il fleurit en été. Il vient en Provence , en Rouffillon , en Gafcogne , dans les Pyrénées. Vertus» L 'écorce eft aftringente, déterfive : la dofe en poudre eft d'un demi-gros à un gros -y en déco&ion depuis demi-once jufqu'à une once dans une pinte d'eau. Sa cendre brûlée eft extérieurement adouciflante. PLANCHE 574* Syringa, Liîas. ON fe fert de fa graine.. C'eft un arbrilfeau. La racine eft déliée , dure , rampante.. Les tiges font couvertes d'une écorce verdâtre , moclleufes; les feuilles font lùTes , luifantes , d'un gout un peu âcre & amer. Les fleurs font monopétales , découpées en quatre , pourpre bleuâtre; il leur fuccede un fruit oblong, applati, rouge, partage en deux loges, qui contiennent des graines de même forme , pointues par les deux bouts , de couleur roulfe : il fleurit au printemps. Il vient en Orient ; on le cultive dans Les bofquets. PLANCHE J7 T. Syringa alba } Seringat. LA racine eft branchue^ rampante. C'eft un arbrifleau. Les tiges font couvertes d'une écorce cendrée, moelleufesj les feuilles font rudes, d'un gout un peu amer & âcre. Les fleurs font à quatre pétales , blanches, d'une odeur agréable ; il leur fuccede un petit fruit noirâtre 3 divifé en quatre

The text on this page is estimated to be only 17.79% accurate

TOME QUATRIEME. jî7 loges , remplies de graines menues , oblongues B fleurit au printemps. On le cultive dans les bofquets. Vertus des deux Seringats, Les graines du premier font aftringentes en poudre ou en décoction, Les feuilles du fécond , idem ; mais ils font tous deux fort peu en ufage. T. PLANCHE 576. Tamarifcus Germanica , Tamaris d'Allemagne. ON fe fert de fon écorce & racine C'eft un arbriflèau. La racine eft greffe comme la jambe ; fon écorce eft un peu épaifle & fort amere. Les tiges font couvertes d'une écorce rougeâtre j les feuilles font verd de mer , d'un gout aftringent. Les fleurs font à cinq pétales, d'un blanc incarnat j il leur fuccede un petit fruit oblong, pointu, triangulaire, qui renferme plufieurs graines menues, triangulaires, aigrettées : il fleurit en été. Il vient aux lieux humides Se pierreux , en Hongrie & dans plufieurs Contrées d'Allemagne. PLANCHE 57 7Tamarifcus Narbonenjîs , Tamaris. C'Efl: un arbriflèau. La racine eft greffe , dure , branchue. Les tiges font couvertes d'une écorce rude, grife en dehors, rougeâtre en dedans; le bois eft blanc; les feuilles font verd pâle. _ L'épi des fleurs eft plus ferré ; les fleurs Se graines plus petites que le premier; d'ailleurs femblabies: U fleurit en été.

The text on this page is estimated to be only 20.08% accurate

3?S INDIGENE S. Il vient aux bords de la mer , aux pays chauds de ta France & de l'Europe. Vertus des deux Tamaris. Elles font les mêmes. Ils font apéritifs, défobftruants, atténuants : la dofe de le, corce & racine eft une once par pinte de liqueur; l'extrait eft depuis un gros jufqua deux. Extérieurement ils font émollients. PLANCHE 57&. Tanacetum, Tanaifie, Viv. ON fe fert de fes feuilles & fommités. La racine fe divife en plufieurs fibres ferpentantes. Les tiges s élèvent de deux ou trois pieds, rayées, un peu velues , moélleufes ; les feuilles font verd jaunâtre , d'une odeuc forte, d'un gout amer. Les fleurs font à fleurons , d'un jaune doré ; il leur fuccede des graines menues , noirâtres : elle fleurit en été% Elle vient en terrein humide. *■ PLANCHE 579. Tanacetum cojlus hortorum , Coq, pâté, Viv. LA racine eft oblique en terre , fibrée. Les riges s'élèvent de deux pieds & demi, cannelées, velues , verd pâle ; les feuilles font verd clair , d'une odeur agréable & forte , d'un gout amer aromatique. Les fleurs font en tout femblables à la précédente ; il leur fuccede des graines menues , applaties , enfermées au rond du calice : elle fleurit en été'. On la cultive dans les Jardins. Vertus et Usages des deux TanAisies. La première eft ftomachale, fébrifuge, fudorifique, vermifuge, apéritive: ladofe du fuc eft trois ou quatre onces j celle des fommités, deux poignées en infufion fur trois chopines d'eau.

The text on this page is estimated to be only 17.86% accurate

TOME QUATRIEME. $}9 Extérieurement elle eft vulnéraire, déterfive. Les feuilles entrent dans l'Eau générale. Les fleurs dans lu Poudre contre les vers , l'Orviétan. La féconde peut être fubftitnce à la précédente j elle eft cephalique, hyftérique, vermifuge. PLANCHE jBo. Taxusy If. C'Eft un arbre allez bas , toujours verd. La racine eft dure &c profonde en terre. Le bois eft très-dur , rougeâtre , veiné > les feuilles font verd noirâtre, luifantes en deflus, d'un gout un peu amer. Les fleurs font à étamines , verd paie, lesquelles avec leurs fommets ont l'apparence d'un petit champignon ; elles font ftériles ; les fruits naiffent en des endroits féparés ; ce font des baies molles, rouges, fucculentes, de la groifeur d'un gros pois, cteufés par le haut; au milieu du creux fe voit une petite élévation j ces baies enferment une graine ovale, brune, remplie d'une moelle d'un gout allez agréable : il fleurit au printemps. Il vient aux pays chauds, en Italie, en Provence Se en Languedoc, fur les montagnes j on le cultive dans les Parterres. Vertus. Quoique cet arbre ne foit d'aucune utilité en Médecine , on le décrit ici pour avoir occafîon de défabufer les perfonnes qui ctoienr que cet arbre , fur-tout fes fruits , font vénimeux. Des expériences réitérées ont fait reconnoître qu'en ce pays-ci, il n'a aucune qualité nuifible. PLANCHE Tenianaria , Centaurée bleue, Viv. ON fe ferr de la plante. La racine eft menue, rampante, fibreufe, blanche. La tige s'élève d'un pied & demi, quarrée, un peu rude; les feuilles font verd brun , rudes, d'un gout amer. Les fleurs font monopétales en gueule, d'un violet bleu,

The text on this page is estimated to be only 18.64% accurate

(INDIGENES, marquées de petits points d'un bleu foncé; il leur fnccede qua_ tre graines prefque rondes au fond du calice : elle fleurie en été. Son odeur eft aflez agréable. Elle vient aux lieux aquatiques. Vertus. ^ Elle eft fébrifuge, vulnéraire, aftringente; néanmoins on s'en fert peu. PLANCHE 5"82. Tetragonia , Fufaln. ON fe fert de fes feuilles Se fruits. CJeft un arbriffeau. La racine eft dure, longue. Il s eleve de fept à huit pieds & plus ; 1 ecorce eft verte ; le bois eft aflez dur , d'un jaune pâle. Les rieurs font à quatre pétales , verd pâle ; il leur fuccede un fruit rouge , relevé de quatre côtes ; ces côtes ou loges retK ferment chacune une graine ovale, jaune fafrané en dehors, remplie de moelle blanche , d'un gout amer & défagréable : il fleurie en été, 11 vient dans les bois. V e K t us. Ses fruits font purgatifs & vomitifs , au nombre de trois ou quatre. Extérieurement il eft vulnéraire , déterfif. PLANCHE T83. Thaliclrum , Rue des Prés, Viv. ON fe fert de toures les parties de la plante. La racine eft rampante, fîbreufe, jaunâtre, d'un gout défagréable, un peu amer. La tige s'élève de quatre à cinq pieds 8c plus , cannelée , creufe ; les feuilles font vertes , luifantes. Les fleurs font à quatre pétales, de couleur herbeufe; il leur fuccede des capfules à trois angles , qui renferment une graine

The text on this page is estimated to be only 20.10% accurate

TOME QUATRIEME. î4t oblotigue , très-menue , cannelée , d'un gout amer : elle fleurit Elle vient dans les prés & autres lieux humides. Ver tus. La racine eft purgative, ftomachique, apéririve : la dofeeft du triple de la Rhubarbe} les feuilles font laxatives à la dofe d'une poignée \ le fuc des feuilles & fleurs fe donne depuis une once jufqu'à deux. Extérieurement la graine eft aftringente. Cr — PLANCHE J84, Thlafpi vulgatius , Tarafpic, B. Ann. ON fe ferr de fa graine. La racine eft menue , dure , fibreufe , blanche , un peu acre. La tige sJéleve d'un pied , velue ; les feuilles font verd cendré , d'un gout acre & piquant. Les fleurs font à quatre pétales , blanches \ il leur fuccede un fruit o val , applati , compofé de deux panneaux ou loges, qui contiennent des graines plates, prefque rondes, noires, d'un gour acre & piquant : elle fleurie en été. Elle vient aux lieux incultes , fecs, parmi les bleds, fur les murailles. Thlafpi allium redolens , Tarafpic fentant l'ail , Ann, La racine eft fibreufe , blanche. Les tiges ne s'élèvent qu'à quatre ou cinq pouces ; les fleurs & fruits reflemblent à la précédente : elle fleurit au printemps. Toute la plante lent l'ail & a un gout allez agréable , & un peu acre. On la cultive dans les Jardins de Botanique.

The text on this page is estimated to be only 19.48% accurate

INDIGENES. PLANCHE jBj. Thlafpi Jîliquis latis , Tarafpie des champs, Ann. LA racine eft petite, oblique en terre, fibrée, blanche d'un gout acre , légèrement amer. La tige s'élève d'environ un pied , cannelée ; les feuilles font liftes , verd noirâtre , d'une odeur approchant de l'ail , d'un gouc un peu âcre. Les fleurs font petites , pareilles aux précédentes ; il lei]t fuccede des filiques larges & grandes , ainfi que les graines , qui font rouge brun , d'un gout âcre, chaud & piquant : ellefieurit au printemps. Elle vient dans les champs , parmi les bleds. Vertus et Usages des trois TarasficS. Leurs vertus font les mêmes. Elles font incifives , déterfives , apéritives , diurétiques, hy£ tériques : la dofe eft depuis un fcrupule jufqu à deux. Extérieurement elles font mafticatoires. La graine du premier entre dans la Thériaque , le Mithrt> dat. PLANCHE j86. Thymelœa foliis Liai, Garou, ViV« ON fe fert de fa racine. C'eft un fous-arbrifleau. La racine eft longue, gcolîe, dure, rongeât re en dehors* blanche en dedans , d'un gout doux d'abord , & enfuite brûlant & cauftique. La tige eft grofle comme le pouce j elle s'élève d'un pied à deux pieds de haut j les feuilles font toujours vertes. Les fleurs font monopétales en entonnoir , découpées en quatre, blanches; il leur fuccede un fruit, gros comme celui dii Myrte, Pl. rouge, charnu, ovale, fuccutent, qui contient une graine noire, blanche en dedans, d'un gout brûlant! // fleurit en été.

The text on this page is estimated to be only 12.96% accurate

TOME QUATRIEME. U4 Il vient aux Lieux incultes & proche de la -mer-, dans nos pays chauds & en Efpagne, en Italie; on le cultive dans les Jardiris de Botanique. Vertus. C'efl: un purgatif très-dangereux; c'eft pourquoi on ne s'eii fert pas intérieurement. Extérieurement la racine oft vefficatoire; o PLANCHE 587. Thymus C retiens 3 Thim de Crète, Viv, N fe fert de la plante. La racine eft dure, fibreufe. La tige & les rameaux s'élèvent à neuf pouces ou un pied : les remues lont blanchâtres , d'un gouc acte. Les fleurs font monopétales en gueule , purpurines : il ieuf fuccede quatre graines, arrondies au fond du calice : elle fleurit en etc. Toute la plante a une odeur aromatique très-agréable & uni gouc chaud & pénéttanr. ' Elle vient dans llfle de Candie , dans toute la Grèce en Efpagne. PLANCHE 588, Thymus, Thim,Viv* LA tige & les rameaux s'élèvent de Cix pouces ou environ' 3 les feuilles font verd cendré. . Les fleurs Se les fraies relfeniblerit à la première, ainfi que l'odeur agréable ; elle vient dans nos pays chauds ; on la esàuvé dans les Jardins. Vertus et Usages des deux Thims* Elles font céphaliques , béchiques , ftomachiques , eu infafïdri ou décoction. Extérieurement elles font réfotutives t fortifiantes; Les feuilles entrent dans l'Eau générale. Les fleurs darisle SU îop de Stœchas. Les fommité s fleuries dans la Décoction arof»*X

The text on this page is estimated to be only 20.28% accurate

344 INDIGENES, tique, la Poudre réjouitfance , l'Haï te de Renard. L'Huile di foliée dans le Baume nervin , apoplectique. L'Eau difliUée dans l'Eau de mille-fleurs. ' - -3 PLANCHE 5^9ThyJJelinum , Perfil de Marais, Viv. ON fe fert de la racine. La racine eft longue, rouge brun, empreinte d'un fuc laiteux , d'un gout âcre très-défagréable, La tige s'élève de quatre pieds, cannelée, creufe; les feuilles font laireufes comme la racine , d'un gout amer , âcre & défagréable. Les fleurs font en parafol, d'un blanc jaunâtre ; il leur fuccede deux graines accollées , larges , rayées : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux humides Se marécageux , dans les prés. Vertus. Elle eft incifive, pénétrante, apéritive, en décoction. Extérieurement elle eft mafticatoire. PLANCHE 59°' Tilia , Tilleul. ON fe fert de fes fleurs , des fruits , des feuilles. C'eft un grand arbre. La racine s'étend beaucoup &c s'enfonce profondément en terre. Le tronc eft couvert d'une écorce , cendrée en dehors , blanc jaune en dedans; le bois eft tendre, blanchâtre ; les feuilles font un peu velues, luifantes. Les fleurs font à cinq pétales , blanc jaunâtre , d'une odeur agréable; il leur fuccede une coque , grofle comme un gros pois, snguleûfe , velue , qui contient une ou deux femences arrondies , noirâtres, d'un gout doux : il fleurit en été. On le cultive dans les Jardins.

The text on this page is estimated to be only 17.03% accurate

TOME QUATRIEME. 34? iVERTus et Usages. Les fleurs font céphaliques : la dofe eft une pincée, infufée comme le The. Les baies font aftringentes ; la dofe eft un gros en poudre , dans bouillon -y les feuilles font apérinves , diurétiques , hyftéri1 Les fleurs entrent dans l'Eau générale, antiépileptique. L'Eau iiftrflee entre dans l'Eau d'Hyrondelle. un ques. PLANCHE 591. Tincïorius flos , Gaude , Ann. ON fe fert de fa racine. La racine eft greffe du petit doigt , dure , blanche, trèspeu hbree, d im gout de Creffon âcre. La tige s'éîeve de trois pieds , li(Tb , verdâtre. Les fleurs font à trois pétales inégaux , jaune verdâtre; il leur fuccede descapfules rondes, terminées par trois pointes. Elles renferment plufieurs graines arrondies, menues, noirâtres : elU fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes; on la cultive dans pluiîeurs Provinces pour la teinture jaune. Vertus» La racine efb apéritive en décoction. PLANCHE 5

The text on this page is estimated to be only 18.59% accurate

34* INDIGENES. Toute la plante eft pénétrée d'un kit âcre , brûlant, cauftiqne. Elle vient aux lieux montagneux. PLANCHE 593Tithy malus cataputia , Epurge , Ann. |f"*\N fe fert de fes fruits. \^_J La racine eft garnie de quelques fibres déliées. La tige s'élève à quatre pieds & plus, rougeâtre; les feuilles font IifTcs, verd bleuâtre. Les Heurs font à quatre pétales», jaunes ; il leur fuccede un fruit, gros comme une balle de piltolet, verd relevé de trois coins ou loges , chacune contenant une graine , grotte comme un grain de poivre , remplie d'une moelle blanche : elle fleurie en tft.'. Toute la plante eft laiteufe , d'un lait pareil à la première. On la cultive dans les Jardins. PLANCHE 594" Tithy malus amygdaloides^ Tithymalc à feuille d'amandier, Viv. /AN fe fert de fa racine. \Jr La racine eft menue, fibrée , dure, rouge brun en dehors , blanche en dedans , amere & âcre. Les tiges s'élèvent à un demi- pied ou un pied j les feuilles font verd de mer, d'un gout aftringent, âcre, amer. Les fleurs font à quatre pétales, jaune verdâtre ; il leur fiiecede un fruit verdâtre, lille, partagé en trois loges, dont chacune contient une graine roufTeâtre : elle fleurit en été. Toute la plante eft laiteufe comme les précédentes. Elle vient dans les plaines fablonneufes. Vertus des trois Tithymaus. Elles font toutes trois de violents purgatifs hydragogues. Les payfans le fervent du fruit de l'Epurge , depuis quatre jufqu'à douze. La racine de la dernière ci-defius en poudre , à la dofe d un

The text on this page is estimated to be only 15.40% accurate

TOME QUATRIEME. f47 demi-gros jufqu'à un gros dans un bouillon, rrois jours de fuite , purge violemment par haut Se par bas ; elle s'emploie pour guérir les fièvres intermittentes. Extérieurement leur lait eft dépilatoire & confomme les verrues. PLANCHE 59 J. Tordylium, Sefeli de Candie,, Ann. ON fe fert de fa racine Se graines. La racine eft menue , blanche. La tige eft haute d'un pied & demi à deux pieds , cannelée , yelue: les feuilles font velues, rudes. Les fleurs font en parafol , blanches ; celles du tour plus allongées que celles du milieu ; il leur fuccede deux graines accoPlées , ovalaires, applaties, bordées en grains de chapelet , odorantes , un peu acres : elle fleurit en été. Elle vient fur le bord des vignes, dans les bleds; on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus. La racine eft incifive, pectorale : la graine eft diurétique, hyftérique ; elle eft de peu d'ufage. P L A N C H E 59^Tormentil/a, Tormcn tille , Viv.. ON fe fert de fa racine. La racine eft un tubercule , gros an moins comme le pouce , inégale , ou droite , ou oblique en terre , noirâtre en dehors, rougeâtre en dedans, un peu Jàbrée, d'un gout allongent &; amer. Les tiges font longues d'environ un pied , couchées à terre ; les feuilles l'on: velues,. Les fleurs font à quatre pétales, jaunes; il leur, fuccede un fruit prefque rond , qui contient nombre de graines menues , oclongues : elle fleurit en été. Elle vient prefque par-tout, aux lieux incultes. X3

The text on this page is estimated to be only 19.08% accurate

343 INDIGENES. Vertus et Usages. Elle eft vulnéraire , aftringenre : la dofe effc depuis demi- once jufqu'à une once en décoction dans une pinte d'eau; ou en fubfrance, & en poudre depuis demi gros jufqu'à un gros. Extérieurement elle eft delîîcative & cicatrifante. ^ Elle encre dans l'Eau générale, la Décoction aftringenre, le Diafcordium , la Confection d'Hyacinthe. L'extrait entre d'ans la I hériaque céiefte. PLANCHE T97Tragopogon , Sciiïifi , B. Ann. /\N fe fert de fa racine. _J La racine eft grofle du petit doigt % longue, droite en , laireufe , douce au gout. La tige s'élève d'environ deux pieds, creufe. Lt-s Heurs jonr à demi fleurons, d'un bleu pourpre; il Ieut fuccede des graines allongées, rondes, cannelées, iudes, noirâtres , aigt ettées : elle fleurit en été. Toute la plante eft pleine d'un lait doux. On la cultive dans les Potagers. PLANCHE 59^Tragopogon pratenfe 3 Serfifi fauvage, B. Ann. TT? Lie reiïemble beaucoup à la précédente ; les différences font JIL qu'elle ne s'élève pas rout-à-fait tant , que fes fleurs font jaunes , & que les graines font de couleur cendrée. Elle vient dans les prés. Vertus des deux Sersifi. Elles font apérkives , ftomachales , pecLorales , émollientes ; on peut les fubftiruer à la racine de Scorfonere, Pl. 532. j mais leurs vertus font plus foibles. Extérieurement les feuilles du Serfifi fauvage font déterlîves, confondantes.

The text on this page is estimated to be only 22.04% accurate

TOME QUATRIEME. 349 PLANCHE Tribulus terreflris , Saligot terre ftre , Ann. ON fe fert du fruit. La racine eft longue , fibreufe, blanche. Les tiges font longues d'environ demi-pied , couchées par terre, velues, rougeâtres r les feuilles font velues. Les rieurs font à cinq pétales, jaunes -y il leur fuccede un fruit dur, armé de plufieurs pointes qui partent de cinq cellules , qui renferment des gtaines oblongues : elle fleurit en été. Elle vient dans nos pays chauds, en Italie, en Efpagne. Vertus. Elle eft déterfive , aftringente , apéritive : la dofe en poudre eft depuis un fcrupule jufqu'à un gros. PLANCHE 600. Tribulus aquaticus , Châtaigne d'eau, Ann. ON fe fert du fruit. De la bafe du fruit qui germe au fond de l'eau, s'élève une racine ou tige garnie par intervalle de quatre filets , découpés profondément , imitants la difpofition des barbes de plumes non prelîées. Cette racine groflit par dégrés , & forme hors de l'eau une tête de laquelle partent les feuilles, dont la queue a un renflement •, elles font liftes. Les fleurs font à quatre pétales, blanches; les pédicules qui les foutiennent font duvetés; il leur fuccede un fruit , gros comme une petite Châtaigne, noir, armé de quatre grolfes pointes liffes , qui renferme une amande blanche, d'un gouc tirant fur la vraie Châtaigne : elle fleurit en été. Elle vient dans l'eau, toit courante ou dormante. Vertus. Elle eft aftringente, rafraîchiflante , réfolutive, intérieure-» ment & exténeuremenr. X

The text on this page is estimated to be only 13.77% accurate

INDIGENES. o PLANCHE 6oi. Trifalium ojficinarum , Tretfle des Prés, Viv ' iN fe fert de la plante. rWfe La raC1U2 ^ gl°flC d'envir°n Ie Petit doiSc » rampante , Les tiges s'élev-ent d'un pied & demi , cannelées; les feuilU font marquées d'une tache noire ou blanche dans leur milieu Les fleurs font légumineufes , ramaflees en une tête pour" près, dune odeur foible allez agréable, d'un gouc légèrement aitrwgent; il leur fuccede une petite capfule ronde , terminée en queue, qui contient une graine faite en rein : elle fleurit en ete. J Elle vient dans les prés 8c autres lieux humides. Ver tus. Elle eft déterfive, rafraîchi flan te, adouciflànte , intérieurement & extérieurement. PLANCHE 602. Trifotium lagopus Pied de lièvre, Ann. ON fe fert de la planre. La racine eft tortue , dure, fibreufe , blanche. La tige s cleve d'un demi-pied , couverte d'un duvet blanchâtre-, les feuilles font lanugineufes , blanchâtres. Les fleurs font légumineufes, ratfemblées en épis ou têtes, blanches; l'épi , en général, aune couleur cendrée ; il eft garw de duvet; il leur fuccede une petite capfule ronde , terminée par vue queue, qui contient une graine faite en rein: elle fleurît en été'. Elle vient, dans les. bleds. Toute la plante a un go.ut aftringent, defficatif. Vertus. Elle eft aftringente : la dofe une poignée fur trois chopines d'eau , réduites à une pinte,

The text on this page is estimated to be only 19.12% accurate

TOME QUATRIEME. PLANCHE 6o$. Trlfolium bizuminofum 3 TrefHe odorant , Viv. C'Eft un foiis-arbriffeau ■ on fe fert de fon fuc. La tige eft baffe; la hauteur, en général, eft de trois pieds ou environ; les feuilles font verd clair, velues , vifqueuies , d'une forte odeur . de bitume. Les rieurs font legumineufes , pourpre violet ; le calice eft velu • il leur fueœde une capfule , qui contient une graine noirâtre , pointue, rude, d'une odeur & d'un gout légumineux : il fleurit en été. Il vient aux lieux pierreux, vers la mer, dans nos pays chauds , en Candie, en Sicile ; on le cultive dans les Jardins de Botanique, Vertu s. C'eft un remède contre le cancer : la dofe du fuc eft depuis une cuillerée jufqu'à deux , dans deux ou trois verres d'eau. PLANCHE 604. Trlfolium lotus Jîliquofa , Lotier hémorrhoïdal , Viv» ON fe fert de fes feuilles, La racine eft longue, dure. Les tiges s'élèvent à deux ou trois pieds, velues, dures; les feuilles font cotonneufes, blanchâtres, d'un gout très-aftringenr. Les rieurs font legumineufes, blanchâtres; il leur fuccede des filiques un peu greffes , de couleur rouge brun , qui contiennent une graine ronde, petite, jaunâtre : elle fleurit en été. Elle vient en Languedoc & autres pays chauds. Vertus. La Poudre des feuilles feches eft adouçiffante , à la dofe d'un ou deux gros.

The text on this page is estimated to be only 18.82% accurate

INDIGENES. PLANCHE 605\ Trifolium lotus corniculata , petit Lo-tier, Viv,, ON fe fert tic la plante. La racine cil menue, longue, dure, noire, branchue, rampante, ribrée, d'un gout douceâtre, aftringenr. Les tiges fe couchent d'abord, puis fe relèvent; elles deviennent longues de huit à neuf pouces, d'un gout aftringent. Les fleurs font légumineufes , jaunes; il leur fuccede des capfules longues & étroites , qui renferment plusieurs graines taillées en rein : elle fleurit en été. Elle vient prefque par- tour. Vertus. Elle eft déterfive, apéricive, vulnéraire", maïs on s'en fert rarement. o PLANCHE 606. Trhicum , Froment, B. Ann. N fe fert de l'écorce de fon fruit, nommée flon , d'une préparation de fa pulpe , nommée amidon , de £1 farine aigrie, appellée levain , & de fa farine cuite , nommée pain. La racine eft compofée de plufieurs fibres déliés. _ Les ti^es , ruyaux ou pailles s'élèvent à quatre ou cinq pieds, creux; les épis font fans barbes; les fleurs qui en forcent font àétamines; il leur fuccede des graines ovales, fillonnées d'un côté , jaunes en dehors , remplies d'une pulpe blanche : elle fleurit en été. . Cette plante a beaucoup de variétés ; on La cultive dans les champs , en prefque tous les pays habités. Vertus. Le fon eft rafraîchiiTant , adouciffant, pectoral , émollieni, déterhï en «fane, en décoction : extérieurement il eft emollient, réfohitif. . L'amidon eft pectoral, rafraîchiiTant, mcrallant. Le levain eft maturatif,? , • „_„ 1 . . ,r . ■ > extérieurement. La mie de pain relolucive , i

The text on this page is estimated to be only 22.89% accurate

TOME QUATRIEME. jjj PLANCHE 607. TuJJlllago , Pas d'âne, Viv. ON fe fert de fes fleurs , feuilles & racines. La racine eft rampante, longue, menue, blanchâtre. Les fleurs viennent au premier printemps ^ avant les feuilles -, les tiges qui portent les rieurs , selevent d'environ un pied , creufes , cotonnées , rougeâtres , accompagnées de folioles. Les fleurs font radiées, jaunes j il leur fuccede des graines oblongues , applaties , aigeettées : quand les fleurs font pafTées , les feuilles paroiflent j elles font vertes en deflus, blanchâtres Se cotonneufes en deflbus , ameres, gluantes, un peu aftringentes. Elle vient aux lieux frais & humides. Vertus et Usages. Elle eft béchique, adouciflante : la dofe eft deux ou trois pincées , feuilles & fleurs ; par pinte de liqueur en déco&ion. Extérieurement les feuilles font adouciftantes. La racine entre dans le Sirop d'Eryfimum. Les feuilles dans le Sirop de grande Confoude , de Tortue. Les fleurs dans la décoction peétorale , le Sirop de Roflblis. PLANCHE 608. Valeriana hortenjîs , Valériane des Jardins , Viv. ON fe fert de fa racine. La racine eft grofle du pouce , à fleur de terre , fibreufe en deflous, de couleur jaune brun, d'une odeur forte, défagréable , d'un gour aromatique. Les tiges selevent d'environ trois pieds, liflès, creufes ; les feuilles font lifles. Les fleurs font monopétales en tuyau découpé en cinq , blanc pourpre , d'une odeur douce de jafmin ; il leur fuccede une graine oblongue, applarie, aigrertée : elle fleurit en été. Elle vient dans les Alpes & hautes montagnes y on la cultive dans les Parterres.

The text on this page is estimated to be only 16.58% accurate

354 INDIGENES. Vertus et Usages. Elle eft apéritive , diurétique , fudorifîque : U dofe en poncTre dans le vin blanc , eft depuis un gros jufqu'à deux , & en tifane depuis deux gros jufqu'à demi-once. Elle encre dans la Thériaque, le Mirhridat , le Laurea alexandrina. PLANCHE 609. Valeriana fylveflrh , Valériane des bois, Viv. ON fe ferc de fa racine 8c feuilles. La racine eft rampante, fibteufe , blanchâtre, d'une odeur pénétrante, d'un gout aromatique. La tige s'élève à la hauteur d'un homme, creufe, cannelée, un peu velue ; les feuilles font un peu velues en délions. Les fleurs font monopétales, partagées en cinq, difpoféesen parafol, d'un blanc rougeârre; il leur fuccede des graines aigrettées : elle fleurit en été. Elle vient dans les bois humides. Vertus et Usages. Elle eft antiépileptique , fudorifîque , hyftériqtie : la dofe des racines en décoction, eft depuis deux gros jufqu'à demi-once, St en poudre depuis demi-gros jufqu'à un gros. La racine entre dans l'Eau générale, Thériacale , d'Hyrondelie , Epileptique, le Mithridat , l'Orviétan, la Poudre de Gutcece, l'Onguent Martiarum. La racine & les feuilles encrent dans l'Emplâtre Diaboranum. L'extrait entre dans la Thériaque céiefte. PLANCHE 6lO. Valeriana palujîris } Valériane aquatique, Viv. ELIç reffemble beaucoup à la précédente \ les différences font que la racine a une odeur agréable ; que la tige ne s'élève que d'environ un pied ; quelle fleurit au printemps ^ & qu'elle vient aux lieux aquatiques, marécages: x,

The text on this page is estimated to be only 19.51% accurate

TOME QUATRIEME. 355 Vertus. Elle a les vertus des précédentes , mais plus foibles ; on s'en fer t. rarement. PLANCHE 6 II. Vakrianella , Mâche, Ann. ON fe ferr de la plante. La racine eft menue, fibreufe, d'un gout doux. La tige s'élève d'un demi-pied, cannelée, creuiej les feuilles font verd pâle , d'un gout douceârre. Les fleurs iont monopérales en tuyau refendu en cinq ; il leur fuccede une graine un peu applatie, blanchâtre : elle fleurit en été. Elle vient dans les bleds , dans les vignes. Vertus. Elle eft rafraîchiflante, déterfive, antifcorbuùque , adouciffante. PLANCHE ^12,. Veratrum hdlcborafter , Pied de griffon, B. Ann. ON fe fert de fa racine. La racine eft oblique en terre , fibreufe , dure j fon ccorce eft noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans, un peu acre, amete. La tige s'élève d'un pied & demi, verd rougeâtre, d'une odeur défagréable; les feuilles font verd noirâtre. Les fleurs fonc à plufieurs pétales , verdârres ; il leur fuccede un fruir, compofé de plufieurs fihques cornues, ralïemblées , qui contiennent des graines noires , prefque rondes : elle fleurit au printemps. Elle vient dans les bois, aux lieux incultes , montagneux. Vertus. On ne s'en fert point intérieurement; on en fait des fêtons aux beftiauxj pour attirer l'humeur en dehors.

The text on this page is estimated to be only 18.66% accurate

INDIGENES. PLANCHE 613. Verbafcum mas, Bouillon-blanc, B. Ann. ON fe fert de fes fleurs & feuilles. La racine eft aflez girolle , longue , dure , blanche , fibreufe. La rige devient haute de cinq à fix pieds, cotonneufe; les feuilles font cotonneufes & blanches delfus & deflous. Les fleurs font monopétales, découpées en cinq, jaunes; il leur fuccede une coque ovale , divifée en deux loges , qui renferment quanriré de graines menues , anguleufes , noirâtres : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes, fecs & fablonneux. Verbafcum fœmina y Bouillon-blanc femelle, B. Ann. Elle reffemble en tout à la précédente, excepté qu'elle ne s'élève pas tant , que les rieurs fonr un peu plus grandes , les feuilles plus longues & plus pointues , &c que les graines tirent fur le brun ; elle vient aux mêmes lieux. Vertus et Usages des deux Bouillo n-b l a n c. Elles font les mêmes. Elle eft adoucilfante, vulnéraire, refolurive, peélorale; on prend les fleurs par pincées , en infulion comme le Thé. Les feuilles entrent dans l'Onguent Populeum. PLAN C H E 614. Verbena, Verveine, B. Ann. ON fe fert de toute la plante. La racine eft fibree, oblongue blanche, légèrement amere. La tige s'élève d'un pied & demi ; les feuilles fonr d'un verd plus foncé en deffus qu'en de (Tous , d'un goût amer , défagréable. Les fleurs fonr monopétales en tuyau, découpées en cinq, bleues ou blanchâtres ; il leur fuccede quatre graines oblongues, au fond du calice : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incultes.

The text on this page is estimated to be only 17.35% accurate

TOME QUATRIEME. 3J7 Vertus et Usages. Elle eft déterfive, vulnéraire, hyftérique , fébrifuge : la dofe en infuhon eft quatre onces; celle du fuc eft depuis deux onces juiqu a quatre. Extérieurement elle eft réfolutive. Les feuilles entrenr dans l'Eau vulnéraire, la Poudre contre k rage, l'Onguent Mondifieatif d'Ache , l'Emplâtre de Bécoine. Ltsjommités entrent dans l'Huile de fcorpions compose. PLANCHE 6x5*. Verbejina, Chanvre aquatique, Ann. ON fe fert de la plante. La racine eft fibrée , blanche , d'un gout aromatique. La tige scleve de deux à trois pieds, unpeu velue, rougeatre ; les feuilles font hfles , d'un gout un peu acre. Les fleurs font à fleurons , jaune verdâtre ; il leur fuccede des graines oblongues, anguleufes, rougeâtres, terminées par trois pointes : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux aquatiques , marécageux. Vertu s. Elle efl: vulnéraire, apéririve, diurétique, hyftérique j cependant elle eft peu en ufage. PLANCHE 6l6. Veronica mas } Véronique mâle, Viv. ONfefertde route la plante. La racine eft déliée , fibreufe , cparfe en terre. Les tiges font longues de Cix pouces, couchées fur terre; les feuilles font verd pâle, velues, d'un gout amer & acre. . Les fleurs font monopétales , découpées en quatre, bleu clair; U leur fuccede un fruit plat, raillé en cœur, partagé en deux loges, qui contiennent plufieurs graines menues, arrondies, noirâtres : elle fleurit en été. Elle refte verte toute l'année. Elle vient aux lieux incultes , arides , dans les bois.

The text on this page is estimated to be only 18.75% accurate

3S8 INDIGENES. PLANCHE 617. Veronica p rat en fis , Véronique des prés, Viv. LA racine eft menue , longue , rampante , fibreufe. Les tiges s'élèvent de près d'un pied, velues. Les fleurs font d'un beau bleu , pareilles , ainfi que les graines, à la précédente. Elle vient dans les prés humides. PLANCHE 618. Veronica fœmina minor , Véronique de haie, Ann< LA racine eft rampante , fibreufe. Les tiges s'élèvent d'un pied &: plus , velues -y les feuilles font velues , verd .foncé. Les fleurs font vrai bleu &c comme les précédentes , ainfi que les graines. Le gout de la plante eft un peu amer. Elle vient dans les bois &C pâturagesPLANCHE Veronica fpicata , Véronique à épi, Viv. LA racine eft oblique en terre , fibreufe. La tige s'élève d'un demi-pied droite ; les feuilles font velues. Les fleurs 8c fruits comme les précédentes. Elle vient dans les pâturages & bois fabbnneux , & arides. Vertus et Usages des quatre Véronique5, La première ou la mâle eft .préférée à toutes les autres, & eft très-célebre en Médecine ; on la nomme même le The de l'Europe on peut lui fu.bftituer les trois autres. Elle eft fudorifique, vulnéraire, déterfive , diurétique, pectorale : la dofe des feuilles eft une pincée en infufion dans un demi-fecier d'eau , ou une petite poignée dans un bouillon. Extérieurement elle eft vulnéraire, déterlive. . JulC*

The text on this page is estimated to be only 17.03% accurate

TOME QUATRIEME. $5s> Les feuilles de Véronique mâle entrent dans l'Eau vulnéraire, générale, le Baume vulnéraire, le Mondificadf d'Ache. Le fui entre dans l'Onguent Oppodeitoc. «jM^^^— — MM— — ■■ III I J PLANCHE 6Z0> VibarnUtn s Viorne» ON fe fert de fes baies & feuilles. C'eft un arbrilfeau. La racine court à fleur de terre. La tige & les rameaux s'élèvent à dix ou douze pieds j ï'éeorcô eft blanchâtre & comme farineufej les Feuilles font velues, cotonneufes, plus blanchâtres en delTous qu'en deflfus , d'un gouc aftringent. Les rieurs font monopérales , découpées en cinq, blanches,.' odorantes, imitant l'odeur du Sureau^ il leur fuccede des baiest molles , prefque ovales , noires, d'un gout douceâtre , peu agréable, qui contiennent une graine applatie, cannelée, très-dures il fleurit en été V E r f u s. Il eft rafraîchilfant, aftringent, en décoétiun , en gargarifmeY M— i — w^^MSa. ■ ■ —É— — — — — ■■ rtwt ■ - - ^ i PLANCHE *>2I. Vicia> Vefce, Ann4 ON fe fert de fa graine. La racine eft déliée , fibretffe. Les tiges s'élèvent d'un pied & demi à deux pieds , câhneîéeS J creufes , velues • les feuilles font velues ; la côte à laquelle elleiî tiennent, finit par une main qui faille les corps voifins , ail moyen de quoi la plante fe foutienr. Les fleurs font lëgumineufes , purpurines ou bleuâtres ; il leur fuccede des gouffes à deux colfes , qui contiennent des gfâifieS prefque rondes , noires , d'un gour défsgréable : elle fleurît enété. 11 fe trouve une Vefce dont les graines font couleur de chair, d'ailleurs refTembîant à la ptécédente. On cultive la Vefce dans les campagnes. X

The text on this page is estimated to be only 20.24% accurate

INDIGENES. Vertus. Elle eft aftringente, épaiflïfTanre , confolidante ; fa farine fe fubftirue à celle d'Orobe , Pl. 4 j z. ne Extérieurement elle eft émoîliente, réfolutive, fortifiante. PLANCHE 622. Viola mania , Violette de Mars , Yiv, ON fefert de fes feuilles, fleurs & racine. La racine eft fibrée , touffue. Elle n'a point de tiges- elle jette des filets qui prennent raie çi & H ; les pédicules des fleurs s'élèvent à quatre ou cm» cmc quatre ou cinq pouces. 7 Les feuilles font vertes toute Tannée. Les fleurs font à cinq pétales violets , d'une odeur très-a°réable, d'un gout un peu acre j il leur fuccede une coque ovale remplie de plufieurs graines prefque rondes , blanchâtres : elle, fleurit au premier printemps. Elle vient aux lieux ombrageux , incultes ; on la cultive dans les Jardins. Vertus et Usages. _ Les fleurs font une des quatre fleurs cordiales; elles font laxatives, rafrakhiflantes ; les calices des rieurs & les graines font très-purgatives; les racines données à la dofe de deux ou trois onces , font purgatives & vomitives ; les feuilles font adouciffantes , diurétiques , laxatives. Les feuilles entrenr dans l'Onguent Populeum , dans le lavement émollient de la Pharm. de Paris. Les fleurs dans le Sirop d'Eryfimum, de Tortue, le Requies , la Poudre Diamargaritum frigidum. Les fleurs & graines dans l'Eleftuaire lénitif , le Diaprun. Les graines dans l'Eleétuaire Pfyllium , le Catholicum, le Diaphonie, la Confe&ion Hamech, les Pilules ^ quitus.

The text on this page is estimated to be only 17.72% accurate

TOME QUATRIEME. PLANCHE 623. Viola matronalis , Julienne, Viv» ON fe fer: de fes feuilles & fleurs. La racine eft petite, dure, blanche. Les tige» s'élèvent de deux pieds, velues, moëïleufes 1 le» feuilles font velues, dun gout un peu acre; elles relient vertes toute 1 année. Les fleurs font à quatre pétales , blanches , tirant fur le pour, pre, marbrées de blanc & de rouge, d'une odeur trèsXéable; il eut fuccede de longues flhques, féparées par une cloiion ; elles contiennent plufieurs graines applaties, ovales , rouf. ieatres , acres : die fleurit en été. On la trouve quelquefois dans les bois; on la cultive dans les Jardins. Vertus. Elle eft incifive , âpéritive , antifcorbutique , fudorifique, pectorale ; cependant on s'en fert rarement. PLANCHE 624. Viola lunaria , grande Lunaire , B. Ann. ON fe fert de fes graines. La racine eft glanduleufe & par tubercules. La tige s'élève de deux à trois pieds , velue , verd de mer s les feuilles font velues, ayant un gout d'herbe. Les fleurs font à quatre pétales , pourpre clair , rayées de pourpre , de peu d'odeur ; il leur fuccede de grandes flliques , plates , arrondies , d'un blanc argenté, hufanc, renfermant des graines taillées en rein , de couleur rouge brun , d'un gout trèsacre , un peu amer ; elle relie verte tout l'hiver : elle fleurit en été. Elle vient aux pays froids , fur les hautes montagnes j on 1% cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus. Elle eft incifîve, déterfive, apéritive, vulnéraire, diurétique-, Udofe eft depuis un fcrupule jufqu'à un gros.

The text on this page is estimated to be only 18.94% accurate

INDIGENE S. PLANCHE 6l J. Viorna clematïtis , Herbe aux gueux, Viv. ON fe fert de fa féconde écorce & de fes feuilles. La racine eft allez greffe , hbreufe , rougeâtre. Les tiges font groffes , farmenteufes, rudes , anguleufes , s'attachant &c s'entortillant aux arbuftes & arbres voiiîns, montant ainfi jufqu'au haut des grands arbres j les feuilles ont un goût acre. Les rieurs font à quatre pétales, blanches , odorantes ; il leur fuccede plufîeurs graines affemblées , terminées par de longues barbes chevelues : elle fleurît en été. Elle vient dans les haies , dans les grands bois. V E R T ¥ S. Elle eft trop cauftîque pour s'en fervir intérieurement. Extérieurement elle eft déternve. PLANCHE 626. Vipérins. , Herbe aux vipères , B. Ann. ON fe fert des mêmes parties qu'on emploie dans la Buglofe, Pl. ily. La racine eft greffe du pouce, dure, longue, La tige s'élève de plus de deux pieds , velue , verte , marquetée dépeints noirs, rudes, imitant une peau de ferpent; les feuilles font velues, rudes, d'un gout fade. Les fleurs font monopétales en entonnoir , refendues en cinq parties inégales , bleu purpurin; il leur fuccede quatre femences, îemblables à ta tête dune vipère, au fond du calice j elle refte verte tout l'hiver : elle fleurit en été. Elle vient prefque par-tout, aux lieux incultes, dans les bleds. Vertus. Elle eft hume&ante , émollienre , pectorale ; mais inférieurement à la Buglofe, à laquelle on peut la fubftituer.

The text on this page is estimated to be only 18.80% accurate

TOME QUATRIEME. 36| PLANCHE 627. Virga aurea. y Verge d'or, Viv, ON fe fert de fes feuilles & fleurs. La racine eft traçante , brune , fîbreufe , d'un gout aromatique. La tige s'élève de trois pieds Se plus, cannelée, moëlleufe j les feuilles font velues , verd foncé. Les fleurs font radiées , jaune doré ; il leur fuccede des graines oblongues , aigtettées : elle fleurit en été. Elle vient dans les bois , en terrein fec & montagneux. Vertus et Usages. Les feuilles & fleurs entrent dans les Vulnéraires Suijfes; elles font déterlîves , vulnéraires , diurétiques : la dofe en infufion-, eft une pincée fur deux rafles d'eau bouillante. Elle entre dans l'Eau générale. PLANCHE 628. Vifcum, Gui. ON fe fert de fon bois & du fruit. Ceft un fous-arbrifleau parafite , qui ne vient jamais fur la terre, mais fur plufieurs efpeces d'arbres, tant fauvages-, que fruitiers : on eftime mieux celui qui vient fur le Chêne j c'eft une ancienne opinion à laquelle il ne faut pas s'arrêter. La racine eft verte en deiiùs , ligneufe dans fon milieu , ferpentant dans la fubftance de i'écorce des branches de l'arbre fur lequel il croît. Les tiges font gtoiTes du peut doigt , inclinées en-tous iens, longues d'environ deux pieds, verd brun en dehors, blanc jaunâtre en dedans; les feuilles font épaifles, dures, verd jaunâtre , d'un- gout douceâtre , peu amer & aftringent , d'une odeur défagtéable. Les fleurs font monopétales en cloche , découpées en quatre , verdâtres, ftérites; les fruits précédés de fleurs pareilles viennent fur d'autres pieds j ce font des baies rondes, couleur de

The text on this page is estimated to be only 11.30% accurate

3 Canndée' «»l Les fleurs font en parafai, blanchâtres; il leur fuccede deu* graines açcollées , velues , d'un gout âcre telle fieJZll Llle vient aux pays chauds , en Italie, en Èfpaone en Lan guedoci on la cultive dans les Jardins de Botanique? Vertus. Elle eft apéritive, diurétique, hyfténque ; maison s'en fett peu PLANCHE 630. Vais y Vigne. 0N r"6 fett de feS fruics > <3U'°» nomme Raifins. V-^ La racine eft longue , dure, peu profonde. wtZ farmenteufes > rorc«es 5 I ccorce eft brun rotiSv rorn! Pr0"e T^ntuàema[ns 011 vnlles> qui s'attachent S } feutlles font vertes, luifantes, dun gouc Les fleurs font a cinq pétales , difpofés en rond, réunis pac leur pointe, jaunâtres, odorants j il leur fuccede des baies ton

The text on this page is estimated to be only 19.48% accurate

T O ME QUATRIEME. %ç% des ou ovales, verd pâle , ou rouges, ou noires, remplies d'un fuc doux Se agréable , qui contiennent cinq graines formées en cœur : elle fleurit en été. II y a quantité d'efpeces de vignes que l'on cultive , tant dans les pays chauds , que tempérés. Les deux grappes qui font dans l'eftampe, font voir différentes groffeurs de railins , ainli que leurs formes , plus rondes ou plus allongées. Vertus. La liqueur qui fort des jeunes pouffes , coupées au printemps, elt apéritive intérieurement , déterlîve extérieurement. Les bourgeons & feuilles en poudre , font aftringents à la dofe d'un gros , dans un bouillon. Le bois eft fort apéritif, fa cendre prife à la dofe d'une once , dans une pinte d'eau. Le verjus ou raifin non encore mûr , eft rafraîchiffant & un peu aftringent. Les raifins bien mûrs font laxatifs & pectoraux , pris en petite quantité. Le marc de raijin eft fudorifique & nervin, extérieurement. L'Eau dévie 8c t'EJprit de vin _, doivent être pris modérément dans l'intérieur; mais extérieurement ils font vulnéraires, déterfîfs. Le vinaigre ou vin aigri , eft rafraîchiffant ëc aftringent , pris modérément , Se alexitaire extérieurement. Le vin eft ftomachique & cordial. PLANCHE 63 I. Vais idœa, Myrtille , airelle, Viv. ON fe fert de fes fruits. C'eft un petit fous-arbriffeau. La racine eft menue, iigneufe, rampante. 11 s'élève d'un pied ou un pied & demi \ fon écorce eft verte; les feuilles font liffes , d'un gouc aftringent. Les rieurs fonr monopétales en grelot, d'un blanc rougeatre ; il leur fuccede des baies, groffes comme un grain de Genièvre, Pl. 88, fucculenres, bleu foncé ou noirâtres, d'un gout aftringent , un peu acide , allez agréable , qui contiennent plufieurs graines menues, d'un rouge pâle : il fleurit en été. Il vient aux lieux incultes , dans les bois, Y4

The text on this page is estimated to be only 14.08% accurate

INDIGENES, Vertus. La poudre des fruits féchés eft aftringente, depuis un gros Juf_ qu'à deux j en décoction jufcju'à demi-once. Le fuc ou'rob eft aftnngent, calmant. o PLANCHE 632. U /maria, Reine des prés, Viv. N fe ferr de fa racine. La racine eft afTezgrofTe, longue du doigt, noirâtre en dehors, rouge brun en dedans, garnie défibres rougeâtres, odorante. La tige s'élève de trois pieds, anguleufe, creufe, line, rougeâtre; les feuilles ion t vertes en deflus, blanchâtres en dèifous. Les Heuis font à phifieuis pétales , blanchâtres, j'une QCjeu* agréable; il leur fuccede un fruit à plufieurs gaines, torfes, ramalïees enfenible, qui contiennent chacune une graine affez menue : elle fleurit en été. Elle vient dans les prés & autres lieux humides, Vertus et Usages. Elle eft fudorifique, cordiale, vulnéraire, en décodtion : la dofe de l'extrait eft un gros. Extérieurement elle eft vulnéraire , déterfîve. Elle encre dans l'Eau générale. Les feuilles dans le lait alexitaire de la Pharm. de Paris, PLANCHE 633. Ulmus y Orme. ON fe fert de î'écoxce & des feuilles. C'eft un grand arbre. La racine eft grolfe , dure, traçant au loin de côté & d'autre; peu profondément en terre. Le rronc eft gros; l'étorçe eft raboteufe, rude, de couleuc cendrée, rougeâtre ; les feuilles font verd peu foncé. Les fleurs nailfenr au printemps, avant les feuilles; elles font . monopétales en entonnoir, à pavillon découpé, garnies de pe

The text on this page is estimated to be only 17.13% accurate

TOME QUATRIEME. 3€7 tires etamtnes de couleur obfcure; il leur fuccede un fruit aflez grand, plat, prefque ovale, qui renferme une graine plate, blanche . uiccuiente , douce au goût. 11 vient dans les bois ; on le cultive en avenues & en différents plans. Vertus et Usages. Il eft aftringent. Extérieurement il eft incarnntif. Les velLes qui viennent fur fes feuilles, font creufes & fervent de nid à des pucerons , efpece d'mfeétes qui s'y nourrirent d'une liqueur graffe & huileufe , qu'on y trouve en les ouvrant:cette liqueur eft vulnéraire, aftringënte, Le mucilage de l'écorce moyenne d'Orme entre dans l'Emplâtre de mucilage de la l'harm. de Paris. PLANCHE 634. Umh'dicus Veneris, Nombril de Vénus, ON fe fert de la plante. La racine elt tubéreufe, charnue, blanche, fibreufe en délions. La tige s'élève d'un pied & demi & plus; les feuilles font épaifïes , fucculentes , verd de mer , d'un gout gluant Se inlîpide. Les fleurs font monopéraies en cloche, découpées, blanches ou purpurines -y il leur fuccede un fruit à plufieurs gaines membraneufes , qui renferment des graines fort menues : elle fleurit au printemps. Elle vient aux lieux arides , fur les rochers. V — ■ ■ ■„ ■■,..,. , , m.-—, „„ mm PLANCHE 635Xlmbilicus Vencris alter, Cotylédon à fleurs jaunes, Viv. LA racine eft longue , rampante. La rige eft rougeârre & ne s eleve pas tant que la précédente. Les fleurs font monopétales en cloche, découpées en cinq, jaunes j il leur fuccede un fruit, compofé de cinq caufules oblon

The text on this page is estimated to be only 20.58% accurate

3^8 w INDIGENES. gues j pointues , verdâtres , remplies de graines rougeâtres , trèsmenues : elle fleurit au printemps. Elle vient en Portugal; on la cultive dans les Jardins de Botanique. Vertus et Usages des deux Nombrils de Vénus. La première eft la plus ufitée ; on peur lui fubftituer la féconde. Elle eft i-afraîchiflante & peut être elle-même fubftituée à la Joubarbe, Pl. 536. Les feuilles entrent dans l'Onguent Populeum. PLANCHE 6$6. Une do , Arbouiler. ON fefert de fes feuilles, écoree 8c fruits. C'eft un petit arbre. La racine eft aflèz groffe, dure, ligneufe. Lecorce eft rude ; les feuilles font liues, toujours vertes. Les Heurs font monopétales en grelot, blanches, d'un^ odeur agréable ; il leur fuccede un fruit auez ferablable aux fraifes , mais bien plus gros , charnu , d'un beau rouge , d'un gout un peu auftere, nommé Arboufe 3 partagé en cinq loges, qui renferment plufieurs graines menues, olfeufes : il fleurit en automne. Il vient dans les bois, fur les montagnes , en Italie, en Efpagne & dans nos pays chauds. Vertus. Il eft aftrîngent , mais de peu d'ufage en Médecine. PLANCHE 637. Urtica major , grande Ortie, Viv. ON fe fert de la plante. La racine eft traçante, menue, flbrée, jaunâtre. Les tiges s élèvent de trois pieds & plus, quarrées, creufes, couvertes d'un poil piquant j les feuilles font remplies de poils très-piquants & brûlants. Les rieurs font à étamines , de couleur herbeufe, ftériles ; ks fruits naiflènt fur d'autres pieds ; ce font des capfules pointues ,

The text on this page is estimated to be only 19.46% accurate

TOME QUATRIEME. ,

The text on this page is estimated to be only 16.95% accurate

37? INDIGENES. PLANCHE 639. Ufnea > Ufnée. C'Eft une moufle verte qui vient; fur les pierres, quelquefois fur le crâne humain ; il s eleve de petits pédicules qui fo^ tiennent des capfules oblongues. Vertus et Usages. ^Quelque part où on la trouve, elle a la même vertu, qui eic d'être aftringente extérieurement. Elle entre dans les Poudres de Sympathie, dans la Pierre de Butler, dans l'Onguent d'Arquebufade. PLANCHE 640. Vulneraria rufiica , Vulnéraire despayfans, Ann. ON fe fert de la plante. La racine eft noirâtre, droite , longue , d'un gout Iégumilieux. Les tjaes s'élèvent d'un pied , velues , un peu rougeâtres j les feuilles font velues, blanchâtres en deffous , verd jaunâtres ea d'eflus , d'un gout douceâtre , un peu acre. Les rieurs font légumineufes , jaunes ; le calice eft lanugineux, argentin; il leur fuccede une veflîe, qui contient une capfule, laquelle renferme une ou deux petites graines jaunâtres : dit fleurît en été. Elle vient aux lieux arides , montagneux. Vertus. Elle eft vulnéraire , confondante ; mais on s'en fert rarement PLANCHE 641. Uvularia , Gantclée, Ortie bleue, Viv. LA racine eft aflêz greffe, branchue, blanche, du gout de la Raiponfe, Pl. 4851.

The text on this page is estimated to be only 17.96% accurate

TOME QUATRIEME. 57ï La tige s'élève à deux ou trois pieds , cannelée , creufe rougsâtre, velue ; les feuilles font velues. Les fleurs font monopérales en cloche , découpées en cinq bleues ou violettes , velues en dedans ; il leur fuccede un fruit arrondi, anguleux, divifé en plufieurs loges trouées par les côtés, qui contiennent beaucoup de graines menues, kifatites, roulTeâtres : elle fleurit en été. Toute la plante efl: empreinte d'un fuc laiteux. Elle vient à l'ombre , dans les bois , dans les prés. Vertus. Elle eft aftringente, déterfive, vulnéraire extérieurement. o PLANCHE 642, « Xanthium , petit Glouteron , Ann. 1 N fe fert de la plante. ^} La racine efl. garnie de fibres aflTez grofles. La tige s'élève de deux pieds, anguleufe, velue, marquetée de points rouges ; les feuilles font verd jaune, d'un goût un peu acre , légèrement aromatique. Les fleurs ftériles font à fleurons , au-deflbus defquelles viennent les fleurs femelles, auxquelles fuccedenc des fruits, gros comme de petites olives, hérifles de pointes , partagés en deux loges , qui contiennent des graines longuettes , ïougeâtres : elle fleurit en été. Elle vient aux lieux incuites , fecs. Vertus. La graine eft diurétique en poudre , à la dofe d'un demi-gros dans le vin blanc. Extérieurement les feuilles font réfolurives. ^A1

The text on this page is estimated to be only 19.57% accurate

INDIGENES. PLANCHE 643. Xiris , Glaïeul puant , Viv. ON fe fert de fa racine & graines. La racine eft ronde , genouillée, fibrée, d'un eout très acre. Les feuilles font verd noirâtre, luifantes, fentant la Punafk PL 6^6. e' Les fleurs font à fix pétales, violet fale, murant celles de 1 Iris , Pl. zj ; il leur fuccede un fruit oblong , anguleux conte nantdes graines rondes, grolTes comme un petit^pois, rouges" d'un gout acre & brûlant : elle fleurit en été. * Elle vient à l'ombre , aux lieux humides. Vertus. Elle eft apéritive, hydragogue, en déco&ion : la dofe de la racine en poudre eft un gros dans le vin blanc.

The text on this page is estimated to be only 13.32% accurate

ANIMAUX. Tome V. DES COQUILLAGES ET FERS. -^u^-uw^u^ ...m,, ■»*Jlt3BWKigag3MWMr. PLANCHE Cochlea,feu Umax terre/Iris, Limaçon commun. " .blancs0" d°nC 'Û ^ qUefti°n Sros Limaçon On fe fert de roue l'animal. C'eft un infede teftacé c'efU-dire, à coquille & rampant, il eft compofe d une rete & d'un corps , qui fe ■ termine en pointé en forme de queue; routes ces parties font molles & abreuvées dun fuc glaireux } il fe trame par un mouvement d'ondulation 4 & rentre entièrement dans fa coquille quand il veut la oor tant toujours avec lui, attendu qu'une portion de fon'dos y eft adhérente. 1 Jl a été deffiné rampant» m de face & de côté : on voit les quatre cornes de fa tête & comme il les porte : il les v fait rentrer au moindre tacî; fa coquille eft blanche & le corps eft ori3 roux. r & Les points noirs qui s'apperçoivenr aux extrémités de {es quatre cornes, font plutôt les organes de fa ferifibilité que de là vue. * La coquille fe forme pat une humeur qu'il rranfpire Se qui f8 durcit a l'air : ellyi pris fa parfaire croiflance en trois ans L'hiver il fe reTire en terre ou à l'écart, il bouche l'entrée de h coquille avec une colle qui fe durcir , & y refte fans manger* A le remet en marché au printemps, & fe nourrit tout le refis de l'année, d'herbes, feuilles & fruits. Il eft hermaphrodite parfait, c'eft-â-dire , qu'il a les deux fexes. L'accouplement eft très-curieux ; ils viennent en face l'un de l'autre, ils ont tous un trou à droite, à côté du coi, à l'endroit où il eft placé dans l'eftampe à h Limace rouge: ce trou a deux conduits, le conduit antérieur eft rempli parla partie mâle, le poftérieur eft le fexe féminin , lorfqu'ils font à portée l'un d« l'autre & avant que de fe joindre, chacun fait fornr un aiguillon Z

The text on this page is estimated to be only 19.69% accurate

SjtS ANIMAUX. qu'il darde dans la chair de fon camarade ; ces aiguillons tombés enfuite à terre , chacun allonge fa partie mâle ; elles fe croifenr l'une fur l'autre Se vont ainfi à leur deftination , où elles reftent enfoncées dix à douze heures de fuite. Ils s'accouplent ordinairement trois fois en quinze jours. Au bout de dix-huit jours ils pondent par l'ouverture du col , grand nombre d'eeufs blancs , ronds , collés enfemble , gros comme de petits pois ; ils les cachent en terre où ils éctofent. Cette efpece habite les jardins , les vignes. Limax ruber , Limace rouge. On fe fert de tout l'animal. Ce Limaçon , appelle Limace rouge , reftèmble aflez au précédent par le corps*, mais, i°. il n'a point de coquille- i°. il eft bien plus long & plus gros; 30. fa couleur eft rouge brun ; il a un plaftron fur le dos jufqu'à la tête, ovale allongé , cornpofé d'une chair qui a le grain bien plus fin que celle du refte du corps. Il eft hermaphrodite & s'accouple comme le précédent ; il pond des œufs blanchâtres , gros comme un grain de poivre. Il habite dans les bois , aux lieux fombres & humides , où il vit d'herbes , de champignons. Limax cochlea cœlata > Nombril de mer. C'eft un Limaçon de mer. On fe fert de fa coquille & de fon opercule. La coquille eft brune , cannelée , raboteufe Se armée de pointes en deftùs , lifte en dedans. L'animal eft une efpece de Limaçon à quatre cornes , deux longues , terminées en pointe , 8c deux courtes , à la bafe des premières. Le couvercle qui fermé l'ouverrure de fa coquille , quand il eft rentré dedans , nommé l'opercule , fe voir en place dans l'cftampe. C'eft un corps dur, rond, épais, marqué en dehors de lignes fp traies., brunes : ce corps eft attaché fous la queue de l'animal. Ce Limaçon n'eft pas hermaphrodite; il y a mâle Se femelle; ils s'accouplent de même que la plupart des animaux. Il eft commun dans la mer Méditerranée. Vertus et Usages des trois Limaçons. L«s bouillons de Limaçons font bechiques , adouciflantsj

The text on this page is estimated to be only 18.11% accurate

TOME CINQUIEME. m leurs coquilles en poudre eft diurétique, à la dofe d'un fcrupule. Extérieurement les Limaçons piles avec leurs coquilles, font difcuflifs & réfolurifs. La Poudre de Limaçons calcinée entre dans îe remède Lithrontiptique de Mademoifeile Stephens : ils entrent dans l'Eau pectorale avec le petit lait , de la Pharm. de Paris. La Poudre de Limaces rouges féchée au four eft anddyfentérique , à la dofe d'un ou deux fcrupules. La coquille & l'opercule du Nombril de mer en poudre font diurétiques , abforbants , réfolurifs , à la dofe d'un fcrupule. PLANCHE 645*. OJîreum , Huître commune. ON fe fert de fes écailles. C'eft un coquillage de mer épais, pefant, rabotent; inégal, gris brun en dehors, li(Te & argenté en dedans, grand comme le creux de la main, plus ou moins j compofé de deux battants; le fupérieur plat, l'intérieur creux, contenant un animal informe , allez plat , remplilfant le creux du battant inférieur, auquel il eft attaché, ainii qu'au fupérieur ; ces deux battants font joints enfemble par un ligament, au moyen duquel l'animal peut ouvrir ou fermer les deux coquilles l'une contre l'autre. En examinant cet animal, on y découvre toutes les parties de la nutrition , comme la bouche , l'eftomac , ôcc. On y voie auffi le cœur Se les organes de la refpiration. L'Huître eft vivipare • elle jette fon frai au printemps j ce frai eft de forme lenticulaire, blanc 5 il s'attache à tous les corpî durs qu'il rencontre: les petites Huîtres toutes formées, fontr dedans ôc croilfent avec le temps. PLANCHE 646, OJîreum concha margaritifera , Nacre de perles, ON fe fert de fa coquille & des perles. C'eft une grande efpece d'Huître de mer, que l'on pêche feulement pour en recueillir les perles qui s'y trouvent, & l'é!

The text on this page is estimated to be only 18.56% accurate

57* . ANIMAUX. corce intérieure de la coquille : on jette l'animal, qui tie vaut rien à manger & que par conféquent on n'a pu deffiner ici. La coquille eft gnfe , en dehors ridée ; elle eft en dedans d'un blanc argenté, brillant, avec quelques nuances vertes, bleues pourpre. C eft cette face interne qu'on nomme nacre' ou mere de perles , parce que les perles y font communément adhérences. On ne trouve pas cette Huître dans toutes les mers ; il y en a en Orient & en Occident; les unes en Afie , les autres en Amérique^ toutes vers le Tropique du Cancer : les Orientales font les plus belles. VtRius et Usages des deux Huîtres. La poudre d'écaillés d'Huîtres eft ftomachique, abforbante, fudorifique, hyftériqne, fébrifuge, à la dofe d'un demi-^ros à un gros. Extérieurement elle eft émolliente, calmante, réfolutive. La Nacre de perle & les perles ont les mêmes vertus; elles entrent dans la Poudre pectorale & dans l'Emplâtre ftiptique. Dentalmm 3 Dentale. On fe fert de fa coquille. G 'eft un petit vermilfeau de mer,, qui habite un petit coquillage d'une feule pièce d'environ deux pouces de long, blanc, gros en haut comme un tuyau de plume. 11 le trouve collé à des pierres Bc autres corps durs , le long des côtes d'Angleterre. Antalium^ Antale. On fe fert de fa coquille. C'efl: un autre vernufleau de mer, dont la coquille reflemble à la précédente, mais plus groflTe & longue ; elle eft de la longueur du doigt, cannelée en longueur , verdâtre. Il fe trouve dans les mers des Indes Orientales. Vertus des deux Coquilles. Leur Poudre eft abforbante , à la dofe d'un fcrupule. Ils encrent dans l'Onguent Citrinum de Mirepfe.

The text on this page is estimated to be only 14.93% accurate

TOME CINQUIEME, 379 o PLANCHE 647. Hirudo , Sang-fue. N fe fert de tout l'animal. C'eft un mfede ou ver d'eau douce, Ione Jim bon doigt ou plus, quand Us étend de toute fa longueur ffe raLurciffanc a celle d un pouce à fa volonté, nageant pat ondulation comme une anguille; & quand ,1 chemine fur terre il fait des elpeces de pas, pofant fa tête à terre & amenant tout auprès fou autre extrémité. Les meilleures Sang-fues pour l'ufage , font de couleur verd noir , marquées de points & lignes noires & d'efpaces jaunes La Sang-fue eft compofée comme te ver de terre PL Cul vante } d'une infinité d'anneaux ; fa tète ou plutôt fon extrémité antérieure a une bouche ou ouverture triangulaire, dans laquelle font cachées trois dents très-aigué's ; la partie poftérieure fêter mine par un bourrelet rond : en général ces deux parties font capables de s étendre & fe contracter de diverfes façons félon la volonté de l'animal : elle a un anus , par lequel elle rend fes excréments. Elle ell hermaphrodite, comme le Limaçon & le ver ciapres, & ovipare. Elle fe trouve dans les eaux courantes, aux lieux herbus. Vertus. Elle a la propriété de fucer le fang, qu'elle aime beaucoup , & par ce moyen de dégager la partie & de détourner la fluxion * des endroits où on l'applique , foit aux hémorrhoïdes „ au front , aux yeux , &c. Pour cet efFer on pofe la Sang-fue fur une veine* à l'endroit où on veut qu'elle s'attache \ alors elle y enfonce fes trois dents, le fang coule dans fon corps, la Sang-fue s'enfle déplus en plus; à la fin elle fe dégage d'elle-même, finon on la fait quitter prife avec un peu de fel , qu'on \$x fait tombes fur le dos. Zi

The text on this page is estimated to be only 18.58% accurate

ANIMAUX. PLANCHE 648. Lumbricus terrejlris 9 Ver de terre. ON fe fert de tout l'animal. C'eft un infe&e rampant , habitant dans la terre ; il n'a ' •ni yeux, ni oreilles, ni pieds, ni os; il eft communément gros comme un tuyau de plume ; il s'allonge d\in pied , plus ou moins , & fe raccourcit confidérablement quand il veut • charnu , compofé d'une infinité d'anneaux & de fibres lon°itu! dinales qui les croifent , d'un rouge pâle , fans odeur , d'un gout terreux. Il eft hermaphrodite, ovipare; il a une bouche & un anus j ils s'accouplent vers le haut du corps & hors de terre. Vertus et Usages. Il eft apéritif, diurétique, fudorifique : la dofe en poudre eft depuis un fcrupule jufqu'à demi-gros. L'Huile de Vers fe donne à la dofe de douze à quinze gouttes. Extérieurement l'Huile de Vers eft fortifiante, adoueiflante. Les Vers entrent dans la Poudre contre la goutte, dans l'Emplâtre de Grenouille. L'Huile entre dans l'Emplâtre Diabotanum. Mytulus , Moule de mer. On fe fert de fa coquille. C'eft un petit coquillage de mer; la coquille eft à deux battants minces , convexes , d'un bleu foncé fale en dehors, blanc en dedans , liftes des deux côtés , marqués en deflus de quelques lignes courbes , longs d'environ deux doigts , larges d'un doigt, pointus par un bout, émouffés par l'autre bout, où eft placé un ligament qui fert de charnière à l'animal , pour ouvrit êc fermer fa coquille. Cer animal eft informe, gros comme une grolfe fève, tirant fur ta figure d'une amande, un peu frangé fur les bords» blanchâtre; il change de place, au moyen d'un doigt pointu & charnu, qu'il fait fortir de fa coquille. Quand ce doigt s'eft accroché à quelque corps & que la Moule veut s'y fixer, elle fait fortir d'un tuyau court ~ qui eft fitué à la baie de fon doigt, un fil délié, glutineux , Se fucceftivement une infinité d'autres, qu'elle colle par le bout fur le corps au

The text on this page is estimated to be only 19.27% accurate

TOME CINQUIEME. 3Sï Elle jette fon frai comme l'Huître , Pl. 645. On la trouve en abondance le long de nos côtes maritimes. Vertus. La poudre des coquilles eft fudorifique , fébrifuge , à la dofe d'un demi-gros dans ie vin : la Poudre Porfirifée eft diurétique , aftringente, abforbante. On peut la fubftkuer à celle des coquilles d'Huître ou de Limaçon. PLANCHE 649. Sœpïa } Sèche. ON fe fert de fa liqueur noire , de fes œufs , de fon os. Ceft un pohTon mou , d'une forme bizarre, long de deux pieds & plus , couvert d'une peau mince & ferme , fous laquelle eft placée au dos de l'animal , une efpece d'écaillé qu'on nomme Osj grand comme la main , blanc , épais d'un pouce dans fon milieu, tendre, friable, d'un gout âcre, un peu falé j le relie du corps de l'animal eft charnu. Le bout de fa tête eft garni de dix bras mobiles , difpofés comme on voit dans l'eftampe. Tous ces bras font remplis d'une infinité de fucçoirs , qu'il applique, ou fur les corps où il veut s'attacher , ou fur les animaux dont il fe nourrit , & qu'il mange au moyen d'une efpece de bec , dur comme de la corne. La Sèche a dans le ventre une veflie, remplie d'une liqueur noire, qu'elle fait fortir par l'anus à fa volonté ; ce qu'elle fait pour échapper à la vue, quand on la pourfuit. Il y a mâle & femelle ; le mâle eft plus foncé en couleur ; l'accouplement fe fait à l'ordinaire ; ce poilfon eft ovipare; il pond fes œufs par grappes ; ils font gros comme un grain de raifin , blancs d'abord; mais le mâle qui fuit la ponte, les noircit avec fon encre. On trouve ce poiflon dans l'Océan & dans la Méditerranée. Vertus et Usages. La liqueur noire eft laxative. Les œufs font diurétiques,, hyftériques. L'os eft apéritif, déteriif , delficatif ; la dofe en eft depuis Z 4

The text on this page is estimated to be only 17.50% accurate

0i . ANIMAUX. vingt grains jufqn a demi-gros ; extérieurement il eft dentrîfîque, ophtalmique;, il entre dans les Pillules aftringentes , dans le dentnrlque de la Pharm. de Paris. D ES INSECTES. PLANCHE ^O. Apis , Abeille. ON fe fert de la pondre d'Abeilles , du miel , de la cire , de la propolis, du marc de mouches. C'çft une efpece de mouche , giolfe à peu près, comme un haricot; elle eft appelles Abeille ; elle vie en fociéré très-nombreule & monarchique, dans les forêts, vers les pays froids, d'où on l'a tirée à caufe de fa grande uriiiré : les Abeilles fauvages fe logent dans des creux d'arbres ou parmi les rochers. On a imité ces cavirés, en en formant de factices, qu'on nomme des niches. La Monarchie eft quelquefois compofçe de 40000 mouches, favoir , une reine, des mâles, appelles faux-bourdons, & des Abeilles fans fexe qu'on nomme ouvrières , parce qu elles font tout l'ouvrage de la ruche. L'emploi des faux- bourdons eft de féconder les oeufs que la reine doit pondre ; la reine ne fair que pondre, les ouvrières bâniTent les logements &c amaifent la nourriture & les provifions. Les Abeilles, en général, font çompofées i°. d'une tète avec deux yçux, deux antennes & une langue ou fuccoir, accompagnée de deux pinces ; z°. d'un corfelet ou poitrine, à laquelle font attachées fix jambes articulées & quatre ailes tranfparentes j 3°. d'un corps compoféde fix anneaux , des inteftins & de l'anus. Les ouvrières ont de plus un aiguillon très-piquant, qu'elles font fortir de leurs anus , quand elles veulent piquet-, une brofTe de poils roides à chacune des dernières jambes: on en diral'ufage ci-deffous. Tout l'animal eft roux brun Se totalement velu , le faux bourdon eft plus gtos que l'ouvrière, & la reine aie corps beaucoup plus long. Les Abeilles fortent de leurs habitations au printemps, & vont fe répandre fur toutes les fleurs éclofes quelles rencontrent j

The text on this page is estimated to be only 18.88% accurate

TOME CINQUIEME. ?Sî elles allongent leurs fuccoirs jufques au fond de la fleur, & y puifeni un lue doux qui les nourrit. Ce fuc reçoit dans leur eftomac une préparation, qui, dégorgée par les ouvrières à leur retour dans la ruche, fe nomme Miel3 qu'elles deftinent à fervir d'aliment à toute la monarchie, quand le froid viendrai que les fleurs leur manqueront; elles garnirent en même-temps les broffes de leurs jambes de derrière, de la pouffiere des étamines des fleurs qui s'y attachent, C'eft cette pouffiere quelles pétrifient à leur retour, qui devient une matière liée dont ils conftruifent leurs maifons , qu'on nomme la cire vierge ou jaune. La, propolis eft une autre préparation d'une cire ou maftic rougeâxre , qui fert d'enduit aux endroits néceflaires. Les gâteaux, c'eft ainfi qu'on nomme leurs habitations, en général, font compofés de quantité de petites chambres à fix pans, nommées alvéoles, jointes & accollées. C'eft dans chacune que la reine dépofe un œuf; elle eft promptement formée & approvilionnée de la nourriture nécelTaire pour le ver qui naîtra de cet œuf : ce ver fe change fucceflivement en nymphe , puis en mouche; alors elle force fa cloifon Se auffi-tôt elle fuit fa deftinarion. Par la fuite ces alvéoles vuides fervent à y dépofer du miel. Voilà amplement jufqu'où un abrégé tel que celui-ci doit s'étendre ; le furplus n'auroit point la Médecine pour objet principal. Vertus et Usages. Les Abeilles féchées de mifes en poudre, font diurétiques à la dofe d'un demi-gros , dans un verre de liqueur. Le miel eft peétoral, laxatif, déterfif; il eft extérieurement mondificatif. Le marc de mouches , qui eft ce qui refte après qu'on a preiTé la cire des ruches . eft extérieurement réfolutif. Extérieurement la cire eft la bafe des emplâtres, pommades, cérats & onguents. La propolis eft digeftive, réfolutive, atténuante. Le miel entre dans l'Efprit ardent de cerifes noires , de Genièvre, de Cochléaria, de Romarin, &c. dans le Diaphœmc, l'Eledhiaire Cavyocoftin , la Bénédicte laxative, l'Hiere picre , la Confection Hamech , l'Orviétan vulgaire, le PhhWim Romain, l'Egipriac , &c. Le miel de Narbonne entre dans_ le Sirop de RolTolis, la Théoaque, le Mithridat, le Dentnfique. La

The text on this page is estimated to be only 21.25% accurate

3*4. ANIMAUX. tire jaune encre dans le Baume de Lucarel , l'Onguent Mondift l catif d'Ache , de Styrax , d'Althara , de la Mère , &c. La are blanche entre dans l'Onguent defficatif rouge, de Pompholix Album rhafis, Pomatum, l'Emplâtre de Minium, de Céruie* de Sperma csxi. PLANCHE 6 JI. Araneus , Araignée. ON fe fert de fa toile. C'eft un infeéte catnacier , dont il fe trouve beaucoup d'efpeces; celle-ci eft de grandeur médiocre , jaunâtre ou roux pâle, tachetée, à huit jambes très-longues, partant du corce. 1er, quatre articulations à chaque jambe ; la dernière munie de deux crochets, fous lefquels eft un petit corps rond & fpongieux; fa tête eft garnie de deux petits bras, qui lui fervent de mains pour contenir fa proie ; fa bouche eft au-delfous de deux pinces, qu'elle ouvre & ferme comme font les Ecreviffes ; fous chacune eft un ongle crochu , mobile de bas en haut; elle a huit yeux noirâtres, placés en ovale fur fon front; fou dos eft marqué en delïus d'un double rang de taches jaunâtres , avec de petites lignes obfcures. Elle a fix mamelons autour de l'anus , defquels elle fait forrir à fa volonté une liqueur gluante , qui fe feche tout de fuite & devient une foie ou fil , qui s'allonge à mefure qu'elle s'éloigne de l'endroit où elle l'a collé. Se promenant ainfi en tousfens, elle forme un tifftiou toile gluante, deftinée à prendre, comme dans un filet, les infectes ailés qui la rencontrent, &r dont elle fait fa nourriture en les fuçant. Cette efpece fe trouve dans les maifons , fur-tout dans les écuries , greniers, érables; elle mue & change de peau plufieurs fois dans l'année ; elle eft ovipare. Vertus. Extérieurement la toile eft vulnéraire , aftringente , confondante ; elle arrête le fang.

The text on this page is estimated to be only 20.08% accurate

TOME CINQUIEME, 385 PLANCHE 6j2,. Bombix j Ver à foie. ON fe fert de fa foie. La chenille que l'on nomme Ver a foie , eft la feule qui foie utile à l'homme; elle eft fauvage dans plufieurs pays chauds &c vit de feuilles comme les autres chenilles, mais principalement de celles des mûriers noirs &'blancs. On l'a , pour ainfi dire , cultivée , afin de jouir de la foie qu'elle file , donc on fait les plus belles étoffes.-; cette foie a auflî quelque utilité en Médecine. Voici la defeription de l'animal. Le Ver à foie ayant pris toute fa croiffance, eft communément long de trois pouces & gros comme le bout du petit doigt; fa couleur eft blanc jaune; il eft compofé d'une petite rète , armée de deux crochets , qui lui fervent à couper les portions des feuilles dont il fe nourrit; fon corps eft compofé de onze anneaux , dont les trois premiers font ridés & tachetés , 8c rous les autres unis & liftes; le dernier eft orné d'une corne molle; il a fix jambes écailleufes, pointues, deux à deux ; à chacun des trois premiers anneaux ridés, il a huit jambes cylindriques, chacune terminée par un rond de petits crochets, deux à deux à chaque anneau lifle depuis le fécond où on remarque deux taches noires , jufqu'au cinquième où font aufli deux autres taches pareilles. Il change entièrement de peau depuis le 10 ou onzième jour de fon âge, tous les fix jours, jufquà ce qu'il ait vingt-huit ou vingt-neuf jours : quelques jours après fa dernière mue , il ne mange plus & va s'attacher en quelque endroit de l'arbre ou des rameaux qu'on y fuppofe ; alors il fait agir fa filière , qui eft un petit mamelon percé, fitué au - défions de fa bouche; la matière gluante qu'il en fait fortir, fe feche & s'allonge à mefure qu'il éloigne fa tête de l'endroit où il a commencé à_ la coller. C'eft ainfi qu'en promenant fa tête, il attache fes foies fans ordre, jufqu'à ce qu'il y foit caché; il range enfiute cette foie d'autour de lui , avec une autre efpece de foie qu'il cpaiifit par une forte- gb , dans laquelle il s'enferme ; cette coque faite il s'y transforme en chryfahde -, au bout de vingt jours le papillon fort de la chrvfalide , ouvre la coque & fort tout moud

The text on this page is estimated to be only 16.22% accurate

38f t ANIMAUX, lé ; il ea bientôt feché & il fe mer en marche ; car il ne volepoint, quoiqu'il ait quatre ailes. Ce papillon eft entièrement blanc; ficôc que le mâle a trouvé une femelle, ils s'accouplent iur le champ, comme on le voit dans l'eftampe ; pendant l'accouplement, qui dure un quart-d'heure , le mâle agite perpétuellement fes ailes; il s'accouple ainfi pendant quatre jours, avec des intervalles.; peu après la femelle pond grand nombre d'œufs gros comme une tête d'épingle , en divers endroits & à diffé! rentes fois; jaunes d'abord, puis noirs, qui éclofenc deux-mè. mes au printemps fuivant. Vertus et Usages. La foie crue eft la bafe des gouttes d'Angleterre , qui font fortifiantes, cordiales , alexitaires : la dofe en eft de dix à douze gouttes , dans des liqueurs appropriées. Elle entre dans la Confection d'Hyacinthe. PLANCHE 6 J3Cancer 3 pagurus , Crabe, poupart. ON fe fert des extrémités noires de fes premières pattes. C'efl: un infecte de mer cruftacé : l'eftampe fait afiez connoître fa figure. Il eft rougeâtre ; il s'en trouve de gros comme la tête d'un homme & plus. La croûte dont il eft revêtu eft très-dure ; les extrémités noires de fes ferres le font encore plus ; il change de cette croûte tous les ans au printemps : il marche de tous fens, en avanr , de côté & en reculant. Dans l'accouplement la femelle fe met fur le dos; le mâle a deux verges qu'il introduit dans deux ouvertures de la femelle; il eft ovipare ; fes œufs font rouges , attachés fous la queue de la femelle où ils éclofent. Il habite les creux des rochers & les lieux pierreux du fond de la mer. Ver tus. L'extrémité noire de fes pinces , en Poudre impalpable , eft apéritive, abforbante , adoucifiante , antifcorbutique ;. la dofe eft depuis douze grains jufqu'à demi-gros,.

The text on this page is estimated to be only 17.16% accurate

TOME CINQUIEME *s7 Elle entre dans la Poudre de la Comreflè de Kent qui eft cordiale, fortifiante, fébrifuge, depuis quinze grains jufqua demi-gros. ' ^ PLANCHE 65-4. Cancer fluviatilis , Ecrevifle. ON fe fert de tout l'animal. C'eft un infe&e d'eau douce & courante, cruftacé , dont leftampefait fuffifamment connoître la figure; fa longueur va jufqu a cinq ou lu pouces ; fa couleur eft d'un gris verdân e • la croûte qui la couvre eil mince; elle change decadle tous 'les ans, & fi par quelque accident une de fes pinces eft arrachée ou coupée , il en repoutle une autre , qui au bout de quelques mois , tient la place de la première ; fa marche eft pareille à celle du précédent. On trouve dans quelques Ecrevifles, vers la têre, au-deiTus de leftomac, deux petites pierres blanches ou bleuâtres, ordinairement de la grolleur d'un petit pois , compofées de feuillets couchés l'un fur l'autre, appelles yeux d'Ecreviffes. L'Ecrevilfe eft ovipare; fes œufs fe trouvent attachés à des filaments qu'elle a fous la queue ; la queue de la femelle eft plus large que celle du mâle , & n'a que quatre découpures ; le mâle en a cinq. Elle fe nourrit de toutes fortes de petits animaux, qu'elle trouve dans l'eau. On ne la trouve que dans l'eau vive, comme rivières , ruiffeaux. Vertus et Usages. Le bouillon d'Ecreviftè purifie le fang, eft béchique, fortifiant , diurétique. La Poudre d'Ecrevifie eft un remède pour la rage : la dofe eft depuis demi-gros jufqu'à un gros. Extérieurement elles font vuirctaires, adoucifTan tes. Les yeux d'Ecreviffes font abforbancs, purifient (e fang, astringents, defficanfs , adouciflants \ ils entrent dans la Poudre de pattes d'Ecrevifles abforbante , d'Arum compofé, dans les Tablettes aftringentes 6c fortifiantes de laPharm. de Pans.

The text on this page is estimated to be only 17.84% accurate

$88 ANIMAUX. PLANCHE ^yj. Cantharis major } Mouche Canthariде. ON fe fert de tout l'animal. C'elt un infecte ailé , du genre des efcarbots , long d'un pouce, gros comme un tuyau de plume, compofé d'une tête, d'un corceler &c du corps; le tout ainli que les chapes de Tes ailes &c Tes jambes, d'un beau verd relplendilfant ; les yeux couleur d'or; il a deux pinces tranchantes des deux côtés de la bouche, un plaftron fur le milieu de la tête, le corcelet plus large vers la tête que vers le corps , fix jambes; les premières partent du corcelet , les quatre autres du corps ; les chapes ou couvertures des ailes renferment quatre ailes tranfparentes. Les Cantharides s'accouplent comme les Hannetons, Pl. 658. Tout l'animal a une odeur aromatique, très-forte & défagréable. Elles paroiffent vers la fin du printemps fur plusieurs efpeces d'arbres , fur lefquels elles volent en grande bande , principalement fur les Frênes. Elles mangent les feuilles, s'accouplent, puis difparoiffent toutes en même-temps. Cette expédition efk d'environ quinze jours; après quoi elles dépofent leurs œufs en terre; il en provient de fauiTes chenilles , qui , après avoir fubi toutes leurs rranfformations , deviennent des fcarabées comme les premiers , ô€ reparohTent fur les arbres au printemps fuivant, &c. Vertus. Les Cantharides ont une qualité cauftique &corro(ïve, qui attaque principalement la vefïîe & les parties voifines qu'elle enflamme jufqu'au fang; c'efb pourquoi on ne doit jamais s'en fervir intérieurement, même en pente dofe. Extérieurement leur poudre eft la bafe de tous les veificatoires. Clcada vulgaris , grande Cigale. On fe fert de tout l'animal. C'elt un infecte ailé, une efpece de très-grotTe mouche , corapofée d'une tête , de deux corcelets & d'un corps formé par cinq anneaux, quoique ie tout ne parouTe qu'une feule continuité.

The text on this page is estimated to be only 20.22% accurate

TOME CINQUIEME. ?*9 L'eftampe démontre fa figure Se fa grandeur. L'animal eft d'un brun rougeâtre. Elle a deux yeux à réfeau , comme les mouches ordinaires ' trois petits yeux lifles fur le deflùs de la tête, quatre ailes tranfparentes , fix jambes, une trompe ou fuccoir droit, qui fe replie en de (Tous &: enjambe fous le corceler ; elle la redrefTe quand elle veut l'enfoncer dans les parties des arbres dont elle pompe le fuc. La femelle eft muette; le mâle feul chante, comme on dit; mais ce prétendu chant n'eft qu'un grefillement quafi perpétuel & importun , (quoique quelques-uns le trouvent affez à leur gout) qui dure tout l'été dans nos pays chauds j où les Cigales font communes j il s'en trouve auiïi dans le Gâtinoïs. Ce cri s'accomplit, au moyen de deux peaux minces ou parchemins très-fecs & fonores, qui ferment à l'extérieur deux creux ou vuides , pratiqués en delfous, côte à côte, dans la largeur du premier anneau du corps j un mufcle qui traverfe chaque cavité intérieurement , envoie plufieurs appendices s'attacher à la pliftùre du parchemin j lorfque l'animal veut chanter, il tire & lâche fubitement & à coups précipités ces appendices , iefquels agitant les plis du parchemin , occafionnent le bruit ou cri de la Cigale. La femelle eft ovipare & dépofe fes œufs un à un , au fond, des fentes qu'elle approfondit jufqu'à la moelle , dans des branches mortes des arbres moelleux , au moyen de deux feies accollées qu'elle fait fortir de fon dernier anneau ; les deux feies avancent de reculent fucceflîvement jufqu'à la moelle. Elle peut pondre 500 œufs & plus; il naît de chaque œuf un ver à fix jambes , très - blanc ; il s'enfonce en terre , sJy change en nymphe , telle qu'on la voit dans l'eftampe. Sa couleur eft blanc file ; ces nymphes fortent de terre au commencement de l'été fuivant ; elles montent aux arbres , où fe dégageant de leurs peaux de nymphes , elles deviennent Cigales parfaites. Vertus. La Cigale eft apéritive, diurétique : la dofe en poudre eft de trois jufqu'à fix Cigales, qu'on donne en bol. Les cendres de Cigales font diurétiques, à la dofe de fix à douze grains.

The text on this page is estimated to be only 17.91% accurate

ANIMAUX. irurj ^a— ^iim.j, rT,aii«MMnBMwiM«iilManiMîM|i,,l |)1,| „ mi,,,, PLANCHE 6j6. Cimex , Pun.ifcdomeflique. ON fe! fert de tout l'animal. G'eft un infe&e plat , avide de fang , de h. groffeur d'une petite lentille: l'eftampe la repréfente de grandeur natutelle & groiîïe à la loupe , afin qu'on voie mieux fa figure en détail. * Elle elt compofée d'une tête avec fes deux antennes, d'un corfeler renflé du côté de la tête & d'un corps à huit anneaux dont le premier eft recouvert par deux efpeces de chapes, deux' yeux bruns, fix jambes-, fa couleur eft cannelle foncé; fa tête eft munie d'une trompe ou fuccoir , qui fe replie fous fon corfelet, & qu'elle redreiïe à fa volonté pour fucer le fang. Elle aune odeur aromatique, forte & très-défagréabîe. Elle eft ovipare ; fou accouplement s'accomplit comme celui du Ver à foie, Pl. 651. On la trouve dans les maifons des" villes; elle eft plus rare dans celles de la campagne • elle habite dans les murailles & dans les meubles ; elle y dépofe fes œufs de côté & d'autres : les petites Punaifes , en forrant de l'œuf, ont acquis toutes leurs perfections & fe mettent aufïï-côt à courir très-vîte pour chercher pâture. Vertus. On en introduit de vivantes dans l'urètre , pour y exciter ie chatouillement , & par ce moyen obliger le fphincW de la velfie à fe relâcher. Formica , Fourmi. On fe fétt de l'animal, de fes œufs & de la fourmillerez C'eft un petit infecte terreftre , de trois à quatre lignes de long, qui vit en nombreufe fociété , dans laquelle on en difringue de ttois foires , des mâles, des femelles Se des ouvrières, qui, comme dans les abeilles, n'ont aucun fexe; les mâles ont quatre ailes; les femelles font plus grolfes que les ouvrières, auxquelles elles relfemblent beaucoup : l'eftampe repréfente le mâle & la femelle de leur grandeur naturelle & groffis à la loupe. En général les Fourmis lotit couleur châtain foncé ; les mâles font plus noirs j leur odeur tire fur celle du mufe. La

The text on this page is estimated to be only 17.42% accurate

tome Cinquième m La Fourmi eft compofée d'une tête avec deux yeux, dèteariténnes coudées & deux pinces crénelées en dents de fcie du i corfelet fort allongé j formant plufietirs boires & étranglements! termine par un rond fait en foucoupe , concave du côté du corps qui tient à fon centre par un filet fort délié-, le corps eft cdurg & compofé de cinq anneaux j il eft renflé confidétablemédt èfl dellus , plat en deiTous ; elle a fix jambes, chacune terminée pas deux crochets. " On diftingue dans les femelles , trois petits yeux Iiues fur; le defliis de la tête. Les mâles ou les Fourmis ailées ont !a tête autrement taillées ils ont, comme les femelles, les trois petits yeux fur la tête corfelet plus uni & quatre ailes tranfparentes, dont les deux filpénem-es très-longues & celles de delfous deux fois plus courte? Les femelles font fécondées par les mâles] elles pondent dé petits œufs blancs , ovales , polis, luifanrs , prefque imperceptibles : le petit ver qui en provient prend fa troiffance, puis fe change en chryfalide : il a pris alors toute fa grandeur. C'eft cettë nymphe enfermée dans une peau , qu'on nomme improprement œuf de Fourmi; enfin la Fourmi paroîr, & fa peau qui croie blanche, fe durcit & fe noircit à l'air en peu de temps. Le gouvernement des Fourmis a beaucoup de rapport aveë celui des Abeilles ; l'emploi des ouvrières eft de eonftruiré ht fourmilliere avec cent mille fœtus & paillettes , & de veiller aveC la plus grande attention, à la conservation & à la fureté des chryfalides : ce qu'elles exécutent avec un zele admirable. Les Fourmis polfédoienr de toute antiquité , une réputation de prévoyance qu'elles ne méritoient pas ; car il a été découvert de nos jours, qu'elles ne font jamais aucune proviiion pour pafier l'hiver j que par conséquent leur fourmilliere ne 1ère qu'à les garantir de la rigueur de cette faifon; elles s'y enfoncent & y duraient , du y font immobiles, tiennent leurs chryfalides chaudement & les remontent ou les defeendenc , l'uivant que l'air eft plus doux ou plus froid. Vertus et Usages, Intérieurement on ne fe fért des Fourmis, qu'en éfi tirant" Un Efprit acide, qu'on nomme Y Eau de magnanimité. Cenè tau eft cordiale , diurétique : fa dofe eft depuis un gros jufqu'à deux t dans deux ou trois onces de liqueur

The text on this page is estimated to be only 19.49% accurate

i9i ANIMAUX. Extérieurement l'Huile de Fourmis eil fortifiante, carminative j cette Huile ou les œufs piles font bons pour la furdité : la fourmiliiere & les œufs bouillis légèrement , mis dans un fac en demi-bain , eft un remède fortifiant & nervin. Les Fourmis entrent dans l'Huile accouftique de Mynfich & dans l'Efprit accouftique de Miudenerus. PLANCHE 657. Grillas domejlicus, Grilloii domeftîqtie, ON fe fert de tout l'animal. C'eft un infe&e ailé , tenant un peu de la fauterelle par fes jambes de derrière, qui l'aident à faire de petits faurs, 8c par fes ailes avec lefquelles il peut faire des vols très-courts. Il eft long d'un bon pouce, compofé d'une tête luifante, les yeux noirs , deux antennes très-longues & déliées , là bouche grande, armée de deux pinces ou dents, d'un corfelet auffi large que fa tête , d'un corps , compofé de douze anneaux , recouvert par quatre ailes blanchâtres, plùTées fuivant leur longueur ; les inférieures plus étroites & bien plus longues que les Supérieures ^ il a fix jambes velues, les dernières beaucoup plus longues & fortes que les autres , terminées routes par de doubles crochets ; du dernier anneau partent deux filets qui font la fourche & une longue foie au-deftus de l'anus. 11 eft ovipare ; fes œufs font brillants & très-petits. 11 habite dans les maifons où il fe cache dans les fours , dans les cheminées & autres lieux où on fait du feu (aimant à être chaudement) & où il chante ou plutôt gtéfillonne à peu près comme la Cigale, principalement la nuit, quafi toute l'année; il vit de tout ce qu'il rencontre, foit pain, farine, viande, grailfe , &c. Vertus. La poudre des Grillons eft diurétique , apéritive. Locufla , Sauterelle verte. On fe fert de tout l'animal. C'eft un infecte ailé, fautant & volant ; fa longueur y compris les ailes, eft de deux pouces &c plus : l'eftampe démontre

The text on this page is estimated to be only 18.42% accurate

TOME CINQUIEME. m fufEfamment fa figure; on a delïiné à parc fa tête , vue de face4 de grandeur naturelle. Elle eft compofée d'une tète , d'un corfelet & d'un corps à huit anneaux; la femelle a une queue longue, plate, faitô comme une épée ; le corps du mâle fe termine par deux cro^ chers •, on les à aiuli défîmes à part. Toute cette Sauterelle eft d'un beau verd gai 5 elle a fis jambes, donc les quatre premières lui fervent feulement à marcher J mais les deux dernières , qui font de beaucoup plus longues Sé difpofées différemment , font deftinées à la faire fauter. Elle a quatre ailes blanchâtres ; les deux fupérieures font trèslongues, celles de delfous font plUfées en éventail & plus courtes, mais plus larges, étant déployées, que les fupérieures. L'accouplement dure long- temps; le mâle fur la femelle j elle eft ovipare; quand elle veut pondre ellefefert defadou^ ble épée , qu'elle enfonce avant en terre & y fait couler fei œufs ovales , de la groffeur d'un grain d'ahis, blanchâtres, argentés ; ils éclofenr au printemps fuivant , en petits Vers roux t qui deviennent bientôt de petites Sauterelles vertes ; cependant ee ne font encore que des nymphes, dont les ailes font renfermées dans quatre boutons; mais d'ailleurs relfemblant en tout à la Sauterelle qui en proviendra. Elles prennent ainfi toute leur croilfance : au bout de vingt-quatre ou vingt-cinq jours; cette nymphe fonge à fortir de fon étui ; alors elle monte & fé fixe fur quelque plante , & en fe gonflant à plufieurs reprifes Se faifanc beaucoup d'efforts, elle parvient à fendre fa dépouille t d'abord au-delfus de la tête & enfuité le long du dos ; cette dé^ pouille refte à la plante; l'animal tombe, outré de Fatigues} alors les ailes fe déploient & s'étendent de toute leur longueur , & le voilà devenu Sauterelle parfaite. Le mâle chante ou crie moins défagréablement que la Cigale j foh cri commence à foleil couchant & dure toute la nuit. On trouve cette Sauterelle dans les prés & haies où elle lé nourrir d'herbes. Vertus. Elle eft diurétique, mais on l'emploie rarement. 0 ni feus j Cloporte. On fe fert de tout l'animal. C'eftun infefteteireftre, long de fix hgnes, cotnpofe dune

The text on this page is estimated to be only 17.19% accurate

394 > ANIMAUX, tête fcd'un corps, 'formé par treize anneaux, dont fept grands & égaux, débordant en pointes de chaque côte , & fis petits & étroits à fa. partie poftérieure. La peau de tous ces anneaux eft ternie & comme écailleufe ; le deiîus du corps voûté , le ventre plat , une pane de jambes à chaque anneau, tant grand que petit y cependant fa marche n'eft pas trop vive. On peut diftinguer deux efpeces de Cloportes, favoir , les fauvages, qu'on trouve dans les bois & dans les caves. Ceft une de cette efpece quia été deffinée, parce qu'on les préfère en Médecine; celles -là font gris brun; les taches qu'on appercoït fur leurs anneaux font jaunâtres ; auflî-rot qu'on les rouche elles ont ta faculté de fe plier en rond , de façon quelles reffemblent d une petite boule (voyez l'eftampe) & relient immobiles dans cette fituation , jufqu'à ce que leur crainte foit paffée. L'autre efpece eft d'un cendré jaune ; elle eft domeftiquecar on la trouve dans les maifons où elle habite dans les chambres & dans les murailles : celle-ci ne fe met point en boule. La Cloporte eft ovipare ; elle porte fes ceufs fous fon ventre où ils éclofenr. Vertus. Elles font apéririves , défobftruantes , diurétiques ; on les pile dans du vin blanc ou bien on les donne en fubftance , commençant par fix & augmentant jufquà dix ou douze ; la dofe en poudre eft depuis douze grains jufqu'à deux fcrupules. Extérieurement ils font réfolutifs , dérerhïs. Pediculus y Pou. On fe fert de tout l'animal. C'eft un infecte domeftique , avide de fang comme la Punaife; il eft compofé d'une tète, ayant deux yeux noirs & un aiguillon qu'on apperçoit rarement, l'animal Je tenant rentré en dedans, d'un corfelet, duquel partent lîx jambes, chacune terminée par une pince crochue & pointue ; ce corfelet eft adhérent au corps qui eft allongé , compofé de cinq anneaux & bordé d'une efpece de bourrelet : tout le devant de l'animal, jufqu'au corps, eft tranfparent, couleur de parchemin. Les poux vivent du fang humain, qu'ils tirent de routes les pairies du corps, principalement de la tête; ils dépofent leurs œufs fur les cheveux ; ces œufs fonr blancs ; on les nomme des lentes; les petits, en fortanc de l'œuf, courent tour de fuite chercher leur vie.

The text on this page is estimated to be only 15.72% accurate

TOME CINQUIEME. 3?J Vertus. Les poux font apéritifs , fébrifuges , à la dofe de cinq ou fax • mais comme on a communément répugnance pour ce remède' on s en fert très-rarement. * Extérieurement on en introduit dans l'urètre des enfants dans les cas ou on fe fert de punaifes pour les hommes. Voyez ri. (ïj6. * PLANCHE 6j8. Scarabxus cornutus , Cerf-volant. ON fe fert de rout l'animal. C'eft un infecte volant & cmftacé, le plus gros des efcarbots de nos pays; il s'en trouve qui ont jufqu'à crois pouces de long; il ek compofé dune tête quarrée, armée par devant de deux cornes dures , mobiles , que l'animal ferre à fa volonté par les bouts, UlTes, luxantes, rouge brun ainfi que fes yeux; d un corfelet quarté, dur & cuirafle , & d'un corps compofé de fax anneaux : il a fix jambes; [es deux premières partent du corfelet, les autres du ventre ; il a deux ailes ttanfparentes & larges, qu'il replie fous deux fourreaux durs, qui les recouvrent ainfi que tout fon dos. D'ailleurs leftampe fait voir au jitfte fa conformation & fes proportions. Tout l'animal eft revêtu d'une croûte très-dure , couleur de maron foncé. Il fe nourrit d'une humidité , qui fuinte dans les écorces d'arbres , qu'il fuce avec une petite trompe ou langue , qu'il fait forcir de la bouche. Il eft ovipare ; la femelle dépofe fes œufs aux pieds des arbres ; les œufs font aflez gros, pâles, pleins d'une humeur gluante ; \\ en fort un ver qui s'enfonce dans l'intérieur des arbres, s'y nourrit, y groflît, devient chryfalide Se enfin Cerfvolant. V E IL T U S . 11 eft diurétique ; la dofe en poudre eft depuis quatre grains jufqu'à huit. Extérieurement il eft nervîn, A.a j

The text on this page is estimated to be only 20.92% accurate

jj(î ANIMAUX. Scarabczm (înduLus , gros Hanneton, On fe fert de tout l'animal. C'eft un infe&e volant, cruftacé, du genre des efcarbors, long comme une feve de marais, gros comme le doigt; il eft compofé d'une tête quarrée, armée de deux pinces affez fortes,' de deux yeux noirs, d'un corfelet rougeâtre Se d'un corps compofé de fepr anneaux noirs, dont les cinq derniers ont de chaque côté, une tache blanche en triangle ; le corps fe termine par une queue allongée, très-dure; il a iix jambes , terminées par un double crochet; il a deux ailes tranfparentes , pliées & cachées fous deux fourreaux durs, couleur de châtaigne, qui lui couvrent auffi tout le dos. Tout le defTous de l'animal eft velu; les parties les moins dures font le ventre & les fourreaux des ailes. Il eft ovipare ; la femelle dépofe fes œufs dans la terre ; ils font oblongs, d'un jaune clair; il en vient un ver , qui croît & refte en terre pendant deux ans, y fubit toutes fes transformations, même celle de Hanneton parfait; alors il fort au mois de Mai , pour devenir habitant de l'air. Cer infecte eft nuifîble dans quelque état qu'il foit ; lorfqiul eft dans la terre il ronge les racines de toutes les herbes , & les fait mourir dans les prés & dans les potagers; il fait fouvent bien du ravage dans les bleds, c'eft pourquoi on le nomme Ver de bled; & lorfqu'il eft en Hanneton, il dépouille les arbres de leurs feuilles, à mefure qu'elles pouffent : ce dégât dure endant deux mois, après quoi on n'en voit plus le refte de année. Leur vol eft accompagné de bourdonnement j il commence jiprès le foleil couché jufqu'à la nuit. Vertus. Ils font apéritifs Se diurétiques ; on les emploie en poudre. Scarabœus pillularis , Fouille-merde. On fe fert de tout l'animal. Ceft un infecte volant, cruftacé, du genre des efearbots, de près d'un pouce de long & d'un demi-pouce de large; il eft compofé d'une tête bombée en deiTus , plate en deifous ; fes yeux font placés vers le delfus de la tête ; fa bouche eft accompagnée de deux pinces allez groflès, d'un corfelet large & d'un corps

The text on this page is estimated to be only 18.84% accurate

 „recouvert par deux ailes avec leurs fourreaux , comme aux précédents ; il a lix jambes, toutes garnies en dehors de pointes taillées en dents de fcie, terminées par un double crochet * L'animal eft tout cniraffé & dur, & entièrement d'un noir lui Tant , rirant fur le bleu. Il eft ovipare; la femelle fécondée pond fes œufs en tas qu'elle renferme dans une boule de fiente récente, qu'elle leur conftruu : la chaleur de cette matière les fait éclore ; ils fubiffeat enfaite tous les changements des précédents, pour parvenir à leur état parfait. On ne les voit voler qu'au commencement de la nuit , attirés par l'odeur des matières fécales, fur lefquelles ils s'abattent. Vertus et Usages. Intérieurement ils font diurétiques. Extérieurement l'huile faite avec ces infect.es, eft réfolurive, adoucilTànte , fortifiante. Ils entrent dans l'Huile de Scarabées de la Pharm. de Paris. Scarabxus unauofus , Pro-fcarabée. On fe fert de tout l'animal & de fa liqueur onétueufe. C'eft un infe&e qui tient de l'efcarbot; il eft en partie cruftacé & en partie mou; le mâle eft ailé &c vole; mais la femelle, dont il eft uniquement queftion ici, à caufe de fes vertus médicinales, n'a point d'ailes. Elle eft groife comme le doigt, Se longue à peu près comme le petit doigt; fa tête eft inclinée vers terre; fes yeux font noirs & fa bouche eft flanquée par deux pinces; fon corfelet a peu d'étendue; mais fon corps eft très-long ôc rond, compofé de fept anneaux larges , dont le dernier fe termine en pointe. La partie antérieure de fon dos donne origine à deux efpeces de faux fourreaux d'ailes , qui fe terminent en pointe Se ceffenc au tiers ou environ de la longueur du corps ; elle a fîx jambes à double crochet. Elle eft ovipare; les œufs fubitTent tous les changements des précédents. Elle marche lentement ; elle ne fe rencontre dans l'année qu'au mois de Mai, fur le midi; il eft rare qu'on la trouve plutôt, ni plus tard; elle chemine dans les bois, le long des baies, dans les bruyères, en terrein fec. Si on lui prefle le corps, il en fort de tous côtés une liqueur onctueufe, jaunâtre;

The text on this page is estimated to be only 18.36% accurate

•J58 ANIMAUX. §ç quand on l'écrafe , elle répand une odeur aromatique afiez agréable. Sa couleur générale eft la noire. Vertus. La liqueur cauftique donc elle eft remplie , approche beaucoup (je la nature des cantharides ; ainli il n'eft pas fur de Terqployer intérieurement comme diurétique. Extérieurement cette Huile, airifî que tout l'animal réduit çn poudre , font réfolutifs , fondants , fortifiants. PLANCHE

The text on this page is estimated to be only 17.89% accurate

TOME CINQUIEME, m Nota. La piquure du Scorpion , par l'aiguillon qui eft au bout de fa queue lerpit mortelle, fi on n'y remédioit proroptement; mais le Scorpion même en eft Je remède ; il ne faut que l'écrafer fur le champ a l'endroit piqué ou meure fur la plaie de l'Huile fufdite. ' DES POISSONS. PLANCHE 660. Accipenfer 3 Eftu rgeon. ON fe fert de fes os & de fes œufs préparés , nommés Caviar. C'eft un poiiTbn de mer cartilagineux , qui croît jufqu'à dixhuit pieds , & qui remonte bien avant dans les grandes rivières. La tête va en diminuant ; les yeux fort petits , les narines près des yeux , quatre barbillons entre le bout du mufeau & ia bouche , la bouche petite Se fans dents (elle eft ouverte dans l'eftampe;) poinr de mâchoires inférieures; cette bouche eft plutôt un fuccoir pour pomper fa nourriture; deux ouies de chaque côté ; le corps couvert d'une peau chagrinée , d'un bleu noirâtre y le ventre argenté; cinq rangs d'écaillés ou cartilages élevés , dont un fur le dos , un à chaque côté plus nombreux , deux fous le venrre, fix nageoires, dont cincj fous le ventre , favoir, deux au défaut de la tête , deux proche l'anus , une entre l'anus & la queue , une à l'extrémité du dos ; la queue relevée en croiffant , un peu fourchue & bien plus courte en delTous. On le pêche rarement en mer , parce qu'il fe rend prefque toujours dans les grands fleuves, comme la Seine, la Loire, l'Elbe, le Nil, le Don, le Danube, &c. qu'il remonte trèsavant. Vertus. Ses os en pondre font apéritifs : la dofe eft depuis un ferupule jufqu'à un gros. Le Caviar augmente la femence. Ichthyocolla s grand Efturgeon, poilTon à colle. On fe fert de fa colle. C'eft un poiffon de mer fans écailles , couvert d'une peau

The text on this page is estimated to be only 18.01% accurate

4oo _ ANIMAUX. blanchâtre; il croît jufqu a vingt-quatre pieds: pour fa fieura voyez leftampe. 5 11 a de chaque côté vers la tête, un trou qui eft l'orifice dun canal creux, qui va jufqu a la queue. Il a vers le bout du mufeau , quatre barbillons , quatre nageoires au ventre, deux au dos; la queue fourchue, plus longue à fa partie fupérieure. Il remonte les grandes rivières , principalement le Danube. Vertus et Usages. La colle qu'on fait avec la peau , les entrailles 3c les nageoires de ce poifïbn eft d'un blanc jaunâtre , fans odeur; elle eft intérieurement adoucuTanre & extérieurement agglutinât! ve. Elle entre dans" l'Emplâtre Dïachiiwn magnum. PLANCHE 66l. Anguilla, Anguille. ON fe fert de fon foie, fiel, peau & graifle. C'eft un poitfon d'eau douce, écailleux , étroit &Iong, croiflant jufqu a deux pieds & plus. La tête eft petite & aiguë , les yeux petits , la mâchoire inférieure dcpafle un peu la fupérieure , toutes deux garnies de petites dents ; les narines près du bout du bec , deux petites ouïes, trois nageoires , dont deux petites près la tête en délions, & une au dos, laquelle commençant vers le tiers de fa longueur, tourne autour de l'extrémité poftérieure & finit près de fanas, qui eft au milieu du corps. ^ Tout le delfus du corps & les nageoires font d'un brun noirâtre ; le ventre eft jaune blanchâtre ; la chair eft huileufe. L'Anguilie eft vivipare. On la trouve indifféremment dans les eaux vives & dans les dormantes *, elle nage prefque toujours au fond de l'eau où elle trouve fa nourriture. Vertus. Le foie & le fiel mêlés enfemble & réduits en poudre, font diurétiques, hyftériques, ainfi que la peau en poudre : la dofe eft d'un fcrupule ou deux. Extérieurement la peau eft aftrîngente ; la graifle eft émoi

The text on this page is estimated to be only 20.56% accurate

TOME CINQUIEME. 401 Hente, adouciffante , réfolurive , bonne pour la furdité. Nota, Que les écailles font fi fines , qu'on ne peu: gueres les apperceyoic que fur une peau d'anguille feche. Afellus major } Morue, Molue. On fe fert de fes dents 8c des pierres qu'on trouve dans fa tête. C'eft un poîOTon de mer écailleux, qui croît jufqu'à trois Se quatre pieds de long & un pied de large. La tête eft proportionnée au corps, de grands yeux, leur iris blanche , un court barbillon au bout de la mâchoire inférieure, la langue épaifle, plufienrs rangées de dents aux mâchoires ; entre les fixes il s'en trouve de mobiles ; la peau molle & épailîë, garnie de petites écailles très-adhérentes, de couleur olivâtre, brune, avec des taches jaunâtres, neuf nageoires, deux latérales près des ouies , deux petites fous la poitrine, deux fous le ventre aptes l'anus , trois fur le dos jufqu'à la queue ; la queue droite. 11 fe trouve des Morues dans toutes les mers du Nord \ mais leur rendez- vous général eft vers le Canada, en l'Amérique Septentrionale, au grand banc de Terre-Neuve, où on en pèche rous les ans une quantité prodigieufe. Elles fe nourrilTent de Harengs , de Merlans , de Crabes , &c. Elles font ovipares j elles ont des millions d'œufs. Vertus. La poudre des dents Se de deux pierres qu'on trouve dans fa tête , eft abforbante : la dofe eft depuis dix gtains jufqu'à demi-gros. Extérieurement la faumure dans laquelle on conferye la Morue î eft deflicative, réfolutive, & en lavement laxative. Merlangius s Merlan. On fe fert des pierres qu'on trouve dans fa tête. C'eft un poiiïbn de mer écailleux, qui croît jufqu'à un pied & plus. . , La tête eft applatie en deflus , les yeux grands , l'iris argentée , la prunelle bleuâtre , les deux mâchoires dentées , le corps blanc argenté , le dos grifâtre, les écailles du ventre petites, arrondies, blanches, neuf nageoires, deux latérales près des ouies ; il a une tache noire près de leur naiflance , deux a 1*.

The text on this page is estimated to be only 18.53% accurate

4oi ANIMAUX, poitrine très- petites, deux depuis l'anus , qui n'eft pas loin de la tete julqu a la queue; la première très-étendue , blanchâtretrois fur le dos, jufqua la queue; la queue fourchue, arron11 fe trouve en nombre dans la Manche & dans la mer Bil tique; il fe nourrit d'anchois, de crevettes & autres petits D0if fons ; il eft ovipare. r v u~ Vertus. On trouve dans la tête du Merlan , deux pierres ou os blancs oblongs. Leur poudre eft abforbanre, diurétique : la dofe J depuis douze grains jufqu a demi-gros. o PLANCHE 66l. Balena, Baleine. N fe fert de fon huile. C'eft un poiûon de mer non écailleux , le plus grand de tous les poiffons & même de tous les animaux connus, attendu qu'il croît jufqu a 70 pieds & plus. La tète feule a le tiers de la longueur de l'animal, un peu applatie par deiïus ; la mâchoire inférieure plus large que la fupérieure, toutes deux fans dents; mais la fupérieure , entourée de barbes ou lames dures comme de la corne , rangées côte à côte comme des tuyaux d'orgue , par dégrés ; les plus petites devant & derrière, les plus grandes aux milieux, coupantes & garnies d'appendices, qui fe replient fur les coupants; ces barbes , quand l'animal ferme la gueule , fe ploient & fe couchent dans une rainure, qui tourne toute la mâchoire inférieure; les yeux font très-petits à proportion de l'animal , & ont des paupières & des fourcils. La peau eft noire, marbrée de blanc & de jaune, fur-tout aux nageoires & fur la queue ; le ventre eft blanc ; elle n'a que deux nageoires vers la tète, épailfes , couvertes de peau & articulées comme des doigts ; la queue eft horifontale à plat fur l'eau. Le maie a une verge aûez longue , qu'il cache en dedans ; la femelle a deux mamelles , qu'elle retire près fon ventre; lac

The text on this page is estimated to be only 19.16% accurate

TOME CINQUIEME complément , cela étant, doit fe faire face à face • êlle eft vivi pare -y elle ne porte qu'un petit. Sa nourriture eft de petits poilTbns & infect de mer On ne la trouve que vers le cercle polaire , dans les mers du Nord de Groenland , du Spitzeberg , au Détroit de Davis. Vertus. L'Huile de Baleine eft émolliente , réfohuive. Cetus dentatus , Cachalot. On fe fert de fa cervelle, nommée blanc de Êaléim & Je l ambre gris, qu'on trouve dans fon ventre. C/eft une efpecede Baleine, qm a à peu près la conformation de la grande Baleine ci-defTus , ayant de même le corps noir le ventre blanc, de petits yeux, deux petites nageoires, là queue horifofttale ; il eft vivipare , étant conforme par rapport aux parties de la génération à la précédente. Voici en quoi il en diffère; il ne devient jamais fi grand; fa mâchoire fupeneure (au contraire de l'autre) eft beaucoup plus large que l'inférieure, qui eft très-étroite & bordée de très- grottes dents , qui fe logent dans la fupérieure, & qu'il a deux petits ailerons * un au dos & un près de la queue. Il fe trouve dans les mêmes mers ; mais comme il vit de plus gros poiflons , i! les pourfuit quelquefois trop loin & vient aflez fou vent échouer fur les côtes de Hollande ou d'Angleterre. On retire du Cachalot, non- feulement de l'huile, niais encore la cervelle , qu'on nomme blaflc de Baleine Se l'ambre griSj que l'on trouve enveloppé dans une efpece de velîîe , entre les reins & les tefticules, en boules, d'un gris cendré, pefant depuis quatre livres jufqua quarante. Vertus et L' sages. Le blanc de Baleine eft béchique, confolidant, diurétique: la dofe eft depuis douze grains jufqu'à un fcrupule : extérieurement il eft adouciflanr , émollient, confolidant. L'ambre gris eft cordial, fortifiant, céphalique, ftomachal : la dofe en fubftance eft depuis un grain jufqu'à huit. L'ambre gris entre dans la Poudre d'ambre, arom.rrique de rofes, de Joie, Êézoardique , l'Eletluaire ue Satyrion , les Tablettes de magnanimité, le Baume apoplectique, la Confection Alkermes , d'Hyacinthe.

The text on this page is estimated to be only 17.87% accurate

4o4 ANIMAUX, Monoceros 3 Narval. On fe fert de fa corne ou dent. t C'eft un poilfon de mer du genre des Baleines ci-defïus , triais bien plus petit ; car il ne croît que de vingt à trente pieds de long, plusmmce; le bout du inufeau garni dune corne droite, en avant blanche, finiflant en pointe , torfe comme un, corde, longue de dix pieds & plus, point de dents, les yeux petits, deux petites nageoires, la queue horifontale , la peau marbrée de blanc Se de noir , le ventre blanc , vivipare , ayant les parties de la génération comme les précédentes , habitant les mêmes mers. Vertus et Usages. La corne en poudre eft 'cordiale, Hidorifique , abforbante, peu aftringenre ; on la fubftitue à la corne de Cerf, Pl. 707, dont elle a les vertus ; la dofe eft depuis fix grams jufqu'à un fcrupule. Elle entre dans la Poudre Epileptique du Marquis, Pannonique de la Pharm. de Paris. PLANCHE 663, Canis carcharias 3 Requin. ON fe fert de fa cervelle & des dents. ^ C'eft un poùTon de mer cartilagineux & très-vorace ; il a depuis quinze jufqu'à vingt pieds de long, fa tète va en diminuant jufquau bout du mufeau, les yeux grands, la mâchoire inférieure en deflous & très-reculée , deux narines fous le bout du mufeau ; il a cinq fentes au col , de chaque côté, qui lui fetvent d'ouies; chaque mâchoire eft armée de hx rangs de dents triangulaires très-aiguës ; il eft tout couvert d'une peau à gros grains, chagrinée, dure, d'un roux brun, plus clair fous le ventre. Cette peau recouvre aulTi fes nageoires, au nombre defept, favoir , deux grandes vers les ouies , deux vers l'anus & 11110 petire vers la queue , une grande fur le dos & une au bout du dos , la queue relevée en haut & fourchue inégalement, la fourche inférieure plus courte j il eft vivipare. On le trouve dans prefque toutes les mers j il fe nourrit «M

The text on this page is estimated to be only 20.16% accurate

 tout ce qu'il peut dévorer, fans diftinÉtion; c'eft pourquoi il eft très-dangereux pour l'homme. Vertus. Sa cervelle fechée & en poudre eft fort apéritive : la dofe eft depuis douze grains jufqu'à un gros. Ses dents en poudre font apétitives, abforbantes ; la dofe eft depuis demi-fcrupule jufqua deux. Clupea feu Alofa , Alofe. On fe fert de l'os pierreux de fa tête. C'eft un poilfon de mer écailleux, qui remonte bien avant dans les rivières ; il croît jufqu'à un pied & demi de long j fa forme eft celle d'un ovale allongé. Voyez l'eftampe. L'iris des yeux eft argenté, la prunelle noirâtre, le dos mêlé de bleu, de verd & d'argenté, tout le refte du corps argenté, couvert de grandes écailles minces, une rangée de petites dents à la mâchoire fupérieure feulement , les narines à égale diftance du bout du bec & des yeux , fix nageoires , deux au défaut des ouies , deux petites au ventre , une longue après l'anus , toutes blanchâtres , une au milieu du dos , elle eft brune ; la queue fourchue. Les Alofes entrent en troupes dans les rivières au printemps, & retournent à la mer en été; elles font ovipares. Vertus. La poudre de l'os pierreux qu'on trouve dans fa tête , eft apéritive, abforbante : la dofe eft depuis demi-krupule jufqu'à un gros. Harengus } Hareng. On fe fert de tout le poifibn & de fes véficules. C'eft un poifton de mer écailleux, qui croît jufqu'à près d'un pied ; il reprcfente un ovale fort allongé , un peu applati par le dos , le deffus de la tête un peu creux au milieu , la mâchoire inférieure déborde un peu la fupérieure , les yeux font grands , l'iris argentée , les mâchoires ont à leurs bouts quelques petites dents très-fines, le dos eft d'un bleu obfcur, les côtés & le ventre argenté , cinq nageoires , deux près les ouies , deux rrespetites près l'anus, une vers le milieu du dos, toutes font blanchâtres, la queue profondément fourchue, grifâtre; il eft ovipare ; il vit de petits poiffons , coquillages ôc infectes de mer.

The text on this page is estimated to be only 19.15% accurate

ANIMAUX. Les Harengs viennent cous les ans en troupes innombrable* des mers du Nord, fe rendre dans les nôtres où on en pêche une prodigieufe quantité, puis au bout d'un temps ils difparoif lent jufqua l'année d'enfuite. r Vertus. La cendre de Hareng & fes véfîcules font diurétiques. Exreneurement la faumure des Harengs eft déterfive. PLANCHE 664. Cyprinus, Carpio , Carpe. ON fe fert des os qui font dans fa tête & du fiel. C'en- un poiflon d'eau douce, écailleux, qui croît jut qu'i trois & quatre pieds- il repréfente un ovale allongé & renne. ^ Les yeux aflez grands , l'iris doré & argenté , les narines à* egate diftanee des yeux 6c du bout du bec, la prunelle bleue, la mâchoire iupérieure un peu plus longue que l'inférieure , quatre barbillons à la mâchoire fupérieure , les écailles dures & grandes , fix nageoires , deux aux ouies , deux au ventre , un» de l'antis vers la queue, mie qui va du milieu du dos à la queue , la queue fourchue ; ia couleur des Carpes varie j on en voit de noires , de dorées , d'argentées ; les plus communes font grifes ; elle eft ovipare. La Carpe fe trouve dans les rivières , dans les lacs ■ on eft peuple aufli les eaux dormantes. Vertus. On trouve au haut du palais de la Carpe un os pierreux, triangulaire, large .& blanc, comme aulfi deux petites pierres ovales au-deiTus des yeux. On réduit le tour en poudre ; cette poudre eft diurétique , abforbante : la dofe eft depuis demi-ferupule juiqu'à un gros. Extérieurement le fiel eft déterfif, ophtalmique. Tinca , Tanche. On fe fert des os , de la tête Se du fiel. C'eft un poùTon d'eau douce, écailleux, qui ne croît gueres âs

The text on this page is estimated to be only 12.99% accurate

TOMÉ CINQUIEME de plus d'un piedi il repréfenre un ovale allongé nuls renne far le dos. 6 » 4 Plu* La tête eft affèe petite , la mâchoire fupérieure relevée 8c pU courte q?e 1 inférieure fins rouge, les écailles pétkés il S epaiile, fix nageoires, deux près des ornes, deux fous i £•? ue une après 1 anus, une à la pente du dos , la queue cnnere. Tout Iç poiflôn a une teinte noirâtre, plus obfture au plus blanchâtre au ventre; il eft ovipare. 9 La Tanche n'aime pas les eaux vives; c eft dans les eaux va. bourbe^ "°UVe °Ù ^ communément dans la Vertus. On trouve dans fa tête deux petites pierres, qu'on réduit en poudre ^ cetre_ poudre eft abforbanre, Wfiw.'SS^S dofe eft depuis douze grains Jufqu'à deux fcrupules, Lcfid^. ploie pour la furdité. J Lucius 3 Brochet, • °nIe/ert de f°n B/'r df fa §raiire> de fa mâchoire infé. neure & des petits os de fa tête. Ceftunpoiffdn d'eau douce, écailleux, vorace ; il croît fuf au a cinq pieds de ong; il représente un ovale apphti, trèsallonge, ta te te eft longue & plate, diminuant d'épaiffei hifqu au bout , la mâchoire inférieure avancée au delà de la fcbé neure, les narines près des yeux, les yeux plats, l'iris îâunal ne, la prunelle ovale, bleuâtre, une rangée de dents à la mâ choire intérieure , alternativement fixes & mobiles ; la mâchoire fupéneure n'a pomt de dents aux côtés ; mais au bout elle a une rangée de dents très-fines & trois rangées au palais, toutes mobiles hx nageoires , deux au bas des ouïes , deux au venrre une vers la queue après l'anus , une au bout du dos, la queue fourchue; toutes les nageoires font d'un blanc jaunâtre, les écailles allez pentes , le dos noirâtre, le ventre blanchâtre i il eft ovipare. On le trouve par-tout, dans les eaux vives & dormantes. Il vit de tous les animaux qu'il peut attraper, poiifons oîféaux d'eau, rats d'eau, &c. qu'il avale tout vivants, Vertus et Usages. Le fiel eft apéritif, fébrifuge : la dofe eft fept à huit courtes ; extérieuremenr il eft ophrajbntque. La graiffe eft extérieurement réfoliirive, adoucifTante.

The text on this page is estimated to be only 20.32% accurate

4oS ANIMAUX. La mâchoire inférieure pulvérifée, eft abforbanre, alkaline, déterfive : la dofe eft depuis douze grains jufqu'à demi-gros. Sa cendre eft extérieurement defficacive. Les petites pierres qui fe trouvent dans la tête, font hyftériques, diurétiques, céphaliques : îa dofe eft depuis demi-fcrupule jufqu'à deux. La mâchoire entre dans la Poudre antipleurétique de Bâtés. PLANCHE Perça , Perche. ON fe fert des os du dedans de fa tète. C'eft un poiflon d'eau douce, écailleux, vorace, qtu croît jufqu'à un pied de long ; elle repréfente un ovale allongé , mais raccourci du côté de la tète. La mâchoire fupéneure eft relevée , l'inférieure un peu plus avancée, plufieurs petites dents aux deux mâchoires & trois rangées de dents au milieu du palais , l'iris jaune foncé, la prunelle ovale, verdâtre , fept nageoires, deux aux ouies, deux à la poitrine au-delfous de celles des ouies , une à l'anus , vers la queue au ventre , Se une au dos vis-à-vis ; la queue fourchue ; la feptieme, qui rient tout Le detfus du dos , lui fert plutôt de défenfe que de nageoire; elle eft compofée de quatorze rayons très pointus & piquants, attachés l'un à l'autre par une peau grife 5 elle peut drelfer & ouvrir ces arrêres , en façon d'éventail ; ce qu'elle fait très-facilement , pour fe défendre & Je fauver des attaques du Brochet & de tout ce qui veut la faifir. Les nageoires du dos font grifes, celles du ventre font rouges, les écailles font très-petites , le dos eft bigarré de plufieurs taches noirâtres, larges, defeendant en diminuant fur les côtés , le refte eft d'un gris jaune , le ventre blanc; elle eft ovipare. Elle aime l'eau courante , & fe déplaît dans les eaux dormantes jufqu'à y mourir : air.fi on ne la ttouve guère que dans les grandes & petites rivières où elle vit de petits poiftons, de coquillages. Vertus. Les petits os qu'on trouve dans fa tête , vers l'origine de fon dos , réduits en poudre , font apéritifs , abforbants ; la dofe eft depuis douze grains jufqu'à deux fcrupules. Extérieurement ils font defficatifs.

The text on this page is estimated to be only 17.45% accurate

TOME CINQUIEME. ^ Salmo j Saumon. On fe fert de fon fiel. C'eft un poiffon de mer écailîeux, qui remonte darts îes rivières -y il croît à la longueur de quatre à cinq pieds j il repréfente un ovale allongé, pointu par la tête. La tète fe termine en pointe émotuTée j elle eft afTez petite t proportionnellement au corps, les deux mâchoires garnies de dents aiguës , dont quelques-unes font mobiles , l'iris des yeux d'un verd argenté , la prunelle noirâtre , les écailles du corps médiocres, noirâtres au dos, argentées ailleurs, parfemées ait dos Se aux cotés , de taches ou points noirs efpacés ; il a h chair rougeâtre , fept nageoires , deux près des ouies , noirâtres , deux au ventre, blanchâtres, une après l'anus, blanche, une qui tient le milieu du dos , hoirâtre ; la feptieme eft un cartilage arrondi , litué entre le dos ÔC la queue, recouvert de la même peau du dos , la queue fourchue , noirâtre ; il eft ovipare. Il remonte au printemps , où l'eau des neiges fondantes l'attire j il y dépofe fes œufs & s'en retourne tout de fuite à la mer# Vertus. Son fiel s'emploie dans les maladies des yeux & des oreilles J Trutta s Truite. On fe fert de fes mâchoires & dents , & de fa graifle» C'eft un poiflon d'eau douce, qui croît depuis un pied de long jufqu'à deux. La Truite a bien des, reffemblances avec le Saumon cî-deffus : Peftampe fait fuffifam ment connoître les perites différences1 qui s'y rencontrent; la tête plus plate, le dos moins élevé, la même quantité de nageoires placées de même ; mais la queue ds la Truite eft pleine & celle du Saumon eft fourchue. Il s'en trouve dont la chair eft blanche; celles dont elle eft rou^e fe nomment Truites faumonées -, elle eft ovipare. Les Truites ne peuvent vivre que dans l'eau très-vive & claire, comme dans de petites rivières qui coulent rapidement ! on en trouve auiïi dans les grands lacs; elles fe nourriffent d'infeftes d'eau. Vertus. Les mâchoires & les dents réduites en poudre, font abfor* tantes > diurétiques : la dofe eft depuis un gros jufqu'à deux.

The text on this page is estimated to be only 19.42% accurate

'4to ANIMAUX, Extérieurement la graille eft adoucifTanre , rêTohïtive. DES REPTILES ET AMPHIBIES. PLANCHE 666. Vipcra j Vipère. ON fe fert de tout l'animal Se de fon cœur, foie & graille. C'eft un ferpent terreftre écailleux , qui croît jufqu'à deux pieds en longueur , iur la largeur d'un pouce. L'eftampe en fait fuffifamment connoître la forme & les proportions ; fes yeux font fort vifs; tout l'animal eft couvert decailles comme un paillon ; toutes les taches qu'on voit à la tète & au corps font noires. Les Vipères varient en couleur; mais le gris eft le plus commun. Le long des mâchoires Supérieure & inférieure , il y a un rang •de dents de chaque côte , petites , creufes ; leur nombre eft indéterminé; ordinairement il eft de huit; elles font terminées vers le haut du mufeau , par deux groftes dents crochues , firuées plus en dedans ; celles-ci font les dents venimeufes ; elles font accompagnées chacune d'une véhcule , remplie d'une liqueur jaune. Quand la Vipère mord , cette liqueur coule tout de fuite dans la plaie. Ce fuc étant un efprit acide, coagule le fang. Le remède eft d'avaler au plutôt lis ou fept gouttes de quelque Alkali volatil, comme de l'Eau de Luce ou autre, & ïéiterer jufqu'à guérifon. Xa mâchoire inférieure a dans fon milieu un canal rond, long & percé dans fa longueur, au bout duquel eft lîtuée une langue fourchue, que la Vipère fait fortir de fa gueule, quand elle veut, & qu'elle agite avec une grande vivacité : le canal eft l'organe du fifflement qu'elle fait entendre, quand elle eft animée; elle eft vivipare. Elle ne rampe pas vite & ne bondit jamais; tous les ans elle quitte au printemps fon ancienne peau; elle vit de petits animaux. , comme grenouilles, mouches , fearabées, dcc. Les Vipères font plus communes dans les pays chauds que dans les autres; on les trouve aux lieux montagneux, fecs, pierreux.

The text on this page is estimated to be only 21.74% accurate

TOME CINQUIEME. 41a Vertus et Usages. La Vipère eft cordiale , diaphonique , alexiraire : la dofe en poudre eft depuis douze grains jufqu a deux fcrupules : on l'emploie aufli en bouillons. Le coeur & le foie pulvérifés, fe donnent depuis huit grains jufqu a un fcrupule. Exrérieuremenr la graille des inteftins & l'huile , font décerfives , ophcalmiques. La. poudre de Vipères entre dans l'Orviétan, la Thériaqae célefte. La Poudre & le Sel volatil dans l'Orviétan fin , le Sel volatil dans^ la Poudre de pattes d'Ecrevitïes. Les Troçhifqucs dans la Thériaque ordinaire. ■ —* PLANCHE 667. Serpens, Serpent à collier. ON fe fert de tout l'animal , de fon cœur , foie & grailleC'eft un Serpent terreftre écailleux ; il eft très-long en comparaifon de fa grofleur , qui eft médiocre : Peftampe Je rend très-fidèlement & en épargne la defcnption. Les deux taches blanches & noires qu'il a derrière la tête, lui ont fait donner le nom françois qu'il porte. Tous les points répandus fur fon ventre, font noirs; du refte fa couleur eft grife , le dos & la tête plus bruns , le venrre plus blanc ; il eft ovipare; fes œufs font blancs, gros comme ceux d'une Pie, fans coque; mais entourés d'une peau blanche , mince. Il fe trouve aux lieux humides , dans les prés, dans les buiffons j il n'eft nullement venimeux 5 il vit de petits animaux comme la Vipère. Vertus. Elles font les mêmes que celles de la Vipère, &: on peut lui fiibftituer. Bb 3

The text on this page is estimated to be only 18.90% accurate

-4ix ANIMAUX. Tir PLANCHE 668. Lacertus terrejlris 3 Lézard gris, ON fe fert de tout l'animal. C'eft un Reptile terreftre écaîllenx ; il eft delîîné de fa grandeur naturelle , 8c coures fes proportions prifes au compas, La couleur eft gris cendré , jafpé de blanc ; les deux mâchoires font garnies de petites dents fines ; les yeux fon trèsvifs & pétillants ; fa langue eft rougeâtre , fendue en deux filets , qu'il fait fortir ôc remue très-vivement \ le ventre eft d'un vend bleuâtre clair j l'anus eft un peu plus bas que les jambes de derrière. Il coule très- vite , à l'aide du mouvement vif & ondulant de fa queue; car fes jambes , quaii horifontales , ne peuvent guère fçrvir qu'à le faire avancer lentement & à le tenir en équilibre. Il fe nourrit de petits infedes , fur-tour de vers de terre. Il eft ovipare ; il s'accouple au commencement du printemps; la femelle dépofe fes œufs dans les vieilles murailles ou entre des pierres; la chaleur furvenant les fait éclore; ils s'enfoncent en terre l'hiver , qu'ils y pallent, comme engourdis. Ce Lézard eft plus commun dans les pays chauds que dans les froids j ou le trouve dans les lieux pierreux, murailles, décombres. PLANCHE 669. Lacertus viriàis , Lézard verd. CE Lézard reffemble beaucoup au premier pour la forme ; mais il eft une fois plus gros & plus grand ; les différences font qu'il eft en entier d'une couleur verd-gai , très-agréable à la vue; que les écailles de fon corps font fi petites, qu'elles ne paroiflent être qu'une peaugrenée; que tout fon ventre eft cuiraffé de grandes écailles. On le trouve dans les bois ; il eft plus commun dans les pays chauds que dans les autres.

The text on this page is estimated to be only 16.02% accurate

TOME CINQUIEME. 413 Vertus et Usages des deux Lézards. ïls font les mêmes j le Lézard verd eft plus eftimé. Les Lézards font fortifiants , réfolutifs j on s'en fert peu pour l'intérieur. Extérieurement ils ont les mêmes vertus. Leur Huile eft déterfîve, réfolntive, fortifiante-, leur fiente eft ophtalmique. Le Lézard verd entre dans l'Huile de Lézards de la Pharm. de Paris. PLANCHE 67O. Scincus y Seine. ON fe fert de l'animal entier. C'eft un Reptile terreftre, écailleux comme les précédents , plus gros que le Lézard gns & moins que le verd. Il reflemble, en général , aux précédents; les différences font qu'il a la tête plus en avant des épaules; que tout fou corps, fes jambes & la queue font couverts d écailles, difpofées comme celles des pouTons, & comme eux une ligne latérale de chaque côté , au-delTous de laquelle defeendenr plufîeurs taches brunes , efpacées : ce qui lui a fait apparemment donner par quelques-uns, l'épithete de marin , quoiqu'il foit réellement terreftre , il aies pieds plus petits Se la queue plus courte que les précédents. Sa couleur, en général, eft jaune verdârre, argentée & luifan te. 11 fe trouve en Egypte , aux lieux montagneux. Vertus et Usages. Il eft fortifiant , alexipharmaque : la dofe de fa poudre eft un grosIl entre dans la Thériaque de Venife, l'Eledluaire Diafatyrion , le Mithridat. Bb.4

The text on this page is estimated to be only 19.35% accurate

4H ANIMAUX. PLANCHE 6jl. Rana vhidls , Grenouille verte. 'Eft un Reptile amphibie , plus aquatique que terreftre V-> long de deux pouces & demi, large d'un pouce , verd en dellus, tacheté de points bruns, blanchâtre en deiïbus- luis jaune doré, la prunelle noire, les oreilles derrière les yeux rondes, recouvertes de peau & quelques trous autour, la m£ çïioire luperieure garnie d'une rangée de petites dents, l'anus fuué vers le dos. L.i Grenouille faute fur terre , jtifqu'à quatre & cinq pieds en avant, en déployant tout-à-coup fes grandes cuiiTes & jambeï de derrière , qui lui fervent auffi à avancer en nageanr. L'accouplement fe fait dans l'eau où le mâle féconde les œufs que la femelle fait fortir , enveloppés par tas dans une humeur gluance & tranfparente. C'eft ce qu'on nomme le frai y les œufs font noirs ; ces œufs éclofent d'abord en un infecte noir , qu'on nomme ï ét.ird j car il eft tout en tête & en queue : voyez l'efiampe. U nage très-vivement au moyen de fa queue; il devient gros comme une cerile , & au bout de quelque temps il fe tranfjforme périr à petit en Grenouille parfaite ; les jambes de derrière forcent les premières , puis de jour à autre celles de devant ; la queue difparoît & le voilà Grenouille pour toute fa vie. Cette efpece de Grenouille fe tient quelquefois fur terre, aux bords de l'eau , dont elle ne s'écarte guère ; elle a un ch;int oa croanemenr fort importun , principalement dans les jours chauds du printemps. On la trouve dans toutes les eaux, foi: vives, ou dormantes , ou marécageufes ; elle vit d'herbes aquatiques , de petits ànft&es. PLANCHE 672. Ranetta, Grenouille Saint-Martin. N fe ferr de l'animal entier & de fon fang. V.-/ _ C'eft un petit Reptile terreftre, qui a à peine un pouce & demi de long 5c prefque auffi luge ; il eft totalement verd gai o

The text on this page is estimated to be only 18.99% accurate

TOME C I N Q U I E M E. '415 agréable , plus pâle au ventre ; il reflemble d'ailleurs entièrement à la Grenouille ci delïus , faute comme elle &c croaife bien plus foiblement, Cetre petite Grenouille fe tient fur les arbres ou elle monte dans les haies : une feuille eft capable de la foutenîr. Vertu;, et Usages des deux Grenouilles. Elles ont toutes deux les mêmes vertus ; elles font humectantes, incraifantes , béchiques : on en fait des bouillons. Le foie eft céphahque ■, on le prend en pondre. Extérieurement le frai eft déterfif , un peu répercuffif. L'Huile eft anodine , adoucitfante. Le fiel eft ophtalmique. Le fang de la Grenouille Saine-Martin eft vulnéraire dans les plaies récentes. Sa. cendre arrête le fang. La Grenouille entre dans les Emplâtres de Vigo, fans mercure & avec mercure. Bufo , Crapaud. On fe fert de tout l'animal. C'eft un Reptile terreftre , qui croît à la longueur de cinq pouces, fur trois pouces depaiifeur; fon corps eft, en général, d'un jaune brun } fa peau eft très-épaifTe & comme chagrinée à gros grains, étant remplie de boutons faillants; fes yeux font recouverts en partie, deifus & delïbus , par une pellicule d'un jaune doré. Il reffemble beaucoup à la Grenouille; les différences font qu'il eft bien plus maiîîf en total - qu'il a quatre doigts devant, iix derrière , les jambes & cuiffes plus courtes & groifes : ce qui fait qu'il ne peut que familier & marcher affez lentement, ou plutôt fe traîner. Il habite les lieux pierreux , humides Se ombrageux ; il vit d'infeétes & d'herbes. Vertus et Usages, La poudre 6c les cendres de Crapaud font diurétiques, fudorifiques : la dofe eft depuis douze grains jufqu'à demi-gros. Extérieurement l'Huile , c'eft-à-dire, l'infufion de Crapaud, dans l'Huile de Lin , eft anodine, déterfive. Le Crapaud entre dans le Baume tranquille ; les têtes de Crapaud dans le Baume de Leitour de la Pharm. de Paris.

The text on this page is estimated to be only 19.12% accurate

ANIMAUX. PLANCHE 673, Salamanira s Salamandre. ON fe fert de l'animal entier. Ceft un Reptile terreftre, une efpece de Lézard non écailleux, qui croît jufqu'à cinq ou fix pouces en longueur, en comptant fa queue. Il a la tête large & applatie, les yeux faillants comme le Crapaud ou la Grenouille & noirs, le corps grollier ainfi que la queue, les jambes très-courtes, quatre doigts à celles de devant, cinq à celles de derrière. Tout l'animal eft couvert d'une peau noirâtre, parfemée de taches jaunes, qu'on diftingue en blanc dans l'eftampe, une ligne noire fur le dos, formée par des points quarrés, près à près ; fa peau eft allez luifante , pat une humeur vifqueufe qui l'enduit. Cet animal marche très-lentement Se n'eft nullement venimeux , ni à craindre : quand on le preGTe entre les doigts , il rend par fa peau une humeur laiteufe ; ce lait jaillit même allez loin : cette liqueur n'a aucune malignité. Ceft elle qui , fi on met cette Salamandre fur des charbons , les éteint , quand ils ne font pas trop allumés ; maïs fi on continue le feu , elle brûlera comme tout autre animal. Elle eft vivipare. On la trouve aux lieux humides & pierreux , dans des trous au pied des vieux murs. PLANCHE 674Lace nus aquatilis , Salamandre d'eau. ON fe fert de l'animal entier. Ceft un Reptile totalement aquatique , une efpece de Lézard d'eau non écailleux, qui a vers fept pouces de long comptant fa queue. La tête eft large & plate , les yeux un peu faillants , les pattes de devant ont quatre doigts , celles de derrière cinq , la queue eft plate & perpendiculaire à l'animal ; elle a de chaque cote une bande d'un blanc argentin, qui la côtoie jufqu'au bout:

The text on this page is estimated to be only 18.26% accurate

TOME CINQUIEME. 417 tonte la peau eft chagrinée à petits grains , brune fur le dos &C fur les côtés, jaune orangée fous le ventre, le tout parfeméde petites taches noires. Le mâle, qui eft defliné dans l'eftampe, fe diftingue de la femelle par une efpece de crête ou peau, qui commençant fur la tête , va en s'élargiftant jufques vis-à-vis le milieu du dos , puis diminue jufques vers les pattes de derrière , elle fe tient debout dans l'eau,; plus une autre peau pareille moins haute , prenant à l'origine de la queue & finiflant vers le bout. Cette Salamandre eft ovipare. On la trouve dans les eaux dormantes & croupiflântes ; elle y vit d'infectes d'eau. Vertus des deux Saiamahdb.es, Extérieurement leur cendre eft déterfive. o PLANCHE 6jf. Teftudo terrefins , Tortue de terre. N fe fert de fa chair, fang , fiel & graille. , ' C'eft un Reptile amphibie , teftacé Se écailleux ; il croît à la longueur d'un pied & plus. ^ Tout fon corps eft couvert de deux écailles allez epaifles ; celle de deiïus brune , voûtée Se defimée en compartiments hexagones , fymmétrifés, bordée d'autres plus petits quarrés ; 1 écaille de deflous jaunâtre , un peu creufe au milieu & fans compartiments apparents; la tête petite, le mufeau pointu, les mâchoires fans dents , mais tranchantes fur leurs bords , les jambes écailleufes, d'un noir luifant, le col couvert d'une peau rude, ridée, noire, les yeux noirs, l'iris brun rongeâtre , la queue en pointe, droite, cinq doigts aux pieds de devant, quatre a ceux de derrière , tous armés d'ongles noirs. Quand elle veut elle cache fa tête fous les plis de fon col 8c elle la fait rentrer , ainfi que fes jambes & fa queue , fous fa coquille ; elle marche ou plutôt fe traîne avec lenteur ; elle eft ovipare ; elle cache fes œufs fous une couche de terre , qu'elle met par-demis; le foleil les fait éclorre. On la trouve dans les lieux marécageux de nos pays chauds ; elle y vit d'infeftes Se coquillages d'eau Se de terre , paflant la vie dans les deux éléments.

The text on this page is estimated to be only 20.42% accurate

4i$ ANIMAUX. Tejîudo marina, Tortue de mer. On fe fert des mêmes parties de la précédente. C'eft un Reptile de mer amphibie , teftacé & écailletix , qui croît jufqu'à cinq pieds de long. Elle a beaucoup de reflemblance avec la précédente; les différences font qu'elle a la tête ronde, que fes écailles repréfenrenc un ovale plus allongé , que les bords de fes lèvres font taillés en dents de feie , & que fon col & fes pattes , faites en nageoires , font couvertes d'écaillés de ponTon. Elle eft très-commune aux Ifles Antilles ; elle effc ovipare & ne fort de la mer que pour dépofer fes oeufs dans le fable , oit la chaleur du foleil les fait eclorre. Vertus et Usages des deux Tortues. Elles font les mêmes. Le bouillon de Tortue eft béchique , reftaurant ; le Sirop a les mêmes vertus : la dofe eft depuis demi-once jufqu'à une once& demie. Le fang defféché eft céphalique & hyftérique, depuis douze grains jufqu'à deux fcrupnles. Extérieurement il eft déterfîf. Le jiel eft ophtalmique. La graijje eft émollienre & réfolutive. La Tortue eft la bafe du Sirop de Tortue de la Pharm. de Paris. DES OISEAUX. PLANCHE 676. Acçipiter 3 Epervier, Mouchée. ON fe fert de fes ongles, des excréments & de la graifTe.^ C'eft un oifeau de proie , environ de la taille d'un petit pigeon; mais plus allongé. 11 a le bec crochu, noir; la peau au-defTus des narines jaune i, l'iris des yeux jaune, les yeux furmontés d'une élévation, imitant des fournis , une bande blanche au-defTus des yeux , une bande, caffé bridé , depuis les yeux jufqu'au derrière de la tête, le dos, les ailes & la queue cafTé brûlé , les joues, le col en défions & tout le deflous du corps à fond blanc , barré de ligues brunes

The text on this page is estimated to be only 18.98% accurate

TOME CINQUIEME. 4I9 preOTées , imitant les écailles de poiflbn j le demis de la queue barré par cinq ou fix taches noires , les jambes & pieds jaunes , les ongles noirs. La femelle pond cinq œufs blancs , tachés de quelques points rouges. On le trouve dans les bois ; il fe nourrit de médiocres & de petits oifeaux , comme Grives , Alouettes , Pinçons. Vertus. Ses ongles ou ferres en poudre, font aftringents : la dofe eft d'un demi-gros à un gros. Les excréments font hyftériques , à la dofe d'un fcrupule. Extérieurement ils font ophtalmiques , ainfi que la graijfe. PLANCHE 077. Alauda> Alouette. ON fe fert de l'animal entier 8c de fon fang. C'eft un petit oifeau des plaines , gros à peu près comme un moineau, mais plus allongé & qui nefe perche jamais. Sa couleur, en général, eft un gris roux clair; il a le bec fupérieur noirâtre , l'inférieur plus clair, les narines rondes ; il a au col une portion de collier & une bande, qui vient du col à l'aile , brunes ; le col & l'eftomac parfemés de taches longuettes , de plus grandes fur le dos & à la queue , dont la dernière plume de chaque côté eft blanche ; les jambes & les pieds bruns , les ongles noirs : dans le mâle l'ongle du doigt de derrière eft très-long. Elle fait fon nid dans les bleds & autres grains, où elle fe nourrit de graines fauvages. Vertus. Le bouillon d'Alouette eft carminatif , le fang eft diurétique x à la dofe d'un gros à un gros & demi. Alcedo muta , Martin-pêcheur. On fe fert de tout l'animal. Oeft un petit oifeau du bord des eaux, pêcheur, long de fept pouces ou environ, depuis le bout du bec jufqu'à celui de la queue, ayant le bec long de près de deux pouces ; il a de très-belles couleurs.

The text on this page is estimated to be only 18.70% accurate

■410 ANIMAUX. Le bec rtoîr , les narines oblongues , les yeux noirs , le deiïiis de la tête jufqu'aux yeux, bleu foncé * barré par de pentes rangées de bleu clair, une perire bande noire, du bec à l'œil, une°tache blanche , large, au-deflus , furmontée d'une tache orangée, une bande pareille à la couverture du deiïus de la tête, en forme de mouftache, qui va du bec vers le dos, un efpace orangé au-deflus , qui va au-deflous de l'œil , un efpace blanc à côté, qui va vers le dos, le menton blanc, dont la couleur fe teint petit à petit en oranger vers l'eftomac ; l'orangé eft enfuite la couleur de tour le deifous du corps ; l'aile , le dos & tour le dellus du corps font bleu foncé , relevé de taches bleu plus clair , le bas du dos & le croupion font d'un bleu brillant & argenté , les jambes & pieds font mi-parties de bleu & d'orangé , le devant orangé , le derrière bleu. lîfe perche ; il fait fon nid dans des trous , ptès de l'eau ; il y pond quatre ou cinq œufs. On le trouve le long des eaux vives , comme rivières , ruiffeaux, où il fe nourrit de petits poiflons, d'infectes , &c. Vertus. L'oifeau defleché & mis en poudre , eft céphalique à la dofa d'un fcrupule. PLANCHE 678. Anas fylveftris 3 Canard fauvage. ON fe fert de fon foie , graille & fang. ■ C'eft un oifeau fauvage d'eau douce, qui devient de taille moyenne; fa longueur , depuis le bout du bec jufquau bout de la queue , eft d'environ deux pieds. ^ Il a le bec applati, large au bout , d'un vetd jaunâtre , les narines en long. c , Le mâle a la tête & la moitié du col d un beau verd ronce , terminé par une bande blanche, la poitrine & le ventre blanc cendré, moucheté, le dellus du col & des ailes cendre, roux, le deOfous de la queue noir, une bande blanche à chaque aile, vers fon milieu une tache bleue , large à l'origine des plaines uu fouet de l'aile , terminée par une bande blanche (la terne ne e entièrement d'un gris roux, marbré de blanc & plus de blanc

The text on this page is estimated to be only 17.71% accurate

TOME CINQUIEME. 411 ventre) las jambes Se pieds fafranés , les ongles bruns , les nageoires jaune laie. La femelle fait fon nid près de l'eau, dans des touffes de jonc ou de bruyère ; elle pond jufqu'à quinze œufs : les jeunes Canards de l'année fe nomment Hallekrans. Les Canards fauvages fe trouvent fur toutes les eaux , foie courantes, foit dormantes , où ils vivent d'infe&es d'eau, d'herbes & de tout ce qu'ils y rencontrent. Vertus et Usages. Le foie eft défobftruant , hépatique j le fan g eft alexitaite à la dofe d'un gros julqu'a deux. Extérieurement la graille eft anodine, émolliente, réfolutivej elle entre dans l'Onguent pe&oral, fortifianc de la Pharm. de Paris. ■■■lliin IJlLlJ L] «JBflL'HJlMIIIW^WHM llflU— I III I ■linilll III II I llllif» fl il^wt PLANCHE

The text on this page is estimated to be only 19.54% accurate

4ii m A N I M A U X, _ La graiffe entre dans les deux Onguents ci-deffus. la ftenté diftillée dans l'Eau ophtalmique de l'Empereur Maximilien. PLANCHE 680. Aquila regalis , Aigle royal. ON fe fert de fon fiel , graiffe & excréments. C'eft un très-grand oifeau de proie; il a trois pieds neuf pouces de long, depuis le bout du bec jnfqu'au bout de la queue, Le bec eft couleur de corne , fa pointe noire , la peau , qui effc à la racine du bec, jaune, l'œil grand, l'iris verd clair & rougeâcre, la prunelle noire , les fourcils fort faillants, en façon d'auvent , les plumes du col longues , rudes; tout le plumage de couleur tannée ou châtain mêlé de blanc. L'Aigle royal habite les plus hautes montagnes de toutes les parties du monde : on le trouve en Suiffe , fur les Alpes , les Pyrénées , &c. La femelle ne pond que deux œufs 5 il vit de tous les animaux qu'd peut attraper & enlever. Vertus. Extérieurement le fiel eft ophtalmique; la graine eft émoiliente, réfolutive, adouciffante, fortifiante ; la fiente eft incifive, pénétrante. PLANCHE 68l. Ardea cinerea s Héron gris. ON fe fert de fa graiffe. C'eft un grand oifeau du bord des eaux, pécheur; fa longueur , depuis le bout du bec jufqu'au bout de la queue, eft de trois pieds ik, demi. Son bec eft long d'environ cinq pouces & demi, d'un verd jaunâtre, plus brun fur l'arête fupérieure , le bec inférieur plus jaune, le delfus de la tête blanc, l'iris orangée, la prunelle noire, une bande noire, qui va de chaque côté de l'œil au derrière delà tête, où elle forme une hupe noire, pendante, longue

The text on this page is estimated to be only 18.43% accurate

TOME CINQUIEME. longue de trois pouces ou environ j le col a une efpéce de char* tuere vers le bas de la hupe , qui fe dillingue par une avance i tout le col cendré clair jufqu'à l'aile, mais blanc en devant tacheté de noir, finiffant par des plumes allongées, blanches! qiu forment une efpece de cravate fur l'eftomac , dont l4 côtés font noirs jufquau pli de l'aile, qui eft blanc en haut, iioir au-deflous , ainlî que tout le fouet de l'aile ; du relie tous le corps cendré brun , les cuiffes longues, d'un gris un peu roux, les jambes verd faie 8c foncé , les ongles noirs, aifez petits , l'ongle du doigt du milieu, garni par le côté intérieur, d'une denreleure faite en dents de fcie. Cetoifeau s'élève très-haut en volant; il couche fon col fur fon dos & fa tète fur fon col, au moyen de la charnière donc en vient de parler. Son vol eft lent , fes jambes font étendues en arrière. Il habite le bord des rivières & des étangs ; il y vit de Grenouilles , de poillons , qu'il pêche avec fon bec ; & quand il les a failîs à contre-fens , il les jette en l'air de manière qu'ils s'y retournent; alors il les reçoit & les avale. Il perche & fait fon nid vers la cime des plus grands arbres j les ceufs font verd bleuâtre^ Vertus, Sa graifle eft émolliente , réfolutive. PLANCHE 682. Ci coma , Cigogne. ON fe fert de l'animal entier, de fon fàng, graiiîe, fiel & fiente. C 'eft un grand oifeau depaffage, carnacier, qui fuir la température des climats ; il vole en troupes, s'élève très-haut & va loin , fans faire aucun cri ; il a quatre pieds de long , depuis le bout du bec jufqu'à l'extrémité des pieds. Le bec & les jambes font rougeâtres, l'œil eft entouré d'uilê peau noire, le bas des ailes eft noir, la tète, le col & tout Je corps blancs; elle porte prefque toujours fa tète, comme on le voit dans l'eftampe. Afin d'évirer la grande chaleur 5 les Cigognes vont palier l'hiver dans les pays chauds , comme en Afrique, en Egypte, $£ C c

The text on this page is estimated to be only 16.57% accurate

4M A N I MAUX. l'été dans les Régions tempérées y elles vivent de Grenouilles de ferpents & autres infectes. Elles font leurs nids au haut des grands arbres , fur les cheminées , fur le faîte des maifons -y leurs œufs font de la taille & de la couleur de ceux d'Oie, PL 679 ; leur couvée eft de quatre ou cinq œufs. Vertus. Le fang en poudre eft alexitaîre à la dofe , depuis un ferupule jufqu'à un gros. La fiente eft adouciftante, calmante, depuis douze grains jufqu'à un ferupule. Extérieurement la Cigogne cuite & confommée dans l'huile tl'olive , eft fortifiante , nervine j le fiel eft ophtalmique. PLANCHE 683. G rus , Grue. N fe fert de l'animal entier , de fa tête & gc/îer , graille, C'eft un très-grand oifeau de paffage , qui ne vit que de grains & d'herbes, & qui fuit les climats froids ; il vole très-haut, en troupes nombreufes , rangées en deux files , qui forment un angle , terminé par la première ; elles choififlent la nuit pour voyager, & crient perpétuellement en volant. La Grue a cinq pieds, depuis le bout du bec jufqu'au bout des pieds. Elle a le bec d'un noir verdâtre, long de quatre pouces, le deflus & le derrière de la tête noir , (le mâle a une bande rouge, qui va de L'œil en arrière) une autre bande blanche prend du bec à l'œil , & de l'œil defeend derrière le col ; tout le refte du col d'un cendré obfcur , & tout le corps cendré clair ; le fouet de l'aile noir, les jambes brunes; elies ne couvent que deux œufs. C'eft le froid qui guide les Grues j on les voit palier en Automne, gagnant du côté du Nord. Vertus. La Grue, mangée de quelque façon qu'on l'apprête, eft nervine, carminativej la tête & le géfier, réduits en poudre, font déterfifs.

The text on this page is estimated to be only 17.51% accurate

TOME CINQUIÈME, au Extérieurement fa graiffe a les vertus de celle d'Oie, Pl. 67/, Le fiel eft ophtalmique. PLANCHE 684. CardueiiSj Chardonneret. ON fe fert de tout l'animal. C'eft un petit oifeaa fauvage , qui a un ramage âgréabl* & que l'on prive aifément ; il eft un peu plus petit que le Moineau, Pl. 692. Il aie bec couleur de corne, l'iris couleur de noifetre , uft efpace écarlate tourne autour du bec , dont l'origine eft bordés par une ligne noire, qui s'élargit en deffbus au bec inférieur} un efpace noir couvre le de (fus de la tête & enveloppe un efpace blanc , qui s'élève derrière l œil & defcend au col où î'efpace noir du delfiis de la tète fe termine en pointe \ le dos roux, cannelle foncé, le ventre roux clair, l'aile noire, traverfée en long par une bande d'un beau jaune, les bouts des plumes de toute l'aile & la queue noire , fourchue , les bouts de îes plumes blancs , les jambes de la couleur du bec. Il fait fon nid dans les buiftons y il vit de graines de chardon & autres. La femelle chante ainfi que le mâle. Vertus» En aliment il purifie le fang. planche 68y. Columba, Pigeon bi fer. ON fe ferr de tout l'animal , de fon fang & de fa fiente. C'eft un oifeau domeftique de médiocre grandeur j il a treize pouces de long , depuis le bout du bec jufqu'au bout de la queue ; il vit en nombreufe fociété. Le bec eft affez mol, brun, Je deflus des narines blanchâtre & comme farineux, l'iris roufte, les jambes courtes & rouges, la tête gris bleuâtre , le col hâtant êt changeant de bleu en couleur de cuivre rouge, fuivanc les afpe&s; le jabot rouiTeâtre, C c 2

The text on this page is estimated to be only 19.76% accurate

Anima -u x. îe deffôus du corps cendré, ainfi que le corps de l'aile, une tande blanche très-large au bas du dos , flanquée par une tache bleu noirâtre à chaque aile, la queue pleine : ces couleurs ne foncpas contrantes à toute l'efpece ; il s'y rencontre des vaxiétés. On leur bâtit des roufs rondes ou quarrées , garnies en dedans de loges ou nids ; ils s'y multiplient prodigieufement & s'y xerirenr la nuit : leur ponte eft de deux œufs blancs.} ils en font plulleurs dans l'année. Ils fe nournlfent dans les plaines des graines qu'ils y rencontrent ; ils ne perchent point. Vertus. Le Pigeon vivant, fendu en deux par le dos., & appliqué furie champ extérieurement, eft très-diaphorctique, difcufiif, atténuant. La fiente calcinée, lelTivée , mife en poudre, eft difeuffive, ."réfolutive , diurétique: la dofe eft d'un à deux fcrupules. Extérieurement elle eft vellicatoire. Le fang récent encore tiède , eft ophtalmique, Turtur , Tourterelle. On fe ferr de l'animal entier & de fa graiffe. ^'eft un oifeau fauvage, paffager, reffemblant à un petit •Pigeon; il a, du bout du bec au bout delà queue, un pied de long. La Tourterelle a le bec noirâtre , Tœil entouré d'un cercle rouge , l'iris jaune orangé , le col & le deffus du -corps , gris vineux , le dos cendré , une plaque large à chaque côté du col , mi-partie de plumes blanches & noires , difpofées par rangées; les plumes du deffus des ailes , noires , bordées de roux , le bord inférieur de l'aile , vers l'eftomac , gris cendré; toutes les grandes plumes du fouet noirârres , le deffous de la queue blanc, marqué d'une tache noire vers l'anus , le deffus de la queue bru.i, les jambes 5c pieds rouges. Les Tourterelles paffent l'été dans nos climats, où elles vivent cle grains dans les plaines tk darls les bleds ; elles fe retirent dans les bois où elles perchent , & font leurs nids dans les fourches des branches d'arbre , à dix ou douze pieds de terre ; leur couvée eft de deux œufs; elles s'en vont après la récolte, cherche! d'autres étés.

The text on this page is estimated to be only 15.79% accurate

TOME CINQUIEME. 417 Vertus., L'oifeau de fléché & mis en poudre , eft aftringent :.Ia clofs eu. d'un demi- gros à un eros. Extérieurement la gtaifle eft émollienre. PLANCHE 686. Corvus , Corbeau. ON fe fert de fon cerveau. Ceft un grand oifeau fauvage , carnacier il a, depuis le bout du bec jufqu'au bout de la queue, deux pieds un pouce de long. L'ins eft de deux couleurs, cendré brune autour de la prunelle , cendré claire enfuite ; les narines recouvertes ' par des foies roides , le bec noir ailifi que tout le corps , jambes Se pieds ; le bas des ailes & la queue ont une teinte de bleu foncé, luifant. Cet oifeau eft rare , même dans les grandes forêts qu'il habite. Ceft pourquoi on fe trompe , en nommant Corbeaux cette quantité d'oifeaux noirs , qui fe répandent dans les plaines dans les bois pendant tout l'hiver. Ceux-ci font de véritables Corneilles noires, faites à peu près comme le Corbeau, mais bien plus petites. Le Corbeau eft très-vorace ; il fe nourrit de toute efpece des chair vive ou morte ; il pond deux œufs. V E R T U S. Le cerveau eft céphahque, nervin, pris intérieurement. Cothurnix , Caille. On fe fert de tout l'oifeau, delagraîfle & fiente. Ceft un allez petit oifeau de partage & de plaine, qui ne. pçrche jamais; il a, depuis le bout du bec Jufqu'au bout delà queue , fept pouces & demi. Les narines rondes, relevées, l'iris couleur de noifette, la poinïne & le ventre d'un blanc jaunâtre, jafpé de brun , la gorge rourteâtre, le deflus de la tête brun, une bande blanche % qui va du bec, entourant l'œil; au derrière du col deux raies brunes, une qui entoure la gorge, l'autre à quelque diftance au-deffous.

The text on this page is estimated to be only 18.50% accurate

•41S ANIMAUX. L'afpecT: général du dos , ailes & queue eft roux brun , bariolé de lignes brunes , en long , vers le dos , de petites lignes blanches en travers , fur le corps de l'aile , brunes fur le fouet. La Caille paife les mers, arrive dans nos contrées au printemps, fait L'amour pendant cette faifon; après quoi elle devient très-grade : à la fin de r Automne, elle repafTe la mer: quelques-unes pondent dans nos pays jufqu'à fept ou huit oeufs. Vertus. Les bouillons de Cailles font émoliients, laxatifs. Laficnu en poudre elt céphalique, à la do fe d'un demi-gros. La graille eft ophtalmique. PLANCHE 687. CuculuS) Coucou. ON fe fert de tout l'oifeau , de fa fiente. C'eft un oifeau de pafTage de moyenne taille , carnacier ; il a un pied de long , depuis le bouc du bec jufqu'au bout de la queue. Le bout du bec noitâtre, les narines rondes Se relevées, l'origine des deux mâchoires jaune, l'iris jaune , ainfi que le tour de l'œil, les jambes & pieds jaunes , deux doigts devant, deux doigts derrière , le col gris cendré , le dos un peu plus brun jufqu'à la queue, qui eft gris noirâtre, terminée par une tache blanche au bout de chaque plume , l'aile gris rouffeâtre , le ventre blanc, jafpé de raies cendrées, imitant les écailles de poiffon p reliées. Il vient au commencement du printemps , & ne chante que dans cette faifon * fon chant imite fon nom, Coucou; il difparoîc à la fin de l'été. Il perche & vit dans les bois, d'infectes, de vers , de chenilles. La femelle ne fait point de nid & ne couve point fes oeufs ; elle ôte de leurs nids , les œufs de plusieurs efpeces de petits oifeaux carnaciers & met le fien en leur place } le petit oifeau le couve & élevé le jeune Coucou qui en fort.

The text on this page is estimated to be only 17.68% accurate

TOME CINQUIEME. 419 Vertus. • Le bouillon de Coucou eft céphalique , adouciffant. La fienre en infufion , à la dofe d'un demi-gros à un gros , eft bonne contre la rage. PLANCHE 688. Cygnus y Cygne. ON fe fert de tout l'oifeau , de fa graille &c peau. C'eft un oifeau aquatique , le plus grand de tous ! on peut l'appeller Cygne privé, attendu qu'il s'en trouve une autre efpece qu'on nomme Cygne fauvage} qui a quelques différences avec celui-ci , qui fe prive fi aifément , qu'il peut palier même pour domeftique ; il a, depuis le bout du becjufquau bourde la queue , quatre pieds & demi de long. 11 eft entièrement blanc comme neige, le bec rouge, les yeux noirs, une tache très-noire tient en triangle l'intervalle entre L'œil &c le bec , une groffeur noire & ronde occupe la cime du bec j elle eft plus grotte au mâle qu'à la femelle , les jambes & pieds font couleur de plomb, l'intervalle des doigts eft remplie par une peau qui lui fert de nageoire. Il nous vient des pays froids -, il vit de grains & d'herbes aquatiques 5 la femelle pond &c couve deux œufs ; les petits qui en proviennent , naident tous gris cendré j ce gris s'éclairrit d'année en année , & ce n'eft qu'à la troifieme qu'ils font totalement blancs. Vertus. Extérieurement un jeune Cygne , cuit dans l'huile, eft adouenfant &C nervin ; la graiffe eft adouciifante , fortifiante ; la peau appliquée eft adouciftante. PLANCHE 689. Gallus > Coq. ON fe fert de tout le coq , de fon cerveau, de la tunique interne , du géiïer , du fiel , d? la graille , ainfi que de celle du Chapon , qui eft un Coq châtré, de la fiente de Poule , qui C c 4

The text on this page is estimated to be only 20.79% accurate

ANIMAUX. eft fa femelle, de fa grailfe & de toutes les parties de fes œufs. Le Coq domeftique eft un oifeau fi connu , que l'eftampe fuffît pour faire connoître fa conformation , fon porc & fa fierté i je dirai feulement que fa crête, la plaque- du tour de fes yeux & fes barbes pendantes , fonc rouges; il s'en trouve, ainfi que des Poules, de toutes couleurs & de plufieurs variétés, comme de hupés à crête doubles , fans queue, &c. Vertus et Usages. Le bouillon de Coq eft apéritif, dcterlîf , un peu laxatif. La gelée eft corroborative ; la dofe eft une o.u deux cuillerées : le cerveau dans du vin , eft allongent : la tunique interne du "éfier en poudre, eft ftomachale , fortifiante, hyftérique : la dofe eft depuis un fcrupule jufqu a demi-gros. Le bouillon de Poule eft humectant, rafraîchi (Tant ; fa fiente aies propriétés de celle de Pigeon, Pl. 685 ; mais plus foibles; la dofe eft demi-gros. La coque des œufs en poudre, eft diurétique : la dofe eft demi gros : le jaune battu dans l'eau chaude, nommé lait de Poule3 eft pectoral : le bouillon, de poulet , nommé eau de poulet^ eft calmant & rafraîchifiant ! le bouillon de Chapon eft reftaurant & fortifiant. Extérieurement les graines font émollientes, anodines; le fiel eft ophtalmique; la fiente de Poule calcinée eft defficative ; le blanc d'oeuf eft rafraîchiflanr , aftringent, agglutinatif; le jaune eft anodin, maturarif, digeftif. \ La tunique interne du géfier de Coq entre dans la Poudre de Hêrifion , la Poudre de Bartholet. La coque d'oeuf entre dans ïe remède contre la pierre de Mademoifelle Srephens, & contre les écrouelles de Rotrou. Le blanc d'oeuf entre dans l'Eau çlumineufe, l'Onguent Album Rhafis. Le jaune d'œufdms l'Onguent contre les hémorrhoïdes. Hirundo , Hirondelle. On fe fert de tout l'oifeau, de fa fiente, de fon nid. C'eft un petit oifeau de palfage, carnacierj il a fept pouces de long , depuis le bout du bec jufqu'au bout de la queue. Le bec petit, noir, large à fon origine, l'iris couleur de noifette , le delFus , les côtés de la tête & tout le tour du col bleu très-foncé, tirant fur le noir, le delfous de la gorge rouge obfcur y tout le deHiis du corps, des ailes & de la queue noirs,

The text on this page is estimated to be only 18.14% accurate

TOME CINQUIEME. 43ï l'eftomac , le ventre 8c le haut de l'envers des ailes blanc , mêlé d'une légère reince de rouge, la queue profondément fourchue , chaque plume de la queue ayant une tache blanche ■ vers fnn extrémité,. L'Hirondelle arrive au commencement du printemps * elle vole rapidement & perpétuellement autour des inaifons & au» deflus des eaux , pour attraper & manger les mouches & autres infectes ailés } elle fait fon nid dans le haut des cheminées j elle s'en va vers la fin de l'Automne. Vertus. L'Hirondelle eft céphalique, incifive, antihyftérique , ophtalmique : la poudre des jeunes Hirondelles fe donne à la dofe d'un gros ; la cendre fe donne depuis demi-gros jufqu'à un gros y la fiente eft très-chaude , acre , incifive , diurétique. Extérieurement le nid d'Hirondelle eft réfolutif. PLANCHE 690. Merula, Merle. ON fe fert de tout l'oifeau & de fa fiente. C'eft un oifeau fauvage des bois, fédentaire , de taille médiocre; il a , depuis la pointe du bec jufqu'au bout de la queue, dix à onze pouces j le mâle eft totalement noir, excepté le bec , qui eft jaune orangé ; le bec de la femelle eft.' noirâtre, & fon plumage eft noir mal teint, tirant fur le brun. Son nid eft peu élevé, dans des broftailies, fur de petirs arbres j la ponte eft de quatre à cinq œufs, bleuâtres , tachetés de brun. Le Merle vit de tout ce qu'il trouve dans le bois, infedes, fruits fauyages. Vertus. Extérieurement l'huile où on a fait cuire cet oifeau eft adonçiflante, réfolutive : fa fiente eft dérerfive. Motacilla , Hoche-queue. On fe fert de tout l'oifeau. C'eft un petit oifeau de pafTage , camacier; fa longueur depuis la pointe du bec jufqu'au bout de la queue, qu'il a fore

The text on this page is estimated to be only 17.23% accurate

4îi ANIMAUX. longue, eft de près de huir ponces de long; fes couleurs ne font que du blanc , du noir & du gris , diftribués comme on Je voie dans l'eftampe. La Hoche-queue revient au printemps & s'en va comme les Hirondelles, parce qu'elle ne vit que des mêmes aliments. Elle ne fe perche point; elle habite les environs des eaux 8c les plaines, fe mêlant patmi les beftiaux, pour attraper des mouches; elle haufle & bailfe perpétuellement la queue; elle fait fon nid près de l'eau , fous des pierres , dans des trous herbus ; elle pond cinq ou fix œufs blancs , tachetés. Vertus. L'oîfeau en poudre eft très -apéritif, depuis- un fcrupule jeifqu'à un gros , dans le vin. PLANCHE 691. Noclua caprimulgus , Frcfaie tête-chevre, Crapaud volant. ON fe ferr, de tout l'oîfeau, de fon fiel & graiffe. C'eft un oifeau de nuit, de paflage , carnacier, habitant les bots, de la grandeur d'un Pigeon; il a, du bouc du bec au bout de la queue, un pied deux pouces de long. Le bec fermé paroît très-petit ; mais quand l'oifeau l'ouvre, il eft fendu jufques bien au delà de l'œil , de façon que d'une extrémité à l'autre, il a de long près d'un pouce & demi; le bout ân bec noir, jufqua la tète; le refte eft caché par une mouftache de plumes blanches ; les yeux noirs , rrès-gros ; le defius de la tête garni d'une bande noire; le dos cendré, brun, marbré de noir, accompagné de longues lignes noires ; les ailes I wUX lUU" ' parfemé de taches roux cIail' > le ™{e a line tache blanche à chaque aile, vers le milieu des grandes plumes; la queue roux brun , rayée en travers de taches noires ; le ventre roux & blanc , garni de taches noires ; les jambes très-courtes, l'ongle du milieu de chaque pied garni du côté intérieur de petites dents en forme de peigne , à peu près comme le Héron , Pl. ai. r r Cet oifeau vient au printemps & difparoîc au commencement de l'automne ; on ne ie voit qu'à l'entrée de la nuit , pendant

The text on this page is estimated to be only 19.54% accurate

TOME CINQUIEME. 43î laquelle il fe nourrit d'infe&es , coquillages , fcarabées. On dit qu'il encre dans les érables où il y a des chèvres, & qu'il fuce leur kit. Vertus. L'oifeau , réduit en poudre , eft fortifiant , nervin , depuis un fcrupule jufqu'à un gros. Extérieurement le fiel eft ophtalmique, la graille eft émolliente, réfolutive* Otis 3 Outarde, On fe fert de fa graifte & fiente. C'eft un grand oifeau de plaines , fédentaîre , gros comme un dindon j il a trois pieds , du bout du bec au bout de la queue. Le bec gris brun , l'iris ifabelle , le col & tout le deflous du corps gris cendré, blanchifTant vers le ventre, le dos, les ailes & le delTus de la queue roux , traverfés de taches longues , noires , les grandes plumes du bas de l'aile , gris brun : quand le mâle, qui efl: deffiné dans l'eftampe, veut fe parer , il enfle Se élevé fes ailes au-deftus de fon dos, les jambes & pieds gris j elle n'a point de doigt de derrière aux pieds. L'Outarde n'habite que les vaftes plaines , où elle vit de grains , d'herbes , de petits animaux , infe&es ; elles fe ralfemblent par bandes pendant l'hiver ; il s'en trouve en Angleterre , en Efpagne , en France, dans le Poitou Se dans la Champagne. Elles font leur nid dans des trous , qu'elles creufent ellesmêmes Se qu'elles recouvrent de paille Se autres brindilles : leuc ponte eft de deux œufs. Vertus. Extérieurement la graille eft anodine , la fiente réfolutive. PLANCHE 692. Parus , groffe Méfange. ON fe fert de tout l'oifeau. C'eft un petit oifeau fauvage, fédentaîre, carnacierî: il a, du bout du bec jufqu'au bout de la queue, environ cin(j pouces de long.

The text on this page is estimated to be only 15.86% accurate

'434 . ANIMAUX. Le bec noirâtre .droit, court , pointu , toute la tete , le cor la gorge le milieu de l'eftomac & du ventre noirs, la tache du ES Tt> ""S l^<> aU * noir du col de chaque Coté mfques daffous 1 œil -, du refte rout le délions du corps ;aune , le dos & les ailes verd brun , une baade en travers vers le haut de l'aile, d'un verd clair. rJÏ 5 ? &,VK linfe.5es & m^e de chair morte; on la trouve dans te, bois & buifTons où elle fait fon nid; elle pond nuit a neuf oeufs, d un blanc cendré , pointillés de rou^e. 17- & VERTUS. Loifeau réduit en poudre, eft céphalique, apéritif, diurétique : la dofe eft depuis un fcrupule jufqu a un gros. P^ifer, Moineau-franc. On fe fert de fa fiente. C eft un petit oifeau fédentaire , qu'on pourrait appeller dome.hque jetant familier dans les villes & villages, autour des mailons ou il fait communément fon féjour; fa Longueur, depuis le bout du bec jufqu'an bout de la queue , eftdeiixpouLe bec eft pointu Se affez gros , noir dans le mâle , brun dans Ja femelle; la tête cendrée brun, (c'eft une de fes plus grandes difterences avec une autre efpece auffi commune, qu'on nomme _des Friquets ; car les mâles de cette efpece ont le deftus de la tete couleur de caffé brûlé,) l'iris couleur de noifette, une iigtie bai brun , qui va du coin du bec aux yeux , le côté du col cendre , une tache noire fous la gorge ; (elle manque â la femelle,) le deffus du corps & les ailes cendre brun, mêlé de roux, une bande blanche eu travers, près du haut de l'aile, les jambes & pieds couleur de chair brune; la femelle a, en général , tout le plumage plus pâle. Il perche ; il fait fon nid dans les arbres , dans les trous de muraille : la ponte eft de quatre ou cinq œufs à la fois ; ils font plufieurs ponces; leurs œufs font cendrés, piquetés de roux. Cet oifeau pullule beaucoup j ils fe répandent , ainfi que les Friquets , par bandes , dans les bleds & autres grains qu'ils dévorent; ils entrent dans les granges & dans les greniers , & ils font fi voraces , qu'ils mangent indifféremment tous les infeétes qu'ils peuvent attraper.

The text on this page is estimated to be only 20.26% accurate

TOME CINQUIÈME. 435 Vertus. La fiente , à la dofe de deux ou trois grains, dans la bouillie , lâche le ventre aux petits enfants. Extérieurement elle eft cofmétique. Pajfer troglodites , Roitelet. On fe fert de tout l'oifeau. C'eft le plus petit oifeau de nos climats; il eft Sédentaire & catnacier ; il a, depuis la pointe du bec jufqu'au bout de la queue, quatre ponces & demi. Le bec noir en deflus, plus pâle en defïbus, une bande blanchâtre, qui venant du bec, pane au delà du deflus des yeuxj la tête, le col, l'aile, tout le defTus du cotps & de la queue, canelle brun \ le tout garni de petites taches un peu plus claires, qui forment des bandes tranfverfales : tout le delïous du corps blanchâtre. Il perche-, il vit de petits infectes, vers, araignées, qu'il trouve dans les bois ; il fait fon nid dans les haies & broflàilles j fa ponte eft de neuf à dix œufs. Vertus. Cet oifeau cuit ou fa poudre, dans le vin blanc, eft diurétique : la dofe eft un Roitelet en poudre. PLANCHE 693. Pavo } Paon. ON fe fert de l'oifeau entier, de fon fiel & fiente. C'eft un grand oifeau domeftique , de la raille d'un Dindon ; il eft d'une grande beauté , par fa figure & par fon plumage. Le mâle a la tète , le col & le haut de la poitrine d'un beau bleu foncé, le ventre plus foncé, tirant fur le violet, le bec blanchâtre, les yeux furmon ces d'une bande blanche, étroite, qui va du bec au derrière de la tête, une autre plus large, pafTe fous les yeux dans le même fens \ huit ou dix tuyaux de plumes, longs de deux ou trois pouces , s'élèvent du fommet de la tête, formant un éventail ou couronne, terminée par des efpeces de bouts de plumes , imitant une petite houppe \ le dos & le deflus de

The text on this page is estimated to be only 16.90% accurate

ANIMAUX, l'aile d'un blanc cendré, femé de taches noires, tranfverfales ' les plumes du bas de l'aile routes, Je croupion verd foncé h queue, encre cinq & fix pieds de long, les jambes & pieds gris Les plumes delà queue fonr étagées, depuis le croupion 7 uf. qu au bouc, & en grand nombre ; mais très -légères ; leurs cocons ionc bancs garnis de deux rangées de barbes, verd changeant en couleur d'airain , affez longues , mais étroites & diftantes l'une de 1 autre, excepte a l'extrémité où elles fe joignent & forment un rond , au milieu duquel eft une tache rouffe , ronde : au mi lieu de celle-ci & plus vers le bas, une autre cache bleue, changeant en verd dans laquelle eft une troifieme tache en cœur renverfe , bleu ronce , quali noir : c'eft cet aflèmblage de taches qu'on appelle œil de Paon. Quand le Paon fait la roue tel qu'on le voit dans l'eftampe, fa queue eft alors dans cour' fou lultrej on la voit brillance & changeante , fuivant les afnecls, oudun beau verd, ou d'une belle couleur de cuivre roi^e La queue du Paon mue à la fin de l'automne & ne revient qu'au printemps fuivant. 1 La couleur de la femelle n'a rien de remarquable; elle a un afpe£fc général , mêlé de gris, de roux & de cendré; une hune & une queue proportionnée à l'oifeau. H perche & vit comme les poules , de grains & de tout ce qu'il rencontre dans la baffe-cour; il eft venu des Indes ; la femelle pond fept à huit œufs, gris clair, piquetés, qu'elle couve. Vertus et Usages. Les bouillons de Paon font diurétiques. La fiente eft cephalique, nervine; en poudre, depuis un fcrupule jufqua un gros, & en lavement depuis demi-once jufqu a une once. Le fil eft ophtalmique. La fiente entre dans le remède de Madame la Comtefle de Waldeck. PLANCHE 694. Perdix cincrea , Perdrix grife. ON fe fert de fon fang & du fiel. C'eft un oifeau fauvaçe de - , , b "vu D'eft un oifeau fauvage des plaines , fédentaire , ne fe perchant jamais ; il a , depuis le bout du bec jufqu'au bouc de la queue , un pied & trois quarts,

The text on this page is estimated to be only 19.31% accurate

TOME C IN QUIEME, '4Î7 Le Bec couleur de corne, l'iris jaunâtre, quelques excroiffances rouges autour des yeux, les côtés de la tête Se le menton jaune roux ; tout le col, le dos Se le ventre cendré, marbré de petites lignes brunes , mêlées fur l'aile Se vers le bas du dos d'une couleur roufte , la queue roufle , à bandes , cendré brun les jambes blanchâtres ; le mâle a fous le ventre quelques taches, roux brun , allez larges , difpofées en fer à cheval. Elle vit en fociété, dans les plaines enfemencées , de graines , «d'herbes , d'infe&es 3 la femelle couve jufqu'à dix-huit œufs. Vertus. Son fang Se fon fiel font ophtalmiques. PLANCHE 695-. Ph.ajian.us> Faifan.ON fe fert de fon fiel & graille. C'eft un allez grand oifeau fauvage des bois , fédentaire 9 il a, depuis le bout du bec jufqu'au bout de la queue, qui eft fort longue, trois pieds de long. Le bec blanchâtre , les narines percées , dans une peau élevée à l'origine du bec*, le mâle a les yeux entourés d'une peau coriace , la tête Se le col d'un bleu foncé , changeant , fuivant Iesafpe£ts, en verd Se en pourpre foncé, le dos eft plus clair, fes plumes, ainfî que celles de l'eftomac Se du ventre, imitent les écailles de poiffon , d'un roux très-vif, bordées d'un bleu pourpre, le deffus de l'aile Se la queue grife, dont les plumes font éragées en defious , longue de dix-huit pouces , les cuiffes & la région de l'anus font tanné brun , les jambes Se pieds gris roux. . La femelle n'a rien de toutes ces belles couleurs; elle eft, en général , d'un gris Se roux mélangés. Ils habitent les bois ; ils perchent-, ils vivent de fruits fauvages & de différents grains , qu'ils vont chercher dans les champs voifins ; ils font leurs nids par terre j la couvée va jufqua quinze œufs. Vertus. La graine eft extérieurement nervine , réfolutive , adoucilïartte : le fiel eft ophtalmique.

The text on this page is estimated to be only 19.89% accurate

ANIMAUX. o PLANCHE 696. Pîca, Pie. lN fe fert de tout Toifeau. _ ' C'eft un oifeau des bois de moyenne grandeur , fauva^ ge, Sédentaire* carnacier; il a, depuis le bec jufqu'au 'bout dl la queue, un pied & demi de long; la queue a au moins Six pouces de long. Le bec noir, les narines recouvertes de foies dures, l'iris noifette pâle , la tête , le col jufqua l'eftomac , les ailes , le deffus du corps Se la queue noirs , le noir du bas des ailes & de la queue eft changeant en violet & verd, une bande lai^e , blanche le long de la première articulation de l'aile, des taches blanches au milieu de chaque plume du fouet de l'aile, lesquelles quand l'aile eft étendue, forment une autre bande tranfverfale on ne voit point ces taches quand elle eft pliée ; le défions du corps blanc, les cuilTes , jambes & pattes noires, les plumes de la queué graduées par deifous. Elle perche; elle vit de chair, non-feulement d'infe£res} mais elle eft oifeau de proie, à l'égard des jeunes oifeaux & autres petits animaux vivants qu'elle peut attraper , comme levrauts , lapereaux & autre gibier : elle mange même les œufs* Enfin tout lui eft bon ; elle fait fon nid à la cime des grands arbres; il eft fort gros : la ponte eft de quatre à hx œufs. Vertus et Usages* La cendre de Pie eft ophtalmique. Elle fait la bafe dè l'Eau de Pie compofée , remède céphalïque qu'on donne, à la dofe, depuis une once jufqua deux. Picus-viridis , Pic-vcrd. On fe fert des os de l'oifeau. C'eft un oifeau des bois de moyenne taille, fauvage, carnacier, Sédentaire ; il a , depuis le bout du bec jufqu'au bout dela queue , un pied un pouce & demi. Le bec eft dur, triangulaire , terminé au bout en pointe coupée , deux couleurs d'iris à l'œil, l'extérieure blanche, l'intérieure roux brun , le deffus de la tête vermillon , femé de petites taches noires, l'œil enfermé dans une plaque noire, en triangle,

The text on this page is estimated to be only 13.27% accurate

* TOME CINQUIEME tmngle q« va jufqu'au bec , fous laquelle eft une bahcfe 1, «mHon , le derrière du col , le dos & 1? defus de^s trd, la gorge, le col la pomme & le ventre verd très-pâle 1 for-î de 1 aile parfemé de taches blanchâtres , le croupion ja une P °1 U deuus de k queue verd brun, rayé de lignes plu ITJ^ travers fourchu chaque tourchon termin An pointe Sa langue cft remarquable; elle eft grofTe comme une ficelé crdinaire, ronde , égale d'un bout A'autte, dure, oiS bec o '/l^r' fr^' lo"g- ^ quatre pouce's ho dt bec^quand loifeau 1 allonge, étant ployée en rond dans fon aIJu detmmls VeVfV qi" ff™verKdans l'intérieur ltftamoT' & " '^^rî 11 fTO CTme °" le voie dan, leltampe, & a coups de bec redoublés , il fait des trous exactement ronds & profonds, pour, en allongeant la langue attraper les vers qui i fe nourrilTent dans le bois : il étend de même fa langue fur les fourmillieres , & la retire remplie de Fourmis La femelle ne fait point de nid ; elle pofe fes œufs au nombre de cinq ou foc, dans des trous d'arbre, fur le bois vermoulu. Vertus. La poudre de fes os eft diurétique, depuis demi-gros jufqu a un gros. PLANCHE Struthio y Autruche* ON fe fert de fa graifle, des œufs, de la peau intérieure de 1 eitomac. C'eft le plus grand de tous les oifeaux. Quand fou col ele levé, fa te ce eft à fept pieds de terre ; le col a trois pieds da long; elle ne peut voler. Le bec de couleur de corne ; la tête , ainfï que le bec, imitent ces parties de l'Oie , c'eit-à-dire , afTez applaties ; l'œil eft orand l'iris couleur de noifetee , la tête & le col n'ont qu'unduvec & quelques poils parfemés ; ce duvet devient plus épais vers ie Dd

The text on this page is estimated to be only 19.74% accurate

440 ANIMAUX. milieu du col ; il continue ainfî jufques aux cuilTes. Ces parties onr un oeil gris roux , le dos &: l'aile font mélangés de plumes grifes, noires ■& blanches, les extrémités des ailes font noires , la queue blanche ; elle n'a point de plumes fous les ailes, ni aux cuiffes, qui tirent fur la couleur de chair ; les jambes font couleur de corne, deux doigts aux pieds , le doigt extérieur fans ongle. Cet oifeau fe trouve en abondance dans les déferts de l'Afrique. La femelle pond des œufs auiTi gros que la tète d'un enfant, d'un blanc jaune; elle les enfonce dans le fable; la feule chaleur du foleil les fait éclorre. L'Autruche eft un oifeau étranger dans nos climats : on en trouve quelques-unes dans les ménageries : celle-ci. a été delfinée dans la ménagerie du Roi; elle avale indifféremment tout ce qu'on lui donne. Vertus. Les coquilles des œufs, en poudre, ont les mêmes vertus que ceux de Poule. Voyez l'explication de la Planche 689. La membrane intérieure de l'eftomac, en poudre , eft ftomachale : la dofe ■eft un gros. Extérieurement la graille eft émolliente. Tardas mlnor 3 Grive, Mauvis, On fe fert de tout l'oifeau. . C'eft un oifeau palfager , au-delTous de la taille médiocre; il a, depuis le bout du bec jufqu'au bout de la queue, neuf pouces de long. Le bec brun , l'iris noifette , le delfus du corps , depuis la tête jufqu'au bout de la queue & le delfus de l'aile roux, le deifous du col & l'eftomac jaunâtres , femés de petites taches brunes en triangle, la pointe en haut, le ventre blanc, les jambes & pieds bruns. Cette Grive ne paroît en bandes que vers l'Automne : on n'en voit plus guère après les vendanges; elles vivent de raiiîn ; quelques-unes cependant relient , vivent dans les bois , de baies de genièvre & autres, & font au printemps d'enfuite leurs nids" dans les broffailles , où elles pondent cinq à fix œufs d'un bleu verdâtre , avec quelques taches noires. Vertus. Le Mauvis , mangé de quelque façon que ce foît, eft céphalîque.

The text on this page is estimated to be only 18.09% accurate

TOMÉ CINQUIEME» m o PLANCHE '698, Vanellus , Vanneau. N fe fert de tout L'oifeau. C'eft un oifeau de moyenne taille, carnacier, Voyagéuf. habitant les lieux aquatiques; il a, depuis le bout du bec uf* qu au bout de la queue , un pied un pouce & demi. Le bec noir, effilé & un peu quatre par ïe bout, la tête «£ la huppe , le col, l'eftomac , le dos & les ailes noires , le tout changeant en vetd foncé j le noir eft interrompu au-deftbus de l'œil par une large tache blanche j tout le ventre , le défions du corps Sçles cuilles blancs , quelques taches d'un blanc roux, à l'origine des grandes plumes de l'aile , les jambes & pieds jaunâtres. On le trouve communément dans les marais & lieux marécageux, où il vit do toutes fortes d'infectes; il ne perche point: ils fe rafiemblenr en grandes bandes l'automne & l'hiver, «S£ vont d'un pays à un autre. La femelle pond dans des touffes d'herbes , quatre ou cinq œufs jaunes, piquetés de taches noires. Vertus. Ileft: antiépileptique, diurétique , en poudre., ou mangé rôti ou bouilli. Upupa , Huppe, Pupue. On fe fert de tout l'oifeau. C'eft un oifeau fauvage , de moyenne taille , carnacier , voya.» geur , habitant les bois & les plaines ; elle a , depuis le bout du bec jufqii'au bout de la queue, un pied & demi-pouce de long. Le bec long de deux pouces & demi , effilé , un peu courbe , une huppe double , fur tout le fommet de la tète d'un jaune roux, chaque plume terminée par une tache noire ; l'oifeau l'abaifle & l'élevé à fa volonté -, tout le cotps , excepté l'aile & jufqu'aux cuifTes, jaune pâle, & blanc depuis les cuilfes jufqu a la queue, le defius de l'aile blanc, marquée ds bandes noires, difpofées, quand l'aile eft pliée, comme on le voit dans l'eftampe jla queue noire a aufli une bande blanche en travers, vers le croupion, Its jambes & pieds gris bleuâtre. La Pupue vit de toutes fortes d'infectes ; elle fait fort nid Ddi

The text on this page is estimated to be only 17.02% accurate

44* ANIMAUX, dans des trous d'arbres creux, où elle pond trois œufs cendrés* elle voyage d étés en étés. ' Vertus. L'oifeau , mangé en fubftance ou en bouillon , eft bon pour la colique. DES QUADRUPEDES. PLANCHE 699* Bos , Taureau , Vache, Veau, Bœuf. ONfe fett du fang, de la gniiffe, moé'He, fiel, cornes, ongles & priape du Taureau 3 de la fiente , urine & lait de la Fâche , des poulmons, pieds , graiffe & moelle du Veau3 de la gnrifTe, moelle, tendons, fiel , "ongles , cornes, pierre de la velïïe du hel , os de la jambe Ôc de la boule inteftinale , nommée égagropile du Bœuf. ^ Le Taureau eft un animal domeftique , à cornes , à quatre pieds fourchus - fa raille ordinaire eft de quatre pieds de haut, les cornes affez pentes, courbées en croiilant , point de dents à la mâchoire fupérietue, les pieds fourchus, ruminant, d'un poil ordinairement fauve ; il ne vir que d'herbes & de grains. La Vache eft la femelle du Taureau ; elle eft plus petice & plus mince; elle a encre les cuiftes , fous le ventre, deux mamelles pendantes , dont chacune a deux mamelons allongés , qui ie nomment les pis. ^ Le Veau eft le petit de la Vache -, elle n'en fait qu'un par portée , qui eft de neuf mois. Le :Bceuf eft un Taureau , auquel on a retranché les tefti■cules. Vertus et Usages. Le fang du Taureau eft aftringent , antihyftérique , à la dofe d'un gros. Le fiel, à la dofe d'un gros, en lavement, eft laxatif; les cornes & ongles , en poudre , four antiépileptiques , à la dofe d un gros ; le priape , en poudre ou rapé , & en décoction à demi-gros, eft aftringenr , vulnéraire. Extérieurement la graine eft émolliente ; la moelle eft forti

The text on this page is estimated to be only 9.79% accurate

_ TOME C ï N O U ï F vt r *». n«vi„e ; le ûng eft £0Uti J« & ^ _ je , i Lit l ^t: z: ° zr e Ea u de ,m„"e-fl™" > fine DeûorJ . I J r ' . Pl,rg«'™ 1 fi Jait eft adoucit bem-reeft adouriflW, peXT'Wif ' k'™«i 1« fil eft adouci/Tant. a"°d"«, fi bornage nouveau & fam «Û.S'ffi Wi*. Lim»î- i 1= P«fi Lit *- rojsr^ a:„£ rat- beurrc f™ La graifle, moelle , fiel , cornes & ondes dh bœuf ont les m? mes vertus que celles du Taureau. Les tendons réduits en poudre, font fébrifuges fudnrifi ques, depuis demi-gros jufqu'd un gros , Vos deTVamt ^" poudre, ^ fortifiant, nervi*, à Ù dofe d'un gros la pierre ou bezoard de lavéficule du fiel, en poudre, el fudoXê apemive alexitatm, depuis fit grains juWâ un CP de 1 ' les. m eftins , eft aftrmgenre depuis deux grains jufqu'a demi- n-os ^Extérieurement la fiente eft anodine^ pierre du fiel eftC PLANCHE 700, Camelus , Chameau, ONfe fert du lait, graiffe, fiag , urine & fiente.. Ceft un grand animal doineftique , des parties Orientales de l'Ane, à quatre pieds fourchus; fon vrai nom eft Dromadaire! il a une bofle au milieu du dos & le Chameau en a deux : ainfi l'a décidé l'Académie des Sciences. Cet animal a cinq pieds & demi de haut, en comptant fa botte; il a la lèvre fupéneure fendue, point de dents en haut, & rumine, comme les Dd i

The text on this page is estimated to be only 19.84% accurate

444 ANIMAUX. bêtes à corne j il a le poil très-long au col & à la bofle; fa couleur eft fauve •, il a cinq durillons ou callohles , une à chaque genou , une à chaque coude , une à chaque cuifle près du venue , une à la poitrine au bas du col ; elles font occafionnées par la manière de ployer les jambes en s'accroupilTanc , foit pour le repofer ou pour fe laitier charger ou ôter fa charge j ils s'accouplent comme les autres quadrupèdes, la femelle étant à genou; elle porte un an un feul petit; les pieds font ronds, charnus , fendus en deux \ chaque doigt terminé par un petit ongle. 11 vit d'herbe , de feuilles d'arbre ; il peut fe palfer de boire pendant pluiïeurs jours. Vertus. Le lait eft apéritif, diurétique. Extérieurement la graifle eft adoucifTante , émolliente, Iefang de mâne; le fiel eft réfolurif; la fiente eft vulnéraire, déterfive. On tiroir autrefois du fel armoniac de fon urine. PLANCHE Canis , Chien. ON fe fert de l'animal entier, de fa graifle , fiente & peau. C'eft un animal domeftique , à quatre pattes ,carnacier, dont il fe trouve quantité d'efpeces, de tailles & de figures différentes. Celle dont il eft queftion ici, eft le chien mâtin ou fauvage, qui a été privé par les hommes déroute antiquité; il a la gueule garnie de quarante fortes dents , la queue relevée en croiflantj les pattes de devant ont cinq doigts, garnies d'ongles j celles de derrière en ont quatre ; il s'en voit à poil court & a poil long; la femelle a ordinairement dix mamelles, quatre a la poitrine, fix au ventre. Les portées ordinaires font de cinq ou fix petits. Il vit de chair cuite ou crue , cafte les os les plus durs , mange du pain Se de tout ce qu'on lui donne. Vertus et Usages. La graifle eft vulnéraire, déterfive, confolidante : h dofe eft depuis un fcrupule jufqu'à un gros. La fiente (qu'on nomme

The text on this page is estimated to be only 17.21% accurate

TOME CINQUIEME. 44S album grecum) eft déterfive, atténuante, réfobrive : la dofe eft depuis demi-icrupule jufqu'à quatre. Extérieurement la graine eit vulnéraire , déterfive ; la fiente eftincifive, pénétranre, réfolutive. On prépare avec de petits chiens entiers, un Baume fortifiant , nervin, rcfoiutif : la peau préparée eft déterfive. La graille entre dans l'Onguent nervin , dans l'Huile de petits chiens, dans l'Onguent Diabotanum. PLANCHE 702. Lupus, Loup. ON fe fert de fa chair, du coeur, du foie, graine, os & boyaux. t C'eft un animal fauvage, à quatre pattes, carnacier • il a deux pieds & demi de haut j il a le front large , les oreilles droites , les yeux luîfàïïts , l'iris rouge , entourée d'un cercle noir , la gueule très-fendue, dix-huit dents à chaque mâchoire; les unes grofies Se fortes, les autres moindres, la queue touffue, longue jusqu'aux jarrets, le col gros & fort, le train de derrière plus mince que celui de devant , quatre doigts , armés d'ongles à chacune des quatre partes , la couleur du poil , compofée & mêlée de gris , de brun tk de fauve. La femelle, nommée Louve j porte neuf femaines jufqu'à fept ou huit Louveteaux. Le Loup habite les bois; cet animal eft très-fort & très-dangereux ; car il attaque &c dévore tous les animaux qu'il peut attraper, fans en excepter l'homme : toute chair lui convienE, foit vivante ou morte. Vertus, La chair , le cœur & le foie en poudre , font céphâlîquëS , fortifiants , depuis un fcrupule jufqu a un gros : la poudre des inteftins ou boyaux, eft adouciffânte , depuis un fcrupule jufqu'à deux : les os pulvérifés font abforbants , vulnéraires, déterlifs. Extérieurement la gfàiffê eft chaude, nervine, ophtalmique. Vulpes y Renard. On fe fert de fa chair , de fa graille 6V de fes poumons. C 'eft un animal des bois , fauvage , à quatre pattes , carnaDd4

The text on this page is estimated to be only 19.05% accurate

44* f i ANIMAUX, eier , de médiocre taille , n'ayant qu'un pied trois pouces de haut , leviez effilé , les oreilles droites , le corps long , la queue tres-roufrue & auffi longue que le corps jufqu au cof : les doigts des pattes, comme au loup ci-deffiis; fa couleur générale eft un roux , mêlé par endroits , de gris, de noir & de blanc : par exemple , l'envers des oreilles eft noir, le col taché de blanc, puis du noir, le ventre blanc, quelquefois mêlé de noir, Sec. Les çfpaces blancs & noirs varient fur cet animal. 11 a une odeur forte & déla^réable. tt vit de toutes fortes de gibier , de volailles , d'infeétes , de fruits. La Renarde porte ordinairement trois on quatre petits • il fe cache fous terre, dans des trous profonds, nommés des terriers. Vertus et Usages. Le poumon du R enard eft béchique, depuis un fcrupule)ufcju'à un gros. & demi ou deux gros. ^ Extérieurement l'Huile de Renard, qui eft une décoclrion de l'animal , dans l'huile d'olive , eft adoucilfante , nervine : la ^ranTe a les mêmes vertus. _ Le Renard entre dans l'Huile de Renard de la Phariru de Paris ; le poumon dans le Looc de poumon de Renard. PLANCHE 703. Capray Chèvre, Bouc, ON fe fert du lait Se de la fiente de la Chèvre Se du fang,' fui£, fiente Se urine du Bouc. C'eft un animal domeftique , à cornes & à quatre pieds fourchus , ruminant , de moyenne taille : la femelle fe nomme Chèvre ; elle a deux pieds & demi de haut- le mâle fe nomme Bouc Se eft communément d'un tiers plus haut que la Chèvre. Les Chèvres varient pour les cornes -y les unes en ont de petites, droites, un peu recourbées en arrière vers, le bout; placeurs ont encore deux efpeces de glandes allongées , pendantes fous le col , près de la rère. Celle dont on voit la figure dans l'eftampe , n'a rien de tout cela. Cette efpece eft eftimée la meilleure. Le Bouc , en général , eft plus grand , plus veiu j les poils

The text on this page is estimated to be only 19.95% accurate

TOME CINQUIEME. 447 plus longs & la barbe plus touffue que fa femelle : à l'égard des couleurs, on en voit de toutes blanches, de noires, rouffes , gnles, &c. en entier ou par places. Ces animaux vivent d'herbes , de feuilles & d'écorce d'arbres. _ tes Chèvres ne portent qu'un Chevreau; leur portée eft de cinq mois. Vertus et Usages de la Chèvre et du Bouc, Le lait de Chèvre eft pectoral , reftauranr; le petit lait de Chèvre eft plus apéritif, diurétique que celui de Vache, Pl. 699. Le fan g de Bouc eft fudorifique, réfolutif, diurétique , hyftéricjue , en poudre , depuis un fcrupule jufqu'à quatre. On le fubftitue au fang de Bouquetin (le Bouquetin eft un Bouc fauvage, reffemblant beaucoup au nôtre, mais plus grand; il habite au milieu des neiges, dans les hautes montagnes qui en font couvertes. Cet animal eft très-rare.) La fiente de Bouc & de Chèvre eft déterfîve, digeftive, réfolutive, apéritive, hyftérique. L 'urine , bue chaude, eft diurétique , hydragogue. Extérieurement la fiente eft déterfîve, le fuif eft difcuJîîf, émollient, réfolutif. PLANCHE 704. Rupicapra , Chamois. ON fe fert de fa graille & du fiel. C'eft un animal montagnard , fauvage , à cornes & pieds fourchus , ruminant , de la grandeur d'une Chèvre, roux par roue le corps, plus clair au ventre ; il a une bande noire qui va des yeux vers le nez ; le mâle & la femelle ont deux cornes noires , dont le bout fe recourbe en arrière y les pieds noirâtres , la queue courte, formant deux boffes. Il habite les hautes montagnes couvertes de neiges , comme celles de Suiffe , les Alpes , Ôcc où il fe nourrit d'herbes, de feuilles , de moufles. Vertus. La graiffe eft béchique , reftaurante. Extérieurement le fiel eft ophtalmique.

The text on this page is estimated to be only 18.48% accurate

> 448 ANIMAUX. Caprea mofc/ii 9 Gazelle* Oq fe fert de fon mufe. C'eft un animât fauvage , étranger , à cornes Se à pieds fourchus , ruminant, très-commun dans coure l'Ali e ; efpece de Chèvre fauvage comme le Chamois , mais plus allongée ; le poil court , de couleur fauve, le ventre & l'eftomac blancs , le dedans des oreilles noir , les yeux grands , le maie & la femelle également cornus, les cornes noires, ondées & rayées en fpirales , la queue afïèz longue. Elle habite les bois des montagnes où elle paît l'herbe. Cet animal a deux poches vers les aines , remplies d'une fubftance grumeleufe & on&ueufe , d'un rouge obfcur , d'une odeur aromatique agréable , d'un gout un peu âcre & amer , qu'on nomme mufe de Gabelle. Vertus et Usages. Le mufe de Gazelle eft chaud, delïicatif, atténuant , difeuffif, cordial, céphalique , alexipharmaque, depuis deux grains jufqu'à fix ou huir. Extérieurement il eft ophtalmique. Il entre quelquefois dans la Confection d'Hyacinthe, les Paftilles odorantes, la Poudre réjouifTante -, fa teinture entre dans l'Eau de mille-fleurs, le Baume apoplectique de Léitour. PLANCHE 7°5Capticerva Orientalis } Chèvre du Bézoard. ON fe fert de fon Bézoard. C'eft une efpece de Chèvre fauvage , tenant beaucoup du Cerf par fa conformation & de la Chèvre par fa barbe & fes cornes ; la couleur du poil eft gris roux. C'eft le mâle qui eft dépeint dans l'eftampe ; la femelle a les cornes beaucoup plus petites. Le delTein en a été fait, tant fur la defeription de Kempfer, que fous les yeux de voyageurs, qui en ont vu dans le pays. Cet animal fe trouve dans les montagnes efearpées de la Perfe; il eft très-fauvage. On trouve le bézoard plus communément dans les mâles qu'aux femelles ; c'eft une efpece de concrétion pierreufe, qui fe forme dans l'eftornac, vers le pilote ; les

The text on this page is estimated to be only 21.02% accurate

TOME CINQUIEME. 44* plus eftimées font les verdâtres ou bleues, rondes, ovales ou cylindriques. Vertus. La réputation de la pierre de Bézoard efl: plus confidérable que fes venus, parce qu'elle efl: fi facile à contrefaire, qu'on efl rarement fur d'en avoir de véritable ; & comme on lui attribue d être fudorifique , cordiale, alexitaire, nervine & vermifuge, on a plus furement toutes les préparations de corne de Cerf, la Confection d'Hyacinthe, cVc. qui font les mêmes effets. PLANCHE 7°6Cajlor Canadenjis , Caftor. ON fe fert du Caftoreum , de la graiffe. C'eft un animal fauvage, étranger, amphibie , à quatre pattes , de médiocre taille \ il a trois pieds & demi de long , du bout du mufeau au bout de la queue , qui a onze pouces de long j il a à chaque mâchoire , quatre incifives fortes & huit molaires, cinq doigts à chaque pied, ceux de devant fans nageoires, ceux de derrière font garnis d'une peau ou nageoire, qui vajufquaux ongles, la queue plate, hôrifontale , large, faite en palette , renflée fur les côtés , couverte deffus & deffous par de petites écailles d'un gris ardoifé, brun ; tout le poil un peu long, couleur brun minime; il a deux poches aux côtés de l'os pubis , qui contiennent une liqueur , nommée Caftoreum. La femelle a quatre rétines ; fa portée efl: de quatre petits. Us font très-communs au Canada & pays circonvoifins ; on en trouve quelques-uns en Europe. Les Caftors fe nourriffent de feuilles , fruits, écorees d'arbres , poiffons , écreviffes ; ils fe bâtiffent des logements dans l'eau même , dans lefquels ils fe retirent. V oici comme ils s'y prennent j ils choififlent un canton plat, abondant en vivres, c'eft-a-dire , en arbres, où il paffe quelque petite rivière ; ils la barrent par une digue, pour que l'eau s'élève à une hauteur permanente, quils confervenc, au moyen de plufieurs trop-pleins qu'ils y ménagent. Cette dicrue eft de bois , qu'ils ont coupé avec leurs dents & qu'ils ont aflemblés debout, & près à près liés & entretenus

The text on this page is estimated to be only 13.94% accurate

4*° , t ANIMAUX. dans leurs places par des branches entrelacées. Ils bouchent avec de la gWe, les jours qui s'y trouvent. Cette chauffée™ en diftunuant d'épaiffeur , à mefure qu'elle s'élève. Tou leurs outils, pour ce travail & les fuivants\ font leurs dents pou couper le bois & leurs queues pour maçonner & crépir. Tour, leur ouvrage eft ordinairement fini au mois de Septembre o étant donc fait un petit lac ils fongent à y conduire leurs habitations, par la même mechanique j ils s'afleœblent alors par locietes plus ou moins nombreufes , auxquelles ils proportionnent leurs maifons. Les fondations font dans l'eau, fur vin pilotis plein , pies du bord du lac • elles font rondes ou ovales, couvertes en calottes, crépies en dehors & en dedans; iî s en trouve a deux & trois étages , précaution qu'ils prennent en cas que les eaux baiffent j alors ils defcendenr, pour être toujours au plus près de l'eau. vi£f haJbkaLdons 9u'iIs fe étirent , y font leurs protons d ecorces d arbres, forcent pour fe baigner, vont fur terre chercher des écorces fraîches , y fonr l'amour ; le- tout par des ouvertures qu'ils ont placées â leur bienféance, pour toutes lemps aml1 qU'Us paffenC 1>hiver & les mauvais Vertus et Usages. r,t ^^TJ^, une fubfta»ce brune, affez molle, d'une odeur force & fende , d'un gout amer , répugnant ; il elt échauffant, defficatif, fortifiant, incifff, réfolutif, antihyfrérique : la ûoie en poudre eft depuis dix grains jufqu'i demi-ams. intérieurement la graiffe qui fe trouve dans deux poches, limées aiudelfous de celles qui renferment le Caftoreum , eft pénétrante, émolliente. fe Caftoreum entre dans l'Eau générale, épileptique s hyftenque le Philonium Romain , les deux Thériaques , le Mitundat , les Pilules de Cynogloffe , fétides , hyftériques.

The text on this page is estimated to be only 19.85% accurate

TOME CINQUIEME. 4fi PLANCHE 707. CerviiS) Cerf. ON fe fert de fes cornes, de l'os, du cœur, du prkpe : fang, moelle, graitfe, peau. * C'eft un animal fauvage, à cornes, à pieds fourchas , ruminant, de moyenne taille; il a quatre pieds de haut, du dos à terre; le col long; il a fous le coin intérieur de chaque œil, une cavité allez longue; fes cornes, garnies de plus ou moins de cornichons, vont jufqu'à trois pieds de long; fa femelle, nommée Biche, n'a jamais de cornes; leur couleur générale eft fauve , c 'eft-. à- dire , roux tirant fur le jaune. Les cornes du Cerf tombent tous les ans, à la fin de l'automne, & fe reproduifent petit à petit, d'abord molles-elles durçiflent en croifTant , & enfin fe trouvent patfaices vers' la fin de l'été fuivant. Le Cerf fe tient dans les grandes forêts , où il vit d'herbes & de fruits. La Biche ne porte qu'un petit , qu'on nomme Faon de Çerf, Vertus et Usages. Toutes les parties du Cerf fuivantes, font diaphoniques alexipharmaques :favoir, la rapure de corne de Cerf3 depuis un fcrupule jufqu'à un gros & demi; la gelée de corne de Cerf, depuis demi-once jufqu'à fix gros ; Vos du cœur en poudre , demigros ; le pénis en poudre , depuis demi-gros jufqu'à un gros j le fang en poudre, depuis demi-fcrupule jufqu a un gros ; la moelle récente un gros. Extérieurement la grahTe eft émoliiente, nervine, réfolutive; la peau eft adouciflante. La corne de Cerf crue entre dans la Poudre antifpafmodique , le Margarhum frigidum. La rapure dans la décoction aftringente, l'Opiate de Salomon. La rapure , philofophïquement préparée^ dans la Confection d'Hyacinthe, la Poudre de patres d'Ecreviflès , pectorale , la décoction blanche. L'Efprk & le Sel volatil de corne de Cerf, dans la liqueur de corne de Cerf diftiliée.

The text on this page is estimated to be only 18.85% accurate

45* ANIMAUX. PLANCHE 708. Cervus tangifer , Renne. ON fe fert des mêmes parties du précédent. Cet animal eft une efpece de Cerf étranger j pîus grand & plus étoffé que le précédent; le poil plus brun : les cornes ont été deffmées d'après nature. La femelle a 3es cornes comme le mâle , mais plus pentes ; elles tombent & renaiffent tous les ans comme aux Cerfs. Ce Renne eft affecté aux pays les plus froids , vers le Pôle arctique; il fe trouve en Suéde, en Laponie, en Norwege-, en Canada où on le nomme Caribou. Il eft naturellement fauvage; mais les peuples de ces pays, fur-tout les Lapons , ont trouvé le moyen de le priver & d'en faire des troupeaux. Ce feul animal les nourrit de fa chair & de fon lait , les habille de fa peau &c les voiture , attelé à un traîneau. Il vit d'herbe & de moufle ; la femelle ne porte qu'un petitVertus. Les propriétés du Renne font les mêmes , mais plus foibles que celles du Cerf ci-deffus. PLANCHE 709* Alce y Elan. ON fe fert de fes cornes & de l'ongle de ton pied. C'eft un animal fauvnge, à cornes , une efpece de Cerf étranger, mais grand comme un cheval de moyenne taille : les cornes ont été faites ici d'après nature -, il a le poil long Se roux brun, les oreilles longues, la lèvre fupérieure plus longue que l'inférieure ; il n'y a que le mâle qui porte des cornes , lesquelles tombent tous les ans 2c renaiffent comme au Cerf ci* devant. 11 fe trouve dans les pays froids, principalement en Mofcovie , en Pruffe , en Canada , où cul le nomme Qrignac. 11 yie

The text on this page is estimated to be only 18.46% accurate

TOME CINQUIEME. 4ÎJ d'herbes , de feuilles , de moufle Se d'écorces d'arbres • k femelle ne fait qu'un petit. Vertus. Les cornes, en poudre, font céphaliques, antiépileptiques ; depuis un fcrupule jufqu a un gros. L'ongle du pied a les mêmes vertus , à la même dofe. II entre dans la Poudre de Guttete, antifpafmodique. o PLANCHE 710. Erinaceus , HérifTon. I N fe fert de tout l'animal. C'eft un petit animal fauvage, a quatre pattes , qui n'a guère qu'un demi pied de long; il a les yeux dans un petit enfoncement , le mufeau allongé , point de queue , tout le corps (excepté le ventre) garni, au heu de poils , d'épines ou piquants, longs d'un pouce Se plus; le tout imitant l'enveloppe des Châtaignes, PL 204, de couleur brune, mêlée de blanchâtre * il a à chaque pied cinq doigts, armés d'ongles; la tête Se tout le deflbus du corps font cou verts de poils fins , de la même couleur. Quand il a peur, il fe met en boule, cachant fa tête & fes pieds fous fon ventre; alors il ne préfente pins que fes pointes qui le garantiflent d'être faifi par aucun animal. 11 habite les bois & broflailles & fe retire fous terre , dans des trous, entre des pierres, Sec. dont il ne fort guère que la nuit ; il vit de racines, d'herbes, de baies Se fruirs ; il dort ou refte engourdi dans fa retraite pendant l'hiver : la femelle porte quatre ou cinq petits. Vertus. Le Hériflbn calciné Se mis en poudre , eft bon contre la difuïie , à la dofe d'un gros. 4*

The text on this page is estimated to be only 19.96% accurate

454 PLANCHE 7I.I. Elephas , Eléphant. ON fe fert de fes dents , qu'on nomme ivoire-. C'eft le plus grand de cous les quadrupèdes , étranger $ à pieds pleins, fans corne; il eft de huit à dix pieds de haut, naturellement fauvage ; mais on le prive aifément , & on en fait un animal domeftique. il eft fort maffif & grcfliérement formé ; la tête grolTe , les yeux très-petits, le mufeau fupérieur s'allongeanr en un canal creux, rond, compofé de quantité d'anneaux mobiles & alfez long, pour toucher à terre fans que l'animal baiQe la tête, le bout plat, percé de deux trous ou narines-, on le nomme la trompe \ c'eft le conduit de la refpiration. Avec cet infiniment , il afpire l'eau pour boire ; il porte l'herbe ou autre nourriture par-detïous à fa bouche , & en fait tout ce qu'il veut ; il a quatre dents à la mâchoire fupérieure & deux autres dents ou défenfes, grottes & très-longues, qui fortent en dehors, une de chaque côté de l'origine de la trompe , qu'on nomme ivoire. La mâchoire inférieure fe rermine en pointe -, elle a quatre dents , de grandes oreilles balantes , les pieds tout ronds , fans diftiniftion apparente de doigts; fa couleur générale eft le gris \ elle eft très- rarement blanche, la peau fans poil, grenée, ridée Se comme gerfée, quelques longs poils cà & là, la queue aftez longue. On le trouve aux pays chauds de l'Afie & de l'Afrique.; il vit d'herbes, de branches d'arbres, de fruits, des grains femés , du Tabac, &c. La femelle ne fait qu'un petit. Vertus et Usages. L'ivoire rapé a à peu près les vertus de la cotne de Cerf: la dofe en poudre , eft depuis un fcrupule jufqu'à deux ; en infufion, depuis demi-once jufqu'à une once. La rapure d'ivoire entre dans la décoétion aftringente, la Confection d'Hyacinthe, la Poudre d'Hali, le Diamargaritum frigidum3 aftringente contre l'avorteraient, les Trochifques de Gordon. Le fyode ou ivoire calciné entre dans la Poudre Diarrhodon

The text on this page is estimated to be only 10.80% accurate

TO MF CINQUIEME. 4Î, ?" VtnT Sant^x,%Ie L^fec, les Trocrufques de Garni phre, l'EIeduaire Pfyllium. ^ PLANCHE 711. Equus 3 Cheval. Omdîe^ ^ teftkules^ er§ots> ««««te & du lait de fi C'éft un animal domeftique, à pieds pleins, trop connu pour en exiger 10 la déferions la femelle fe nomJC ou .W.t ; le petit maie s'appelle Poulain i la femelle /Wfc ovx Poukre • elle porte onze mois & quelques jours Le cheyaU une fingularité par rapport à tous les animaux connus ; c eft fes crins, le long du col & à la queue. Vertus. Les tefticules pulvérifés font hyrtériques, depuis deux Scrupules jafaua un gros. Les ergots des pieds & dPes Ta poudre, font «phaliques, hyftériques, diurétique/, depuis Un fcrupule jufqu'à un gros. La fiente eft fudorifique, r éColan e 1 ladofede deux ou trois crottins, en infofion , dans le vin blanc! Extérieurement a fiente eft adouciffante, calmante. Le lait de Cavalle eft béchique. PLANCHE 713. Afmus 3 Ane. O^afô&St deIafenM' J^-s C eft un animal domeftique, de moyenne raille, lequel, quoique conftruit à peu près comme le cheval, lui eft cependant bien inférieur par la figure. cependant Les différences font qu'il eft plus plat & moins étoffé, qu'il J les oreilles longues, h ganache ou^ mâchoire inférieure % baffe , le col plus mince , garni au lieu de crins , de poils droits & affez fermes , le garrot bas & à l'uni du dos , le dos voûté h croupe ferrée, courte & avalée, la oUeue bien moins garnie, iceil morne. * 6 *

The text on this page is estimated to be only 19.13% accurate

The text on this page is estimated to be only 16.84% accurate

TOME CINQUIEME. 45? PLANCHE 714. F 'élis , Chat. jjtf^VN fe ferr de l'animal entier , de fa graille. V.T Çeft un petit animal domeftique, à quatre pattes, carnacier ; il eft trop connu pour avoir befoin d'une defcriptiort; On dira feulement qu'il s'en trouve de toutes couleurs, foii pleines, foit variées. Il a les yeux immobiles $ fa prunelle fe ferme jufqu'à né paroître au grand jour qu'une ligne noire , & s'arrondit à mefurë que le jour baille ou qu'il eft dans un lieu obfcur ; la nuit fes ■•'yeux paroitïent luifants ; il eft fort fouple & agile, & fore adroit à arrraper des fouris , des oifeaux , des lézards j &c. dont , il fe nattait. La Chatte porte jufqu'à hx petits; Vertus. Extérieurement un Chat vivant, fendu par le dos , appliqué tout chaud fut le côté dans la pleurcfie, l'y biffant huit ou dix heures , eft difeuffif , réfolutif. La graiffe eft émolliente , pénétrante , réfolutive. PLANCHE 71 Cynos 3 Hippopotame. ON fe fert de fes dents; C'eft un gros & grand animal, amphibie j étranger, à quatre pattes; il a fix pieds & demi de haut, ik treize pieds de long, depuis la tète jufqu'à la queue. 11 a la tête très-grofte , le mufeau large , les oreilles courtes , fîx dents de devant à la mâchoire lupérieure & huit dents molaires de chaque côté, autant à la mâchoire inférieure, dont les deux dernières de devant s'élèvent en dehors comme les défenfes du Sanglier, Pl. 718. Elles feint triangulaires & très dures 5 le col forr court, tout le corps couvert d'une peau très épaiile j dure, fans poil, noirâtre, la queue très-courre , avec quelques poils parfemés , les jambes mafîîves,- terminées par de grolîes patteà à quatre doigts, courts , garnis de gros ongles noirs. , Ee i

The text on this page is estimated to be only 17.99% accurate

45§ -À N I M A U X. On le trouve en Afrique ; il habite les grands fleuves de cette 'partie du monde , comme le Nil , le Niger , la Gambra ; il fe tient dans l'eau & fur terre ; il vit de poitfon, d'herbe &C de grains ; il fe retire dans les rofeaux. Vertus. Ses deux dents ou défenfes , fervent à faire de fauffes dents. PLANCHE 7l6. Léo , Lion. ON fe fert de fon cœur , du fang Se graifle. C'eft un animal à quatre pattes , étranger , fauvage , carnacier., de moyenne grandeur ; il a quatre pieds de haut. La tête très-grotte & quarrée , les yeux clairs & luifants , les oreilles rondes & courtes , quatorze dents à chaque mâchoire , la langue hériffee de pointes ; tout le col du mâle eft garni de très-longs poils, qui le cachent en entier & s étendent fur les épaules ik au poitrail, La femelle, nommée Lionne^ manque absolument de cette parure; les jambes 8c pattes groftes , la queue très-longue & greffe à fon origine, allant en diminuant, & terminée par une houppe de poils ; la couleur générale fauve jaunâtre,. le poil afTez court; la femelle fait plufieurs petits, nommes Lionceaux. Il habite les bois & les cavernes qui s'y trouvent , dans les pays chauds de l'Afrique & de l'Afie; il eft très-fort & trèsléger , carnacier de vorace , ne vivant que des animaux qu'il mec à more : Vertus. Le cœur en poudre , eft céphalique , fébrifuge , depuis douze grains jufqua deux fcrupules. Le fang eft fudorifiqae, alexitaire, depuis douze grains jufqu'à un gros. Extérieurement la graille eft chaude & pénétrante , émoîliente, anodins.

The text on this page is estimated to be only 17.46% accurate

TOME CINQUIEME. 459 PLANCHE 717. Lepus , Lièvre. ON fe fér't de fon cœur, foie, poumons , fang, reins, tet ticules, fiel, poil, graiffe, préfure, talon. C'eft un animal fauvage , à quatre pattes , de médiocre taille. Il a les oreilles longues , les yeux gros , la lèvre fupérieure. fendue, deux dents de devant à chaque mâchoire, le corps allongé, la queue courte, velue & relevée , les jambes de derrière & les cuiires, bien plus longues que celles de devant, cinq doigts au pied de devant, quatre à ceux de derrière, le délions des pieds velu, la couleur de tout le corps rouiïe, le ventre & le dehors de la queue blancs. 11 habite les plaines où il fe nourrit d'herbes 5 il court trèsvite Ôc long-temps. La femelle ^ nommée A[e3 fait quatre ou cinq petits, nommés Levreaux. Vertus. Le cœur, le foie, les poumons, le fang pulvérifés, font un remède, aftiingent, céphalique, diurétique, hyftérique, à la dofe- d'un ferupnle jufqu'à un gros. Les reins & tcfikuks en poudre, font diurétiques à la même dofe. Le poil calciné, eft diurétique, depuis douze grains jufqu'à demi-gros. La préfure ou matière caféeufe du fond de l'eftomac, eft céphalique, alexitaire, depuis demi-gros jufqu'à un gros. Le talon ou aftragale , eft céphalique, adouciflant , depuis vingt grains jufqu'à deux ferupules. Extérieurement le fiel eft ophtalmique ; la gtahTe eft matitlative. Cumculus y Lapin.. On fe fert de fa graille, C'eft un animal fauvage , à quatre pattes, reflemblant beaucoup au Lièvre ci-dellus , mais bien plus petit & plus ramafte ; le raufeau fendu , les pieds velus, &c. Son poil, en général , eft gris cendré , le ventre & la queue blancs.. Il habite les jeunes bois & brolîailles , où il vit d'herbes y il fe Ee }

The text on this page is estimated to be only 21.95% accurate

4^ A N I M A U X. fait des trous en terre , en forme de conduits profonds , qui ont plulieu ^ iffaëS , dans lefquels il fe retire le jour & pendant l'hiyer. O rf nomme ces trous des terriers. La femelle, qu'on nomme Aze, comme la précédente, fait par portée dix à onze petits , nommés Lapereaux , dans un trou long comme le bras , qu'elle creufe à l'écart , qu'elle recouvre de terre chaque fois qu'elle en fort. Ce nid fe nomme une Raèouil/ere, flot a, Une autre efpece plus grofle & qui ne fait point de terriers , eft Revenue animal domcOicjiK-; ils'cn trouve de toutes couleurs , blancs , noirs , pux, &c. On les nomme Lapins de cjapierj on ks nourrit d'herbe, dans. £es chambres, dans des tonneaux. Vertus. Extérieurement la graille eft nervine , réfolurive. PLANCHE 7l8, Lutra i Loutre. fe fert du foie , des tefticules, de la graillé. C'eft un animal amphibie , à quatre pattes , carnacier de poilïbn, de médiocre taille ^ fa longueur, depuis le bout du nez jufqu'au bout de la queue , eft de trois pieds deux pouces. L'eftampe marque exactement fa conformation : le dellus de la tète , du col & tout te corps , eft couleur de marron , tout le deffous eft blanc , mêlé de la même teinte , la queue naturellement recourbée en bas , les quatre pattes à cinq doigts , garnis de nageoires. La Loutre habite les rivières & les . étangs ; elle eft plus fouvent dans l'eau que fur terre ; elle ne vit que de poilfons ; elle fe retire dans des trous, à fleur d'eau , fous des racines d'arbres, quelquefois loin de l'eau, dans des terriers. La femelle fait quatre ou cinq petits. Vertus,, Le foie, en poudre, eft aftringent , depuis un fcrupule jufgu'à un gros. Les tefticules font antiépilep tiques , inférieurs cependant au

The text on this page is estimated to be only 18.43% accurate

TOME CINQUIEME. 46x Caftoreum, Pl. 706: la dofe eft depuis un fcrupule jufqua un gros. Extérieurement la graille , qui refte toujours fluide, eft réfoiutive, digeftive. Manau, Larnentîn. On fe fert des quatre pierres de fa tète & de fa graine. Cet animal eft plutôt un bipède qu'un quadrupède , & plutôt un poiffbn de mer étranger , qu'un amphibie : aulïi tout ce qu'il peut faire eft de traîner fon devant hors de l'eau, pour prendre quelque herbe au bord j il s'en trouve de quinze à feize pieds de long. C'eft une mafle quan informe , comme on le voie dans l'eframpe -, deux très-petits yeux, deux petits trous d'oreilles , deux autres aux narines , deux groins & courtes jambes : on ne distingue les pieds que par de petits bouts d'ongles, qui paroiifent en dehors* la queue large, épaiffe, horifontale; tout le corps recouvert par une peau brune, épailfe & dure, avec quelques poils çà & là. La femelle a une mamelle fous chaque bras, dont elle embralfe fes deux petits, qu'elle allaite & porte par- tout avec elle. On le trouve en mer, vers les embouchures des grands fleuves d'Afrique & d'Amérique , entre les Tropiques. Vertus. Les quatre pierres qu'on trouve dans fa tête, font fébrifuges, diurériques, depuis douze grains jufqu a un fcrupule. Extérieurement la eraifle eft émolliente. PLANCHE 719. Mânes, Fouine. f~\ N fe fert de fa chair , fiente & fiel. C'eft un animal fauvage , à quatre pattes, carnacîer, aflez petit , mais fort allongé , qui mefuré du bout du mufeau jufqu'à l'origine de la queue eft d'un pied cinq pouces, de la queue a un pied de long. Elle a le nez allongé , les yeux é tin celants la nuit comme

The text on this page is estimated to be only 18.93% accurate

4oules , fouris , œufs ; elle fe cache de jour & ne va que la nuit : a femelle faiï cinq à Cu petits. Vertus. Extérieurement la chair bouillie dans l'huile, eft anodine, réfolutive, nervinej la fiente eft réfolutive, émolliente; le fiel eft ophtalmique. PLANCHE 720. Mêles , Blereau. ON fe fert de fa graiffe Se de fon fang. C'eft un animal fauvage, à quacre pattes, carnacîer j il a trois pieds & pins , du bout du nez au bout de la queue. On voit dans l'eftampe , la configuration d'un Blereau à nez retroulfé & couleur de chair pâle , qu'on nomme Porchain , parce qu'il rappelle l'idée d'un Porc, y en ayant une variété à nez droit, nommé Chenin , c'eft-à-dire , à nez de chien. Ces deux erpeces fe relfemblent parfaitement d'ailleuts à quelques petites différences près dans les couleurs du poil, plus brunes ou plus claires. Il a les oreilles courtes, rondes, les yeux affez petits, la mâchoire inférieure reculée , les pieds de devant armés de cinq ongles, longs & forts, les ongles de ceux de derrière courts Se minces , les jambes courtes. Une bande blanche , égale, defeend en droite ligne par le milieu de la tête, du front au nez. On voit dans la figure , la difpofîtion des autres taches noites Se blanches , de la tête &c du col : le ventre eft noir , le refte du corps eft gris , mêlé de roux} il a au-delTous de la queue , au-deflus de l'anus, une efpece d'en

The text on this page is estimated to be only 20.66% accurate

TOME CINQUIEME, 4^ foncement , terminé par deux groGTes rides tranfverfales , qui eft abreuvé d'une matière blanche, eabécille. Il habite dans des terriers profonds , qu'il creufe lui-même dans les bois, où il fe retire pendant le jour; il vit de toute chair , (bit vivante ou morte, & de fruits. La femelle fait trois ou quatre petits. Vertus. Le fang , en poudre , eft diaphonique , déterfif , depuis un fcrupule jufqu'à un gros. Extérieurement la graifle eft émolliente, chaude, pénétrante. Animal Zibetti } Civette. On fe fert de fa liqueur onctueufe, C eft un affez périt animal , à quatre pattes , fauvage , étranger, carnacierj elle a, du bout du mufeau à l'origine de la queue, deux pieds cinq pouces 3 la queue longue & touffue, les jambes courtes. Elle a la tête écroite , le mufeau allongé , les oreilles tirant fur celles du chat , noires en dehors , blanches en dedans j le poil long par-tout, excepté à la tête & aux pieds -, les quatre pieds noirs , le nez noir, une grande tache noire au-delïbus des yeux, qui les enferme, le deltas de la tête gris, le refte blanc; voyez l'eftampe , pour les autres taches & bandes noires. La poche , qui contient la matière huileufe , épaiiïe , odorante, agréable , qu'on nomme atiffi la Civette^ eft fituée au-delïbus de l'anus , foit du mâle , foit de la femelle. Cette poche a une fente en long , par laquelle cette liqueur peut fortir. On trouve cet animal dans les bois des climats les plus chauds de l'Afie Se de l'Afrique, où il vit de chaffe, étant fort agile. Usages. La Civette , c'eft-à-dire , la liqueur dont on vient de parler , entre dans la Poudre de Chypre , le Baume apoplectique , les Paftilles odorantes de la Pharm. de Paris.

The text on this page is estimated to be only 15.09% accurate

4<>4 ANIMAUX. PLANCHE 72Î. Mus mznor, Souris. f~\ N fe ferr de l'animal entier , de fon fang & fiente C efl un des plus petits animaux à quatre pattes de nos climats ; elle a deux pouces Se demi ou environ , dû bout dn neà a longue de la queue, qui eft auffi longue ; elle eft toute gril cendrée, quatre doigts aux pieds de devant, cinq aux pieds de derrière ; eUe peut pafler pour domeftique; car elle habite £ maifons ou elle pullule beaucoup, & yVde tout ce qu'elle rencontre , fans diftinclion. 1 Le chat eft fon ennemi, en quoi il nous eft le plus néceffaire. Mus major y Rat. On fe fert des mêmes parties du précédent. Ce quadrupède eft en tout conforme à la Souris , foit par rapport aux lieux qu'il habite, foit par fa nourriture. Les différences font fa grandeur, qui eft plus confidérable; car il a, depuis le bout du nez jufqu a l'origine de la queue , environ iept pouces de long; la queue eft auffi plus longue que le corps, ians poil & compofée d'anneaux , au nombre de plus de cent cinquante; le poil aflez long , gris brun. Vertus de la Souris et du Rat. (Elles font les mêmes : la fiente en poudre, eft purgative, diurétique , depuis douze grains jufqu a un gros. Extérieurement l'animal réduit en cendres, eft deterfif- le fang eft difeuffif, réfolutif; les crottes de Rat font déterfives. PLANCHE 722. Mus alpinus Marmotte. N fe ferr de fa graifle. C'eft un aflez petit animal , à quatre pattes , fauvage ; il a, du bout du nez au bout de la queue, un pied neuf pouces o de long.

The text on this page is estimated to be only 20.78% accurate

TOME CINQUIEME. ^ La tête, imitant celle du Lièvre, n'a comme lui que quatre dents devant , de gros yeux ; mais les oreilles courtes & un peu; arrondies, le corps gros & ramafTé, les jambes très-courtes, la queue courte & plate , cinq doigts à chaque pied , les ondes de ceux de derrière bien p'us longs que ceux de devant, tour le corps gris roux, plus clair fous le ventre; elle broute l'herbe comme !e Lièvre , mange auffi des fruits fauvages ; elle grimpe aifément fur les rochers ; à l'approche de l'hiver elles s'enfoncenc comme le Lapin, dans des terriers , qu'elles bouchent enfuite % «lies y dorment tout l'hiver , & ne fe réveillent qu'au printemps. On ne les trouve que fur les hautes montagnes, en Suilïe , dans les Alpes. Vertus. Extérieurement la graille eft émolliente. PLANCHE 723. Ovis , Bélier, Brebis, Agneau, Mouton. ON fe fert du fiel , du fuif , de la moelle du Bélier; de la graifle , laine & fiente de la Brebis; des poumons , caillette & peau de L'Agneau; de la tête , laine, fuif & fiente du Mouton. C'eft un animal domeftique , à cornes & à pieds fourchus, ruminant; il eft de la taille d'une Chèvre ordinaire, Pl. 703; mais il s'en trouve de très-grands, en comparaifon d'autres ; le tout fuivant les pays dont ils font originaires. L'animal , en général , a le corps couvert , excepté la tête & les jambes, d'une efpece de duvet , long, compofé de filaments minces , flexibles , très-ferrés l'un contre l'autre , qui fe confondent 8c fe tortillent en flocons : c'eft ce que l'on nomme laine. La tête & les jambes onr un poil fi raz, qu'ils femblent quafi nuds. Le Bélier eft le mâle ; il s'en trouve qui n'ont point de cornes : la Brebis eft la femelle ; il s'en trouve qui ont de petites cornes : l'Agneau eft le petit : le Mouton eft le Bélier châtré ; la couleur eft ordinairement blanche; quelques-uns font jaunâtres , d'autres noirs ou de couleurs mêlées. La Brebis ne fait qu'un Agneau par portée. Cet animal ne vit que d'herbes,

The text on this page is estimated to be only 19.44% accurate

"A™ ANIMAUX. Vertus et Usages. La fiente A Brebis ou de Moutons,, eft difcuflïve, apéritive ~ depuis deux fcrtipules Jufqu'4 un gros. Les bouillons de pournon d' Agneau, font béchiques, adouciffants ; la caillette eft alexi taire» Extérieurement le fiel de Bélier appliqué , lâche le ventre; le luif & la moelle de Bélier ou le fuîf de Mouton font émollients anodins; la graifle de Brebis eft émolliente , anodine; lœfipe* qui eft la grailfe tirée par ébullition de la laine qui eft à la gorge* & entre les cuilfes de la Brebis ou du Mouton^ eft émoluentè anodine ; la laine grafle de ces parties a les mêmes vertus ; la peau fraîche de l'Agneau eft anodine, réfolutive; le bouillon de la tête de Mouton eft onctueux & pénétrant. Le fiel du Bélier entre dans l'Onguent de la Mère, l'Emplâtre de Minium , la toile à Gautier. PLANCHE 724. Phoca s Veau marin. ON fe fert de fa graifle. C'eft un animal à quatre pattes, amphibie, de mer; étranger ; il a , depuis le bouc du mufeau jufqu'au bout des pattes de derrière, deux pieds quatre pouces. Il a le nez camus, l'œil très-vif; fon oreille ne repréfente qu'une fente encroiflant ; le corps eft large à la poitrine , & va toujours en diminuant jufqn'aux jambes de derrière; la queue eft courte & en pointe , les deux jambes de devant courtes , terminées par quatre doigts , garnies de nageoires , les jambes de derrière , qui font jettées en arrière , ont l'air de queues de poiffon; elles font terminées par fix doigts ou arrêtes, joints par des nageoires. Tout l'animal eft couvert d'un poil court & roide , gris , mêlé de petites taches noirâtres ; le ventre plus clair. On trouve ces amphibies dans la mer Baltique , vers le détroit de Davis; ils fe repofent fur les rochers, à fleur d'eau ou fur les glaces , où ils s'endorment quelquefois : la femelle fait un ou deux petits.

The text on this page is estimated to be only 16.52% accurate

The text on this page is estimated to be only 18.81% accurate

46S , ANIMAL? X. qu'on voir dans l'eftampe , qui cil un Singe fans queue, roux t \ poils allez longs , gros comme un chien courant. Les Singes habitent dans les deux Indes, & principalement en Afrique : on n'en connoît encore que trente-huit efpecesj Vertu s. Le bézoard de Singe eft fudorifique, alexipharmaque : la dofe eft depuis deux grains jufqu'à fix. Extérieurement la graille eft nervine , réfolutive. PLANCHE 727. Sus y Verrat, Truie, Cochon. ON fe ferc de leur graille , fiel , fiente , & de la vulve de la Truie. C'eft un animal domeftique, à pieds fourchus , de moyenne grandeur j il a deux pieds de haut & quatre pieds de long , depuis le bout du nez, nommé groin, jufqua l'origine delà queue. Le mâle fe nomme Ferrât j la femelle Truie; le mais châtré , Cochon ou Porc. Le groin couleur de chair, de petits yeux, les oreilles longues Se pendantes , vingt-deux dents à chaque mâchoire , donc quatorze molaires ; les deux dents canines d'en bas fort longues & recourbées j tout le corps couvert de poils roides , plus durs que les poils ordinaires. On les nomme des foies : ces foies font plus longues & plus fermes fur l'arrête du dos ; fa couleur générale eft blanc paille- il s'en trouve qui ont des taches noires; La Truie a dix mamelons j elle fait jufqua douze & quinze petits. 11 vit dans les bois, de glands 8c autres fruits fauvages, Si dans les batfe-cours , de légumes , de fon , orge , fruits, fkc. Vertus et Usages. La vulve de la Truie cuite & mangée , eft un très-bon remède contre l'incontinence de l'urine. Extérieurement la graiftê récente fondue, qu'on nomme /a/^ doux, eft anodine, émollientej le vieux lard fondu, eft déter'j fift confondant } le vieux oing, qui eft la vieille graille empuan^

The text on this page is estimated to be only 17.81% accurate

TOME CINQUIEME. 469 cîe, efl émollient, réfolutif; \z fiente etc. déterfive , résolutive. La graille de Porc entre dans l'Onguent d'Àitkea, la Pommade de Heurs d'Orange, l'Onguent Rofat, l'Emplâtre de Minium , de Grenouilles. Apcr , Sanglier, Laie, Marcaffin. On fe fert de fa graiiTe , des dents, verge, fiente. Ceft un animal fauvage, à pieds fourchus, de moyenne grandeur, reffembîant beaucoup au Cochon & de la même taille; niais moins long & plus ramaflé j fa femelle fe nomme Laie de fes petits Marcaffins. Le bout de fon nez fe nomme boutoir; il eft noir ; fes oreilles font courtes & relevées; quatre dents lui forcent de la gueule; favoir , les deux canines de la mâchoire fupétieure, quife relèvent en haut en fortant , &c qui font en partie recouvertes par les deux canines de la mâchoire inférieure, qui font bien plus longues & qu'on nomme défenfes. La Laie n'a point de défenfes la couleur générale de fes foies , eft un gris mêlé de noir & de roux. Il habite les fonds des forêts les plus épaifles , où il vit de racines qu'il déterre , de fruits faûvages , de gland ; la femelle fairhuic ou dix marcaffins , qui viennent au monde avec la livrée , c'eftà-dire , que leur poil eft diftribué en long, de la têre à la queue , par bandes ronfles j les unes claires, les autçes brunes, jufqu'à leur première mue. Vertus et Usages. La verge & les autres parties voifines , en poudre , font eftiirsées bonnes contre l'impuiffance, depuis un fcrupule jufqu'à deux. Les dents ou défenfes , en poudre , font alkalines , abforbantes, fudorifiques , adoucifiances , depuis un fcrupule jufqu'à demi-gros. Extérieurement la graifle Se la fiente ont les mêmes vertus du précèdent. Les dents entrent dans la Poudre contre la Pleuréfie,

The text on this page is estimated to be only 16.20% accurate

47® ANIMAUX, PLANCHE 728. Talpa j Taupe, ON fe fert de tout l'animal, du cœur, foie & fane* Ceft un petit animai à quatre pattes , fauvage , de terre : long de fix pouces fon nez eft fait en groin de Cochon 4 coulent de chair, deux petits yeux noirs, cachés fous le poil l'oreille de même, dans un enfoncement entre le col 6c l'épaule lïx dents incihvesa la mâchoire fupérieure , huit a l'inférieure ' les pattes de devant large , faites comme des mains à cinq doigts le dedans de la main tourne en arrière, fans poil, couleuf dé chair, livide, les pattes de derrière à l'ordinaire , bien plus petites; tout ranimai couvert d'un poil fin, d'un gris quafi noir la queue ttes-courte, avec quelques poils. Cet animal vit fous terre, rongeant les racines des plantes; elle fe fait des chemins voûtés à la fuperficie de la terre, & elle eleve dans fa route, de côtés & d'autres, de petites monticules, qn on nomme des taupinières. Vertus* La cendre d'une Taupe calcinée , eft déterfive, adoucifTante J depuis un demi-gros jufqu'à deux fcrupules ; un cœur, en poudre, eftaftrwgent; un foie, en poudre, eft antihyftérique. Extérieurement la cendre de Taupe eft déterfive; le fang récent de même. ° Vrfus, Ours. On fe fert de fon fiel 8c graifTe. C'eft un animal alTez grand , à quatre pattes, fauvage , étranger ; il a quatre pieds de haut, & cinq pieds & demi , depuis le .bout du mufeau, jufqu'au commencement de la queue, qui n'a que cinq pouces de long. 11 aie mufeau étroit, les yeux petits, les oreilles droites & courtes ; fa figure eft groffiere & pefante ; tout l'animal eft d'une couleur roulTe & couvert de poils très-longs , mais alTez doux au toucher; il a cinq doigts à chaque pied , armés d'ongles forts &c pointus ; il marche debout aft"ez facilement & grimpe aux arbres 1

The text on this page is estimated to be only 17.64% accurate

fOMÈ CINQÙIÉWË. 4fi il y en a des efpeces plus petites ; il s'en trouve «uni de toué blancs; Ceft un animal des pays froids & Septentrionaux; on lé trouve en Norwege, eh Rulîîe, en Allemagne; il vit de touC ce qu'il rencontre, herbes, racines, animaux vivants-, car il né touche jamais à la chair morte; il fe recire au fore de l'hiver $ dans des cavernes oii dans les troncs creux de très-gros arbres* Vertus et Usages. Le fiel eft îiicifif, pénétrant, céphalique : la dofë eft depuis deux ou trois gouttes jufqu a huit. Extérieurement la graifle eft émollientej fortifiante; elle entre dans l'Onguent Martiatum, o PLANCHE 729' Homo) Homme , Femme; N fe fert de fes cheveux , ongles , cire des oreilles , falivô j fang, urine, excréments, mumie^ grahTej crâne, ufnéè du crâne , lait de femme , arriere-faix. L'homme habite les quatre parties de h terre-, fa taillé moyenne eft de cinq pieds cinq pouces , excepté vers le Pôlé arctique, où les hommes n'ont que quatre pieds quelques pouces* La couleur des cheveux parcourt toutes les nuances du jaune de paille clair an noir, Se celle du corps, depuis la couleur de rofe très-clair j jufqu au noir jais. Les femmes n'ont le plus fouvent qu'un enfant 4 quelquefois deuxj rarement trois. Vertus et Usages* Là cendre des cheveux , en infufion , dans îe vin ; eft dfc fobftruante : la dofe eft depuis demi-gros jufqu a un gros. Les on* pkstes doigts râpés, forit un purgatif & vomitif tres-tfiolent, t la dofe d'un fcrupule en fubflance , ou de deux ferupdes en infulion. L'urine & apéritive, atténuante, refolutive & deioblSuante : la dofe eft 5e cinq ou Onces, récente * r*d* La rnumie d'Egypte , qui eft des corps anciennement enibaumcs par CrEgyptiS eft céPhal,que/défobftruanre, à k dofe du*

The text on this page is estimated to be only 19.36% accurate

47*. ^ ANIMAUX, demi-gros Jufqu'à deux fcrupules. La poudre de crâne humain eft antiépileptique , depuis douze grains jufqu'à deux fcrupules. Le lait de femme eft béchique , reftaurant , à la dofe du lait d'ànefle, Pi. 713. L'arriere-faix en poudre, eft céphalique., hyftérique , depuis un fcrupule jufqu'à deux, Extérieurement les cheveux brûlés & fentis fur le champ , cq,][jnent les vapeurs hyftériques; la cire des oreilles eft favonneufe, déterfive ; la falïve eft déterfive , adouciflànte ; le fang en poudre , eft aftringent j l'urine eft adouciflance , fortifiante ; les excréments pulv 'érites, font émollients , adouciflanrs , digeftifs , maturatifs; la mumïe d'Egypte eft vulnéraire , déterfive*, la graijfe eft anodine , émolliente 'y l'ufnée du crâne eft une moufle : voyez PL *59La mumie d'Egypte entre dans l'Emplâtre Oppodeltoc , ftiptîque. Le crâne humain dans l'Eau d'Hirondelles , la Poudre 3e Guttere , antijpafmodique. Son ejprit volatil entre dans les Gouttes d'Angleterre, céphaliques, anodines.

The text on this page is estimated to be only 13.88% accurate

TABLE £> £ S JVOMS, Latins & François , des Plantes Sd Animaux décrits danis la matière Médicale de M. G É o f f r.o y, relatifs aux Figures gravées fur les deffeinsde M. de Gars au lt. TOME PREMIER. EXOTIQUES. A C°rus verus , ^J, Acorus adutterinus , Angdica. y Ànihora , Arijlolockia îonga t Arijlolochia roiiinda , Ariflolochïa clematiûs , Ariftolochia piftoiachid , Btken album , Carlina 3 Carlina , Jxia , China Orientalis j China Occidentales Contrahytrva. , Cojlus , Curcuma longa, Curcuma rotunda i Cyperus lengus , Cyperus rotundus t Cyperus Amcricanus i DiBamus albus , Doroniçum Romanum , Doronicum arnica , Galanga major, Qmùana. , ACore rrai , * Faux Acore ^ \ Angélique , i Anthore , Macloti,' i Ariftoloehe longue $ 4 Ariftoloche ronde , 4 Ariftoloche clémarke , 5 Ariftoloche petite, $ Bcheu blanc , 6 Chardoncrctte , 7 Chaméléon blanc a S Squine d'Orient , > Squine d'Occident , 9 Contrahyerva , la Coftus , 1 1 Tcnx-Mérice , 1 1 Curcuma rond s' 1 1 Souche: long , ï J Souchec rond , I { Soucher d'Amérique , 1 î Diiftame blanc , Fraxinellc , 3 4 Doronic romain , 1 S Doronic d'Allemagne, 1 $ Grand Galanga , 16 Gentiane, li

The text on this page is estimated to be only 15.38% accurate

4 TABLE DES PLANCHES. G/ytyrrhifa, Réglifle, Veratrum flore nigre , Ellébore blanc à fleur noire , i % Veratrumfierefubviriiit Ellébore blanc à fleur -verte , iï Helkborus niger flore rofeo , Ellébore noir à fleur rofe, Helkborus niger Orientais , Ellébore noir d'Orient , i9 HclUborus niger flore viridi , Ellébore noir à fleur verte , 20 Jalappa off, Bellc-de-Nuic , 19 HdUborus niger buphtalmi folio , Ellébore noir à feuille d'ceil de beeuf z 1 Irnpcratoria , Impératoirc , ' %x lpecacuanha. YiginUna t Ipécacuanha de Virginie , 11 Iris noftras , Iris, Flambe, 15 Iris Florcntina, Iris de Florence , 25 Meum athamanticum , Mcum , «4 Nardus , valeriana Celtica, Naid Celtique , ij Nardus , valeriana Alpina , Nard des Alpes , Nardus , valeriana montant , Nard de montagne , %6 Gins-eng , Cenfeng , i7 Ninriit , Ninzm , 17 Rhabarbarum verum , Vraie Rhubarbe , is Pyretkrum & Rhaponticum devroient être ici; mais n'y ayant pas été cotées par mégarde, on les a tranfpofées ci-après au fécond Tome, parmi tes Indigènes , N°. 3 14. Rhabarbarum Monackorum, Rhubarbe des Moines , 19 Sur^a-parilla, Sarccparcille , i? Scneca , Sénéca , }0 Serpentaria. Virginiana nigra t Serpentaire de Virginie, ja Serpentaria Cretica , Serpentaire de Crète , 30 Serpentaria altéra , Serpentaire, 30 Serpentaria caule nodofo , Serpentaire , 3 1 Serpentaria violes frufticoflt folio , Serpentaire, jr ■ Turbith, Turbit, * 31 Zerumbeth Zedanica , Zérombet de Ceyîan * 33 Zerumbetk, Zérombet , 3; Zir.gibcr , Gingembre, 34 Zingiber fylvejlre s Gingembre fauvage , 34 Canel/a, Candie, 3f Cortex Wimeranus , Ecorcc de Wïnter, Kinakina , Quinquina, 36 Cafcarilla, Chacnl , 3 6 C odaga-pala f Cropal , 37 Guayacum , Gayac , 3 8 Saflafras } Sallafras , 3 S Corallitm rubrum , Corail, 3? Madrepora s Madrépore, 35» Corallma, Corallioc , 39 Çaiamus aromaùcus, Vrai Calamus , 49

The text on this page is estimated to be only 17.39% accurate

TABLE D Juncus odoratus , Alalabatrum , Serina AUxandrina , Dittamui Craicus , The Sinenjum , Stœchas arabica t Crocus y Palma major , Zi^iphus , Sibeftena , Ficus , PaJJuisz Corinthiacee PaJJultz D àmafcenct , Citrini , M'trobolani , Chsbulm , Indices , BelierictZ j EmblicA, 'Amomum , Cubibe , Colocyntkis , CaJJia , Tamarindus , Paniiia , Cardamomum , Elettari , Piper nigrum , Piper longum , Piper aromaticura , Caryophyllus , Anacardium , Acajou , Balanus myrepjîça i Cacao , Pifiacia , P inus faùva , Ricinus vulgaris , Ricinoides Americana , Ricinoides arbor Americana , Jiicinus arbor , grana Tiglia , Cafe, ftux mofehata, A'k.'V vomlca major , 2Vux vomica minor , Faba fanSi Jgnatù , vomica , Carthamus , Anifum iadicum , Badian , ES PLANCHES. Jonc odprant , Feuille Indienne, Séné d'Alexandrie , Dittame de Crcce , Thé de la Chine , Stœchas Arabique, Saffran , Palmier dattier, Jujubier , Sébcftc , Figuier , Raifïns de Corintlic , Raifïns de Damas , Citrins , Chébulf s , Mirobolans , Indices , Eellcrics , Emblics , Amomc , Cubebes , Coloquinte, CafTc , Tamarinier, Vanille , Cardamome, Poivre noir, Poivre long, Poivre de la Jamaïque ,' Girofle , Anacarde , Acajou , Ben , Cacao , Piflachier , Pin , Ricin , Médicinier , Médicinier d'Efpagne, Grains de Tilli , Cafté , Noix mufeade , Noïï vomique , Petite vomique , Fcve S. Ignace , Saffran bâtard , Anis de la Chine , 3 0 41 4? 44 4î 46 47 48 49 S° Aij r5Î J4 îî h SI $* i9 4 1 ét èi *4 *S 66 <7 61 i9 70 7t 7i 75 74 ts 7

The text on this page is estimated to be only 13.13% accurate

A TABLE t'tquidamh-arum t Thirehïnthus , iarix , Abhs , Pinus Gmovenfîs ,' Arbor filiquofa s $d]oinurn, , Camphora Japonica ; Jiedera. arborea s Çiflus ladanifera , Lentifcus vulgaris , Junipertts vulgaris , Oxicedrus licia , Draco-arbor , J'alma Amboînenfis , ' JDraco-arbor indica , Styrax fqlio ma(i CoîOnù , Tacamahaca t Acacia vera , Tragacantha , Fraxinus humilior , Fraxinus rotundiore folio s Alhagi , Affaf&iidii , Fuphorbium , Orcofdinum galbaniferum , Aloi foccoirina , jtloï vulgaris , Scammonia fyriaca , Carcapulli , Papavtr kortenfe , Acacia foli» fcorpioides y Prunus fylveftris x JfJyppocïfiis , Areca palms. foliis , Arundo faccharifira. , Arundo mambu , Acer montanum 3 Apocinum Syfiacum Auricula Judée , Tubera cervina , Agaricum , Cal! a , lltx acuhata y Opuntia , DES PLANCHES. L;quidambar , Thérébinche , Mélefe , Sapin , Pin de Genève ,' Gomme animé , Benjoin , Camphre du Japon ,' Lierre , Ladamim , Maftic, Lentifc]uet Çencvrier, Sandaraque, Çedre à baies , San&rdragon , Sang-dragon d'Amboine , Sang-dragon d'Inde, Storax , Tacamacjue , Acacia de la Gomme Arabique, Gomme adra^ant. Manne de Calabre , Manne de Galabre , Manne d'Orient-, Aflafa;tida , Euphorbe , Galba num , Aloes fuccotrin Aloès hépatique , Scammonée , Gomme gutre , Pavot blanc, Opium ^ Acacia , fon fuc , Acacia d'Allemagne, Hyppocifte , Cachou , Canne de fucre , Bambou , Sucte d'Erable de Canada t Sucre d'Egypte , Oreille de Judas , Truffle de cerf, Agaric , Noix de gaile d'AIep , Kermès , Cochenille, Raquette , 77 7? 79 Sa Si %i «S u «7 SI 8, 90 9.1 51 5 5 5 + 9>S 9f 97 97 9Z 99 ioa loi lot lo.j I04 los lo£ 107 10S 109 IJEO ïll m "î 114 ".5 US 118

The text on this page is estimated to be only 11.68% accurate

TABLE DES PLANCHES. t TOME II. INDIGENES. f A

Brotanum mas l A Urone mâle, iij _/^f Abrotanum fœm'tna , il Garderobbe , 110 Abfcinthium majus , Grande Abfynthe t 111 Abfcinthium minus , Petite Abfynthe , 112. Acanthus , Branche Urfine t iij Acttofa vulgaris , Ofeille, 114 Acetofa rotundi foîia , Ofeille ronde , 114 Adiantum canadienft 4 Capillaire de Canada , iij Adiantum verums Capillaire de Montpellier , Adiantum album, Capillaire blanc, ntf Adiantum nigrum, Capillaire noir commun, 117 Jiuta murarïa y Sauve-vie, lit jPolytriciim , Polytric, 118 Adiantum aurtum >" Perce-moufle , 1 iy Ageratum , Eupatoire de Mefri ± 1 1 * Agnus cajius , Agnus caftus , 1 } 1 Agrimonia t Aigremoine, 131 , Mauve fauvage , 1 3 ? Alchimilla , Pied de lion, 134 Alkektngi , Coqueret , 1 3 j Allïaria , Alliaire , 1 J f Allïiim, Ail, Alliopraftim s Rocambolle , 137 Alnus , Aulne , ijï Alfine média, Morgeline , 13? Althéta, Guimauve, 140 Amygdalus k Amandier, I4T Anacampferos t Orpin , reptife., 141 Rhodia radix , Orpin rofe , 14$ Anagallïs , Mouron, 144 Atmhum 3 Aneth , 14) Anifum j Anis , . J4* Anonis , Bugrande , Arrête-bœuf , 147 Aparine , Gratteron , 14* Apium, Ache , *4? Aquifolium'y Houx, ift> Aquikgia, Ancolie , !Jr Argentina, Argentine, 'f1 Armeniaca matus ; Abricotier, ïjî Artemijîa, Armoifc, herbe S. Jacques , i<4

The text on this page is estimated to be only 13.46% accurate

* TABLE DES PLANCHES. 'jtruœ t Pied de veau , 1/ c JtjaTumi Cabaret , Oreille d'homme , 15 6 jijdtpias Domplcvenin , If 7 Jtjparagus , A fpe rge , 1 5 8 ufjperula , Petit Muguet , lj9 jftsripitx, Arroche , Bonne-Dame, 169 jtttriplex , vulvarict) Arroche puante , I6t jivena , Avoine, iéi jturamium , Oranger , iS% Bardana , Bardane , Glouteron , 164 Meccabunga, Beccabunga , 16^ Btlla-dona , Belle-Dame , 1ÉS Beilis major , Grande Marguerite , 167 B'tiïis miner , Pafquerctte , 167 Btrbtris , Epinc-Vinette, Ié8 Manda., Berle , 169 -#fM, Bête, 170 Beionka, Béroine , 17 1 Bet&la , Bouleau, I7i Bijïarta r Biftorte , 171 Boktus tfculentuj , Morille, 17; Bonus- Henricus , Bon Henri, 174 Borrago , Bourrache, 17 j Botrys ambrofidides , Piment, 17$ Botrys Amencana t Botrys du Mexique , 177 Brajftca, Chou , 17! Brajfzca caulifiora, Chou-fleur, 173 Brundla, Brunelle , 18-a Bryonia, Couicuvrée , iSt Bryonia nigra, Racine vierge , 18-i ■ Btigloffum , Buglofe , 183 B ugitla , Buglc , 1 84 Burfa pajloris , Tabouret , Bourfe à berger , 1 8 y Buxus , Buis , 1 8£ Calamintha, Calament , 187 Calamintha pulcgit oiort > Calament à odeur de pouliot , 1 SS Calamintha montant , Calament de montagne , 189 Calamintha amen fis y Poulioc Thirn , 190 Cakitrapa , Chaufle-Trape , Chardon étoile , i?i CaUndida, Souci, 191 Camphoraiat Camphrée, i>} Cannabis , Chanvre, 3 94 Capparis , Câprier, i? 5 Caprifulium, Chevrc-feilille , 196 Cardiaca , Agripaumc , 197 Çarduus btnediftus , Chardon béni , iyï

The text on this page is estimated to be only 13.55% accurate

TABLE ÇarJuus àuraUilis , Carduus Maria , Catyophyllata , Carui , Caryophyllus, tunica , Cajianea , Centaurium majus , Csniaunum minus, Cepa vulgaris , Cepa afculonica , Cepa fijjllii , Cerafus , Cerafus fylveflris, Ceterac , ÇharophyUum , Chamadris , Chamaimelum , Ckamtzmchim fztidum t Chamczpithis , Chamecpithis mofchata, Chelidonium majus , CheLidonium minus , Cicer , Cickorium fylveftre f Cicuta major , Cicuta minor , Cinara , Cardones , C 'ureum , Limon , Citrultus , Cochlearia , Colchicum , Confolida major t Coriandrum majus , Cornus , Corylus , Coconea malus , Cruciaia , Çucumis fativus , Cucumis afininus , Cucurbîta t Cuminum tCuprejfus , Cu.jcu.ta , Cyanus , DES PLANCHES. 7 Cli ai don béni des Patifism , Chardon-Marie, 200 Benoîte, 201 Caivi, iDa (Sillet rouge , i0j Chareignier , Grande Centaurée , »0ç Petite Centaurée , 20lg Oignon , 107 Echalotte , 20S Ciboule , 209 Cérifier-, iIO Mériiïer , m Ceierac , 21» Cerfeuil , nj Germandréc, 3,^^ Camomille, 3.1^ Maroute , xj£ Yvette , ^ aïy Yvette mufcjuée, nj Grand* éclair , 2,19 Petite éclair , îx^j Pois chiche , aii Chicorée fauvage , 13,» Grande ciguë ,j xa j Petite ciguë , Artichaut , aiç Cardon d'Efpagne , 224 Cédra , aly Citron des Parifiens , 117 Citrouille , Potiron , 22$ Herbe aux cuillieis, 22$ Colchique , aj0 Grande Confonde, ijj Coriande , 252, Cornouiller, ijj Noifettier , Coudrier t ij.f Cognaffier, XJ4 Croifette , 13 ^ Concombre, i>^Concombre fauvage , 257 Courge , Callebaûe, 2j8 Cumin , 2; 9 Cyprès, 240 Cufcute, 141 Eluec , Barbeau , Aubifoin, 1^

The text on this page is estimated to be only 9.80% accurate

TABLE DÈS PLANCHÉS. Cyclamen ', CynogloJJum , Daucus •Cretkus , Daucus , Dens leonis Laùort folio , Digitalis , Dîpfacus faûvus, Dracunculus major i Ptarmica } Dracunculus tfculentus „" Dulcamara , Ebului , Elatine , Endivia , Enula campana i Equifetum , Eruca fativa , Eruca fylveftris 1 Eryngium , Eryngium maWlumi Eryfimum , Efula minor , Efula major , Eupatorium cannabmum , Euphrafia , Faba , Fagopyrum , Filipendula » Filix mas , Filix fxmina i Filix florida 3 F&niculum , Fawum-grecum , Fragaria 3 Fraxinus exceljîor , Fumaria , Fungus efculenlut, Fungus vernus , Fungus pulveruimtui , Galega , GaUopfis procerior f Galeopjis palujiris , Galeopfis , lamium lutcum', Gallium lutcum t Gallium album , Genijla t M. uni uk. J'VUlttdU. y TÎ Langue de rhien TT Daucus de Crête R + ? rotff* i-i.fi PilFertlit T/ F)io"ï Ijp l ■ IrKalv y 14.S fiiardon a rotilnn • 1 fa Herbe à éternuer^ 1 7 r j F Irn c*Ti il 1 ? i Douce-aroere , 1 f i Hieble, JT Velvote , Enciivp Sca.ro f le lîfi A itnfp J1UL1VL y J r Prefle , queue de cheval , if8) Ti naiiï*rtr Roquette {auvage $ îfiO Chardon rotant , xèi Panicaut da mer 4 l6l Vélar Tortelle Petite Efule , iSî J T Grande Efulc 5 F.u notoire J -U |! 1 1 1 (il 1 L , Ff*vc t!e marais î 1C.S Eled noir, Sattiixirt Filipcndule , 170 17 t Fm i uprp rf*mp 1 le y. UU'^ l. L lt lll^ liv j 171 Fougère fleurie , Ofruonde , 17! Fenouil y 174 FfTI IlO" VPC ^ h il L ' 1 k. 1, y 171» Frcnc 3 177 Fumctcrrc « 178 Champignon ^ 17? MniiiliTAii J.V1 U LJ. 1 [L i. LJ î J ^ 17S Verce de loup , 179 C^ale^a y i ïo i-jrtie puante > i!f TVrirp Orrîr morte "nuante 1S1 Ortie morte à fleurs jaunes , 18; Caillelait jaune , Cailklait blanc , lS4 1Ï5 Geoct , Gcnifia

The text on this page is estimated to be only 13.71% accurate

TABLÉ DES PLANCHÉS. j Ùenljla lïifpanica , Genêt d'Efpagne , igg Géranium columbinum , Pied de pigeon , ag^ Géranium Robertianum , Herbe à Robert , agg Géranium fanguineum , Bec de grue fanguia4' ig9 Gnaphahum jeu impia , Herbe à coton , ±po Gnaphalium pes câti , Pied de chat , i?b Gramen loliaceum , Chiendent , 1 9 r Gramtn datlylon , Chiendent , pied de poule j itf Helianthemum , Herbe d'or , 157 Helianthemum tuberofuiri , Topinambours, a^S Heliotropium , Herbe aux verrues ^ 25^ Hepatica lichen-, Hépatique commune „ 30» Hepatica nobilis t Belle Hépatique , joi Herba paris , Raifin de renard , jo* Herniaria, Turquctte , jûj Hordeum, Orge, 504 Horminum i Orvalle toute bonne ,: 30^ Hyofciamus niger , Hanebanne, 306 Hyofciamus yulgarit , Jufquiame blanche, 307 Hypericu.ni, Miipertuis, 308 Hyjjhpus , Hyiîbpc, 30^ Jacea nigra, Jacée , 310) Jacobtzat Herbe S. Jacques , 3IE1 JugLans , Noyer , 3 1 &• Keiri, Girofflier jaune, jrj Latluca capitata , Laitue pommée , 514 Laêïuca romana , Laitue romaine , i LaUuca fylvejlris , Laitue fauvage, .51* Lamium archangtlka ,; Ortie blanche , 31/ Lamium non fxtens , Orrie morte pourpre* „' 3lS Lamium fxtidum , Ortie morte puante, 31? Lampfana , Herbe aux mamelles t 310 Lapaihum hortenfe , Patience de jardin, 32.1 Lapathum violon , Lapaton-violon , 31*" Lapatkum fançuïneum , Sang ds dragon, JiJ

The text on this page is estimated to be only 12.17% accurate

le TABLE DES PLANCHES, %Pimhrumt Phctre , Jl4 ï Rhaponticum , Khapomic , ? 14 Lapathum crifpum , Paricnce crêpée , 3 is Lapathum fol. acuto piano ; Patience, 32.6 Lapathum fol. minus -acuto , Patience fauvage , 316 Lapathum aquaticum , Patience d'eau s ji7 Lapathum fpinacia mas , Epinardmâle, 31g Lapathum fpinacia fxmina , Epinard femelle, 319 Lavendula major , Afpic , 330 Lavtndula minor , Lavande, 3ji Laureola mas , Lauréolc, 331 Laureola foemina , Bois-gentil , 333 Laurus , Laurier, 334, Lins , Lentilles, 33 j Lenticuta patuftris ; Lentille d'eau , cannetis , 336 Ltpidium, _ Pafferage, 337 Lepidmm iberis , PalTerage fauvage , 338 Levificum, Livêche , 339 Lichen, Pulmonaire de chêne , 340 Ligufikum, Sefeli, 34i Liguftrum, Troène, 341 Lis blanc, 343 Lilium conuallïum ; . Muguet, 344 Linaria, Linaire , 345 Lingua cervina , Scolopendre, 346 Linum , iin j 3 47 £i/ium catharticum; Lin fauvage, 34S Lithofpermum , G remil , herbe aux perles , 345» Lithofptrmum reptns-, Gremil rampant , jjo LacrimaJob, Larme de Job , 3jr Xo/j/j orfwd , Loticr odorant , 351 , Alleluya , 3 ; 3 Lupinus j Lupin, 3^4 Lupulus , Houblon, 3 j y Majorana; Marjolaine, 3J(f Maha major l Grande Mauve , 5J7 Afj/va minor , pet;te Mauve , 3 rS Afa/ra ro/èa * Rofe Trémierc , 3 j9 Malus , Pommier , 3 60 Malum granatum; Grenadier, 361 Malus per/ica , Pêcher, 36i Mandragora, Mandragore, 3*5 Marrhubium album , Marrhube blanc ; 3 64 Marrhubium nigrum, Marrhube noir, 365 Marum , Marum , 3

The text on this page is estimated to be only 15.88% accurate

TABLE DES PLANCHES. u Matrkaria » Marricaire , jSï May s , Bled de Turquie , 38» Meïrfotus , Mélilot , j7o Mdiffa, Mélifle, ^ 371 Md'îffa tragi , Méli/fè de tragus^ 371 Af«/o , Melon , 37 j Melongena , Mayenne, 374 Menyantkes , Trcffle d'eau , 37 j Mentha hortenfis , ' Baume des jardins 37 Buiflbn ardent , 3 85 Miiium, MiHet, 386 Milium for go t Grand millet, 387 MïUe-folium y ' Mille-feuille, 388 Momordica , Pomme de merveille, 3 89 Morusnigra, Mûrier noir , 390 Morus alba , Mûrier blanc , 391 Mofchattllina , Herbe du muic , 3 9 1 Mufcus ttrreftris vulg. Moufle commune, 393 Mufeus clavatus , Pate de loup , 39} Mufcus membranaceus i Noftoc , 5 9 ï Myagrum , Camcline , 3 y 4 Myrrhis , Cerfeuil mufqué-, J9f Myrthus , Myrthe, 396 Mynkus brabanùca , Piment royal, 397 Napcltus, Aconit bleu, 3 98 tfapus, Navet, 399 Narcijfo'-Leucoium ,' Pcrceneige , _ 4° ° Naflurtium hortenft , Creflbn alenois , 401 Naflurtium vtrrucarium , Creflbn fauvage , 401 Naflurtium aquaticum , Creflbn de fontaine 403 Naflurtium indicum , Capucines , 4a4 Nepeta , Heibe au chat , 4°/ Nerien , Laurier rofe , 4°^ Nicotiana major , Tabac mâle , 4°7 Nicotiana angufl'ifolia Tabac de Virginie,' 4°S Nicotiana minor , Tabac du Mexique , 4°> Ntgella arvenjis , Nielle commune , 4»o Ntgeîla romana t Nielle des jardins , _ 4**

The text on this page is estimated to be only 12.82% accurate

TABLE DES PLANCHES, 'Jfigella tretica , Nielle du levant , 414 ~ Nigellaftrum , Nielle des bleds 41} Noii-me-tangere Balfamine jaune , 414 Nummularia , Herbe aux écus , 41 f Nymphéa alba , Nénufar blanc , 41 6 Nymphéa lutea, Nénufar jaune , 417 Ocimum, Eafîlic , 41 g Oculus bovis , (Eildebccuf, 4I9 Œnantke major aquatlca Perfil de marais , 410 , Olivier, 411 Ohvella , Garoupe, 41 1 Onobrychis, Sainfoin, 4:1 Onopordon , Chardon aux ânes , 415 Carduus capite tomctttofo * Pct-d'âne , 414 Ophiogiqffkm , langue de ferpent , 41 y Ophris, Double feuille, 415 Oputus, Aubier, 416 Orchis morios mas , Satyrion, 417 Orchis miiitarïs major i Grand Satyrion , 417 Orcofelinum majus , Grand Perfil de montagne , 4.18 Orcofelinum minus , Petit Perfil de montagne , 4151 Onganum majus, Origan, 430 Origanum minus, Petit Origan , 430 Orr.ithopodiw t Pied d'oifeau , 431 Orotus, Orobe, 4;i Ori^a, Ris t 4?î Oxicoccus ; Canneberge, 434 Pœonia, Pivoine, 4jj Paliurus i Porte-chapeau, 43 <> Panicum, Panis , 437 Papaver eornutum, ' Pavot cornu , 438 Papaver rheas, Coquelicot}, 4i9 Papaver nigrum , Pavot noir, 440 Pari et aria, Pariétaire, 44 r Paftinaca , Panais , 441 Petliboffa, Corneille, 445 Perfoliata, Percefeuille , 444 Penploca , Scamrponée de Montpellier , 415 Perficaria milîs ; Perficaire , 446 Ptrficaria urens , Curage , 447 Pervincaminor, Petite Pervenche , 448 Pcrvinca major , Grande Pervenche , 448 Petafitts , Petafîcc, 4.9 Petrofelinum , Perfil, 4jo Petrofeiinum mactdcnlcum , Perfil de Macédoine , 4j r Piucedanum , Queue de pourceau, 4jr

The text on this page is estimated to be only 12.66% accurate

TABLE Pktifeolus t Phyllyrea , Phytolacca , PUofilla , PimpinelL , Pinguicula , Piper in dieu m , Pifum album , Plantait} major , PL ntago média , Plantago minor , Polïum lutivum „ Potium album , Polygala , Polygonatum , Polyganum , Polypodium vulgare j DES PLANCHES. Haricot , Filana , Morcllc des Indes , Pilofelle , Pimprenelle, GraiTette , Poivre de Guinée , Pois blanc , Grand Plantain , Plantain blanc , riantain long , Polium jaune , Polïum bjanc , Herbe à lait , Sceau de Salomon Renouée , traînant , Polypode de Chêne , »9 4n 4H 45 î 457 4ÎS 46» 46 r 46 l 4SI 4«i 4«î 46+ 46r 466 TOME IV. INDIGENES. "T\ Oputus nigra , J_ Populus alba , T^Euplier noir, 4«7 _|_ Peuplier blanc „ 4ï7 P orrum , Portulacca , Poireau , Pourpier , 4éS 469 Primula-veris , Primevère , 470 Prunus , Prunier, Pfeudo-dcacia , Taux Acacia , 471. Pjîllium ereiium Herbe aux puces , 47 ï Pfdlium fupinum , Petite herbe aux puces. 474 Pulmonaria , Grande Pulmonaire , 47 î Pulmonaria Gallorum i Herbe à l'épervier , 476 Pulfatilla, Coquelourde , 477 Pyrola , Pyrus , Pyrole , 478 Poirier , 47» Qiiercus , Chcne , Quintefeuilic 4B0 Quinqucfoliiim Ranuncufus bulbofus 481 Bacinet des prés , 48t Raçunculus nemorofus , Bacinet blanc. 48 J Ranunculus repens , Bacinet rampant , 484 Ranunculus palujlris, Douve , grenouillette , 4% s Rapa , La vraie Rave , Turnip , 486 Raphanus , Rave des Parifiens, 487 Rapkanus ruflîcanus , Raifort fauvage, 488

The text on this page is estimated to be only 15.79% accurate

ï4 TABLE Rapunculus , Rapunculus fpicatus , Refeda , Rhamnus catharticus . iMaj /û/(o a/mi , Rhus Virginianum „ ~Rofa pallida , Rofa alba , Rofa mofchata , Rofa Provinciales , Cynorrhodos , Rofmarinus , Rqffhlist Rubeola , Rubia tiriclorum , Rabus , Rubus idœus , Rufctis aUxandrïnus , Rufcus , Ruta , Sabina folio tatnarifci / Sabina folio cupreff , Salicaria , &alix, Salix caprea , Sulvia major , Sœlvia Itifpanica , Sitlvia minor , Sambucjis , Samolus , S articula , Sanicula aflramia i Saponaria , Salureia , Sdturtia fpicata , Saxifraga alba , Saxifraga verna Saxifraga aurea , Saxifraga magna Tragofehnum majus Tragafelir.um minas , Scabiofa valgaris , Scabiofa vel juccifa , Scandix , Scilla rubra , S cilla parva , DES PLANCHES. Raiponfe , Raipoufe fauvagc , Refeda , Nerprun , bourg-épine , Suinach , Sumach de Virginie, Rofe pâle , Rofe blanche , Rofe mufeace , Rofe de Provins , Rofe de chien, églantier.,. Romarin , Roiïblis , Rougeole , Garance , Ronce , Eramboifier , Laifrier alexandrin , Hotix-frêlon , Rue , Sabine à feuille de tamaris, Sabine à feuille de cyprès , Salicaire , Saule , Marfaiit , Grande Sauge , Sauge d'Ef pagne, Sauge de Provence , Sureau , Mouron d'eau , Sanicle, Sanicle de Montaigne, Savonicrc , Sariette , Heibe S. Julien , Saxifrage blanche , Saxifrage rouge , Saxifrage dorée, Grande Saxifrage, Grand Boucage , Petit Boucage , Scabieufc , Mors du diable , Peigne de Vénus , Grande Scjuille , Petite Sijuillc blanche, 4Î? 49» 4,91 49 * 49} 49} 494 494 49 S 4.9S 496 497 49 8 499 jeta $Ql JOJ J04 S°S 506 S°7 jo3 $0.9 510 JI0 5*1 514 5X 3*7 ,1$ ys SH 511 5H fM r-7 r-s

The text on this page is estimated to be only 14.61% accurate

TABLE DES PLANCHES, Sclarea fylvejlrit , Stardium , Scorodonia y Scor^onera , Stropkuiaria fwtida , S crophularia aquatica , Sicale , Sedum ma'jus , Sedum minus album , Sedum parvum acrt , Sedum Luteum , Scnccio , SerpUlum , Serrât ula , Siciliana , Sideritis , Siliquafrum , Sînapi rapi folio j S in api apii folio , Si^arum , Sifymbrium aquaticum , Sifymbrium paluflre 3 Sifymbrium paluflre repens » Sifymbrium , Bar bar ea 3 Sopkia chirurgorum , Si fort , Smilax afptra , Convoluulus major , Convoluulus minor 3 Srnyrnium , Soda coclkeato femine Soda kali fpinofum , Solarium , Solarium tuberofum , Soldanella , Sonchus Itzvis t Sonchus afper , Sorbus , Sorbus torminalis Sphondilium , Stachis major 3 Staphifagria , Statice major , Stramonium , Suber , Syringa , lilac , \ Orvale fauvase , Chamaras , Sauge des bois, Scorfonere , Scrophulaire des bois, Scrophulaire aquatique, Segle , Joubarbe , Petite Joubarbe, Vermiculaire , Trique-Madame , Séneçon , Serpolet, S.rcrte , Toute-faine , Crapaudine , Gaînier , Moutarde , Moutarde blanche,' Chervi , Reffort d'eau, Reffort de marais , Petit CrefTon fauvage ; Herbe Sainte-Barbe , Thalitron , Sifon , Liferon piquant, Grand Liferon , Petit Liferon , Maceron , Soude, Soude épineufe,' Morelle , Pomme de terre , Chou marin , Laiteron doux, Laiteron épineux,' Cormier , Alifier , Berce, Epi-fleuri , Herbe aux poux , Grand Staticé , Pomme épineufe , Liège , Lilas , r5 5*9 55* Jî* Î3Ï 534 53* J?7 J3* 519 5V> 54* J4Ï 544 S*f 54* J47 54» S 49 Î50 55* sn JJ4 555 5%9 j6o S6l j6i 5'ï 5&4 5^5 $66 567 jtfS 569 S70 57? 57t 57} 574

The text on this page is estimated to be only 13.80% accurate

16 TABLE DES PLANCHÉS. Synnga albal Seringa, Tamarifcus Germanica, Tamaris d'Allemagne „ f76 Tamarifcus Narbonenfis , Tamaris, 577 Tanacetum, Tanaifie, 578 Tanacetum coflus kortorum 3 Coq , pâté, 579 Taxas, Jf, j8o Ttrtianaria , Centaurée bleue , _j 8 r Tttragonia , Fufin , jSî. Tkaiiilrum , Rue des prés, 583 TMafpi vulgaûus, Tarafpic , 584 Thlafpi allium redoletts i Tarafpic Tentant l'ail „ J84 Thiafpi filiquïs latis , Tarafpic des cha mps , 58 c Thymdœa filas Lini a Lin fauvage , garou , jSfi Thymus Creticus , Thim de Crète, 587 Thymus, Thim, 58g Thyffdinum, Pc rfil de marais, j83 Tzfo, Tilleul, 590 T'mBorius fios j Gaude , 591 Tithymalus palufirîs , Tidiymale des marais , jpi Tithymalus, catapuûa Epurge , ;?î Tithymalus amydaloides , Tithymale à feaille d'amandier , J94 Tordylium , Sefeii de Candie, 59 j Tormtntiila , Tormentillc , 596 Tragopogon , Scrlîfî , 597 Tragopogon pratenfc , Serfifi fauvage , 598 Tribulus terrefiris , Saligot terreftre , 599 Tribulus aquaticus , Châtaigne d'eau , -tfoo Trifolium officinarum Treffle, éoi Trifolium la gopus , Pied de lièvre, foi Trifolium bituminofum , Treffle odorant, £0$ Trifolium , lotus ftiiquofa , Treffle hémorrho'ïdaf , ^04 Trifolium cornhulatum , Petit Lotier, 60 ; Triticum , Eroment , Tuffillago , Pas d'âne , 607 VaUriana horttnfs l Grande Va léti an e , 6*8 Valeriana fylvefiris , Valériane des bois , 609 Vakriana paluftris , Valériane aquatique , 610 Valeriandla, Mâche, fin Veratrum hdlehorafler ï Pied de griffon , fin Verbafcum mas , Bouillon-blanc , molene f gij Verbafcum fœmina , Bouillon-blanc femelle, tij f'erbena, Verveine, tfi4 Verbtfina , Chanvre aquatique , 61 f Veronica mas t Véronique, 61C Veronica pratenjîs , Véronique des prés , 617 Veronica minor 'Véronique de haie , 6 1 8 Veronica

The text on this page is estimated to be only 14.91% accurate

TABLÉ îTonka fpicata , Viburnum , ^'o/ii mania , Pic/a matronalis , p/Wa lunaria , Viorna clematitis, Viperina , Vifcum, Vifnaga , Vais , Uimatia , Ulmus , U mbilicus Vener'is , U mbilicus Veneris alter ^ Vnedo , U rtica major , Urtica mïnor , Urtica romana, Ufnea , V ulaeraria rujlica , Vvularia , Xanthium , Xiris , DÉS PLANCHES.' Véronique à épi , Viorne , Vefcc , Violette de mars; Julienne , Grande Lunaire, Herbe aux gueux ' Herbe aux vipères a Verge d'or, Guy, Curedent d'Efpagnej' Vigne, Myrtille , fentine , Reine des près, Orme, Nombril de Vénus,' Cotylédon , Arboufier , Grande Ortie , Ortie griêche, Ortie Romaine , Ufnée , Vulnéraire des payfans Ortie bleue , Petit Gloureron, Glaïeul puant , TOME V. ANIMAUX. I N S E C T ES. Jrt Ochleâ , feu Llmax icrreftris, Limax ruber , Çochlea celata , Ofireum , Concha margaritifera Dentalium , Antalium , flirudo , Lumbricus terrefiris j Mytulus , Sepia , Limaçon commun "t Limace rouge , Nombril de mer, Huître , Nacre de perles t Dentale , An talc , Sang-fuc , Ver de terre,' Moule de mer, Sèche , Abeille, 610

The text on this page is estimated to be only 11.88% accurate

18 TABiE DES PLANCHES; Ar/^neusl Araignée , ' 6f i Bomhïx , Ver-à-foie, 6 ji Cancer , pagurus 2 Crabe , poupart , 6 j } Cancer fluviatilis , Ecrcvifle , éj4 Cantharis major t Cantharidc , é/y Cicada , Cigale, 6yj Formica, fourmi, «r£ Cimex t Punaife , firtf Grillas domeflkus', Grillon domefrique., é$J Locufta , Grande Sauterelle, 657 Q ni feus , Cloporte, 6jj Pediculus humanus J Pou humain , 6 j7 Scarabxus cornutus , Cerf-volant, 65g Scarabœus ftridulus , Gros Hanneton , 658 Scarabœus unBaofsis , Pro-fcarabée , 6j8 Scarab&us pillularis x Fouille-merde, 658 Scorphs, Scorpion, Accipenfer , Efturgeon , (6o IçhihyocolU, Grand Efturgeon , 660 Anguilla, Anguille, 661 Afellus major , Morue , molue , €61 Merlan gius , Merlan, 66\ Bdena , Baleine , 6 % Cetus dmtatus , Cachalot, 661 Monoceros , _ NarwaI , 661 C anis carchariat Requiem „ € 6 \ CUpta feu A lofa , Alofç , 66 J Hirengus, Hareng, 665 Carpio , Carpe, £64 T«f

The text on this page is estimated to be only 14.86% accurate

TABLE DES PLANCHES.' Rufv, SaLainandra , Lacertus aquatîlis , Tefludo ttrreflrîs , Tejludo marina , Accipiter , Alauda , Akedo muta', Anus fylveflris , Anfer domefticus , Aqtùla regalis, Ardea cinerea , Ciconia , Grus , Cardutlis , Columba- , Turtur , Coryas , Cothurnix Çuculus , Cygnus , Gallus , Hirundo , Merida , Motacïlla , Oùs , Caprimulgiis , Parus , rafler, Pajfer trogîadues ^ Pavo , Perdix cinerea, Phafianus , Pica , Picus-Viridis , Sirutkio , Turdus minor , Vandlus , Upupa , Bos, Taurus Vacta x Crapaud , Salamandre de terre . Salamandre d'eau , Tortue de terre. Tortue de mer . mouron , Q î S E A U X. Epervier , moucket> Alouette , Martin - pêcheur , Canard fauvage. Oie domeftîque , Aigle royal , Héron cendré, Cicogne , Grue , j Chardonneret , Pigeon bifet. Tourterelle , Corbeau , Caille , Coucou , ~ Cygne , Coq, Hirondelle ,* Merle , Hochequeue blanche ^ Outarde , Frefaie , crapaud volant, Gro(fe Méfangc , Moineau-franc, Roitelet , Paon , Perdrix grife Faifan , Pie, pk-verd , Autruche , Peçite Grive, mauvictej Van eau , Pupue , QUADRUPEDES. Bœuf, Vache, 67 î, 67î 74 675 6jS *77 *77 67% 67? «8» 6%l 6&i. «8; É84 «85 «8y 6Z&

The text on this page is estimated to be only 10.61% accurate

i/o ÏABLE DES PLANCHÉ*, Camtlusï Chameau, 7«o Canis , Chien mâtin, 701 \Lupust Loup, 7Q± Vulpes, Renard, 701 Hircus> Bouc, 7°î Capra , Chèvre j 7e 3 Rupzcapral Chamois, 7°4 Caprea mofchi , Gazelle, 7°4 Caprictrva Orientalisl Chcvre du Bézoart i 70* CtfjW Canadenjïs, Caftor, 7°^ Ce/w, Cerf & Biche, 707 Çervus rangifir , Renne, 7°8 ^/«, Elland, . 705» Èrinaceus , Héïiilbn , J l 9 Eltphas, Eléphant, 71* Eqwis, Cheval, 7 14 Afinus , Ane , 7 1 » Mu/us, Mulet, 71 î iv/x'-f, Chat, 7 H Cy/îw , Hippopotame , 7 1 5 Léo , , Lion, 7I(> Znp, Lièvre, ?r7 Cunkulusi Lapin, 717 Iwnî , Loutre ; 7 1 s Manaù , Lamcntin , 7J8 Martes, Fouine, 71? Mêles, taxus~» Blereau, 710 Animal Zibethi , Civette, 7 10 Mus minor , Souris, 7 11 Mus major , Rat, 711 Mus alp'mus , Marmotte , 711 Arles, Bélier, 7*5 Ovïs,, Brebis, 714 Phoca, Veau marin j' i%$ Rhinocéros l Rhinocéros, 716 Simiat " Singe fans queue j ' 717 Sus , Cochon, 7*8 Aper , Sanglier, 7 2. S TW/hj , Taupe , 71? *7>/«j , ' Ours , 71? Homo, Homme, 73»



